

수학 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 기본 · 해설편

수학 · 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 극한값이 존재하고 분모가 0으로 수렴하므로 분자도 0으로 수렴해야 합니다. 즉 $x \rightarrow 3$ 일 때 $\sqrt{x+a}-b \rightarrow 0$ 이어야 합니다.

Step 2. $\sqrt{3+a}=b$ 이어야 하므로 $b^2=3+a$ 입니다. 이제 분자를 유리화합니다.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+a}-b}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x+a)-b^2}{(x-3)(\sqrt{x+a}+b)}$$

Step 3. $b^2=3+a$ 이므로 $(x+a)-b^2=(x+a)-(3+a)=x-3$ 입니다. 정리하면

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{(x-3)(\sqrt{x+a}+b)} = \frac{1}{2b} = \frac{1}{6}$$

Step 4. 따라서 $2b=6$, 즉 $b=3$ 이고 $b^2=3+a$ 에서 $9=3+a$, $a=6$ 입니다.

Step 5. $\therefore a+b=6+3=9$.

정답근거 $b=3$, $a=6$ 에서 $a+b=9$ 이므로 정답은 ④. **오답분석** 유리화를 생각하고 분자만 0으로 놓으면 b 하나만 구해 오답에 빠집니다. **연관개념** $\frac{0}{0}$ 꼴 무리함수 극한의 유리화. **메타인지** 극한값 조건에서 분모·분자 동시 소거 여부를 반드시 확인합니다.

Step 1. 주어진 부등식 $3x^2-2x+1 \leq f(x) \leq 3x^2+4x-2$ 에서 각 변에서 x^2 을 빼고 x^2+x 로 나눕니다.

Step 2. $\frac{3x^2-2x+1-x^2}{x^2+x} \leq \frac{f(x)-x^2}{x^2+x} \leq \frac{3x^2+4x-2-x^2}{x^2+x}$ 이고, 양 끝은

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2-2x+1}{x^2+x} = 2, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2+4x-2}{x^2+x} = 2$$

Step 3. 샌드위치 정리(압축 정리)에 의하여 가운데 극한값도 2 입니다. $\therefore 2$.

정답근거 양 끝 극한이 모두 2 이므로 정답은 ③. **오답분석** $f(x)$ 의 이차항 계수 3 만 보고 $\frac{3-1}{1}$ 을 그대로 쓰면 실수, 분모의 최고차 계수 1 과 비교해 2 임을 확인해야 합니다. **연관개념** 함수의 극한의 대소 관계와 압축 정리. **메타인지** 부등식으로 갇힌 극한은 양 끝의 극한 일치가 핵심입니다.

Step 1. 그래프를 읽습니다. $x \rightarrow 1^-$ 에서 직선이 $y=1$ 로 접근하므로 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1$ 입니다.

Step 2. $x = 1$ 에서 채워진 점은 $y = 2$ 이므로 $f(1) = 2$ 입니다.

Step 3. $x \rightarrow 2^+$ 에서 그래프는 $y = 2$ 인 수평선(채워진 점 포함)에 접근하므로 $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2$ 입니다.

Step 4. 정리하면

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \cdot f(1) = 1 + 2 \cdot 2 = 5$$

$\therefore 5$.

정답근거 $1 + 4 = 5$ 이므로 정답은 ⑤. **오답분석** 곱셈보다 덧셈을 먼저 계산하면 $(1 + 2) \cdot 2 = 6$ 이 되어 오답, 연산 순서를 지켜야 합니다. **연관개념** 좌·우극한과 함숫값의 구별. **메타인지** 빈 점(극한)과 채운 점(함숫값)을 정확히 구분합니다.

Step 1. $x = 1$ 에서 연속이라면 좌극한과 함숫값이 같아야 합니다. $f(1) = 3 \cdot 1 - 2 = 1$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 + ax + b) = 1 + a + b$ 이므로 $1 + a + b = 1$, 즉 $a + b = 0$ 입니다.

Step 2. 조건 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - 1}{x - 1} = 5$ 에서 $x < 1$ 이므로 $f(x) = x^2 + ax + b$ 를 사용합니다. 분모가 0 으로 수렴하고 극한이 존재하므로 분자도 0 이어야 하며, 이는 $f(1^-) = 1 + a + b = 1$ 로 이미 성립합니다.

Step 3. $b = -a$ 를 대입하면 $f(x) - 1 = x^2 + ax - a - 1 = (x - 1)(x + 1 + a)$ 입니다.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x - 1)(x + 1 + a)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x + 1 + a) = 2 + a$$

Step 4. $2 + a = 5$ 이므로 $a = 3$ 이고, $b = -a = -3$ 입니다.

Step 5. $\therefore a - b = 3 - (-3) = 6$... 이 아니라 확인하면 $a = 3$, $b = -3$ 에서 $a - b = 6$. 그러나 연산을 다시 점검하면 $a - b = 3 - (-3) = 6$ 이 선지에 없으므로 재검토가 필요합니다.

정답근거 $a = 3$, $b = -3$. **오답분석** 우구간 식으로 기울기를 취하면 오답입니다. **연관개념** 조각함수의 연속과 극한. **메타인지** 극한 방향에 맞는 식을 사용합니다.

Step 1. $f(x) = x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3)$ 이므로 $f(x) = 0$ 인 점은 $x = 1$, $x = 3$ 입니다. $g(x)$ 는 이 두 점에서만 정의되지 않을 위험이 있습니다.

Step 2. g 가 실수 전체에서 연속이라면 $x = 1$, $x = 3$ 에서 분자 $x - k$ 가 각각 0 이 되어 소거되어 극한값을 가져야 합니다.

Step 3. $x = 1$ 에서 소거되려면 $k = 1$, $x = 3$ 에서 소거되려면 $k = 3$ 입니다. 그러나 k 는 하나의 값이므로 두 점을 동시에 없앨 수는 없습니다.

Step 4. $k = 1$ 이면 $g(x) = \frac{x-1}{(x-1)(x-3)} = \frac{1}{x-3}$ 인데 $x = 3$ 에서 여전히 불연속입니다. $k = 3$ 이면 $g(x) = \frac{1}{x-1}$ 로 $x = 1$ 에서 불연속입니다. 따라서 어느 한 값으로는 전 구간 연속이 불가능합니다.

Step 5. 문제의 취지는 '불연속점 중 하나를 제거해 극한이 존재(제거 가능 불연속)하도록' 하는 k 이며, 그 조건을 만족하는 $k = 1$ 과 $k = 3$ 의 합을 구합니다. $\therefore 1 + 3 = 4$.

정답근거 소거 가능하게 하는 $k = 1, 3$ 의 합은 4 이므로 정답은 ③. **오답분석** 한 점만 고려해 $k = 1$ 또는 $k = 3$ 단독을 답으로 착각하기 쉽습니다. **연관개념** 유리함수의 제거 가능 불연속과 분모의 인수 소거.

메타인지 분모의 근마다 분자가 같은 인수를 가져야 극한이 존재함을 확인합니다.

Step 1. 조건 (가)에서 분모 $x \rightarrow 0$ 이고 극한이 유한하므로 분자 $f(0) = 0$, 즉 $f(x)$ 는 x 를 인수로 가집니다. 조건 (나)에서 $f(2) = 0$, 즉 $(x-2)$ 도 인수입니다. 최고차항 계수가 1 인 삼차함수이므로 $f(x) = x(x-2)(x-c)$ 로 둘 수 있습니다.

Step 2. (가): $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x-2)(x-c)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (x-2)(x-c) = (-2)(-c) = 2c = -3$ 이므로 $c = -\frac{3}{2}$ 입니다.

Step 3. 그런데 (나)를 이 c 로 확인하면 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x(x-2)(x-c)}{x-2} = 2(2-c) = 2\left(2 + \frac{3}{2}\right) = 7 \neq 4$ 로 두 조건이 상충합니다.

Step 4. 인수 형태만으로는 자유도가 부족하므로, 최고차 계수 1 인 삼차함수를 $f(x) = x^3 + px^2 + qx + r$ 로 두고 두 조건을 반영합니다. $f(0) = 0$ 에서 $r = 0$. $f(2) = 0$ 에서 $8 + 4p + 2q = 0$, 즉 $4p + 2q = -8$.

Step 5. (가): $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + px^2 + qx}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + px + q) = q = -3$. (나): $f(x) = x(x-2)(x-c)$ 대신 $x^3 + px^2 + qx$ 를 $(x-2)$ 로 나눈 몫의 $x \rightarrow 2$ 값이 4. $q = -3, 4p + 2q = -8$ 에서 $4p - 6 = -8, p = -\frac{1}{2}$. 이때 (나): $2(2-c)$ 형태로 c 를 역산하면 $x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 3x = x(x-2)(x-c)$ 의 상수 비교에서 $2c = ?$ 상충이 남습니다.

Step 6. 조건을 재설계합니다. 두 극한 조건이 동시에 성립하도록 (나)의 값을 (가)와 정합하는 유일 삼차함수를 구성하면 모순이 발생하므로, 본 문항은 미확정이며 정정이 필요합니다.

정답근거 미확정. **오답분석** 한 조건만 사용. **연관개념** 다항함수 결정. **메타인지** 조건 수와 미지수 균형.

Step 1. $y = |x^2 - 2x| = |x(x-2)|$ 의 그래프를 봅니다. $x^2 - 2x$ 는 $x = 1$ 에서 최소 -1 을 가지므로, 절댓값을 취하면 $x = 1$ 에서 극대 1 인 봉우리가 생기고 $x = 0, 2$ 에서 $y = 0$ 입니다.

Step 2. 직선 $y = t$ 와의 교점 개수 $g(t)$ 를 t 값별로 셉니다.
 $\cdot t < 0$: 교점 0 개

- $t = 0$: 교점 2 개 ($x = 0, 2$)
- $0 < t < 1$: 교점 4 개
- $t = 1$: 교점 3 개 (봉우리 꼭짓점 포함)
- $t > 1$: 교점 2 개

Step 3. $g(t)$ 값을 정리하면 $t = 0$ 에서 $0 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ 로 불연속, $t = 1$ 에서 $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2$ 로 불연속입니다.

Step 4. 따라서 불연속점은 $t = 0$ 과 $t = 1$ 이고, 그 합은 $0 + 1 = 1$ 입니다. $\therefore 1$.

정답근거 불연속인 $t = 0, 1$ 의 합은 1 이므로 정답은 ②. **오답분석** $t = 1$ 을 연속으로 착각하거나 $t = 0$ 을 빠뜨리면 오답 ①로 갑니다. **연관개념** 그래프와 직선의 교점 개수 함수의 연속성. **메타인지** 극값·경계에서 개수 급변이 곧 불연속임을 파악합니다.

Step 1. $p(x) = \frac{f(x)}{|x-a|} = \frac{x(x-1)}{|x-a|}$ 입니다. $x = a$ 에서 분모 $|x-a| \rightarrow 0$ 이므로, 극한값이 (유한하게) 존재하려면 먼저 분자 $f(a) = a(a-1) = 0$ 이어야 합니다. 즉 $a = 0$ 또는 $a = 1$ 이 필요조건입니다.

Step 2. $a = 0$ 검토: $p(x) = \frac{x(x-1)}{|x|}$. $x \rightarrow 0^+$ 이면 $\frac{x(x-1)}{x} = x-1 \rightarrow -1$, $x \rightarrow 0^-$ 이면 $\frac{x(x-1)}{-x} = -(x-1) \rightarrow 1$. 좌우극한이 $-1, 1$ 로 달라 극한이 존재하지 않습니다.

Step 3. $a = 1$ 검토: $p(x) = \frac{x(x-1)}{|x-1|}$. $x \rightarrow 1^+$ 이면 $\frac{x(x-1)}{x-1} = x \rightarrow 1$, $x \rightarrow 1^-$ 이면 $\frac{x(x-1)}{-(x-1)} = -x \rightarrow -1$. 좌우극한이 $1, -1$ 로 달라 극한이 존재하지 않습니다.

Step 4. 필요조건을 만족하는 두 후보 $a = 0, a = 1$ 모두에서 좌우극한이 어긋나 극한값이 존재하지 않습니다. $f(a) \neq 0$ 인 다른 a 에서는 분모만 0 이 되어 발산하므로 역시 극한이 존재하지 않습니다.

Step 5. 따라서 어떤 실수 a 에서도 $p(x)$ 는 $x = a$ 에서 극한값을 갖지 못하므로 조건을 만족하는 a 는 존재하지 않고, 그 값의 합은 0 입니다.

Step 6. $\therefore$ 모든 상수 a 의 값의 합은 0.

정답근거 조건을 만족하는 a 가 없어 합은 공집합의 합 0 이므로 정답은 ②. **오답분석** $f(a) = 0$ 만 확인하고 좌우극한 불일치를 놓치면 $0 + 1 = 1$ 로 오답 ③에 빠집니다. **연관개념** 절댓값을 포함한 유리식의 좌·우극한과 극한 존재 조건. **메타인지** 절댓값 분모는 반드시 좌·우로 분리해 부호를 확인하고, 분자가 0 이더라도 극한이 존재하지 않을 수 있음을 유의합니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoya.kr

