

第一讲 实二次型及其标准形

二次型及其矩阵表示

矩阵的合同

用配方法化二次型为标准形

➤ 用正交变换化二次型为标准形

小结



四、用正交变换化二次型为标准形

若线性变换 $X = CY$ 中 C 为正交矩阵，则称之为正交变换.

由实对称矩阵一定可相似对角化的性质知：

定理3 任一 n 元实二次型 $f(X) = X^T A X$ 都可用正交变换 $X = CY$ 化为标准形

$$\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的特征值.

证 因 A 为 n 阶实对称矩阵, 所以存在正交矩阵 C ,

$$\text{使 } C^T A C = C^{-1} A C = \text{diag} (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

令 $X = CY$, 则

$$f(X) = Y^T C^T A C Y = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$$

用正交变换化二次型为标准形的方法:

- (1) 写出二次型 $f(X)$ 的矩阵 A ;
- (2) 求 A 的特征值与特征向量;
- (3) 将同一特征值的特征向量正交、单位化;
- (4) 以(3)中的标准正交向量组为列做正交矩阵 C ;
- (5) 做正交变换 $X = CY$, 则 $f(X) = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$.

例 用正交变换化二次型为标准形

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 2x_2^2 - 2x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 8x_2x_3$$

解 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & -2 & 4 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix}$$

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 2 & -2 \\ 2 & \lambda + 2 & -4 \\ -2 & -4 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^2(\lambda + 7)$$

特征值: $\lambda_1 = 2$ (二重特征值), $\lambda_2 = -7$.

求 $\lambda_1 = 2$ 的特征向量:

$$\lambda_1 I - A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -4 \\ -2 & -4 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

同解方程组 $x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0$

特征向量: $\alpha_1 = (-2, 1, 0)^T$, $\alpha_2 = (2, 0, 1)^T$

将 α_1, α_2 正交化:

$$\beta_1 = \alpha_1 = (-2, 1, 0)^T,$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = \cdots = \frac{1}{5} (2, 4, 5)^T$$

求 $\lambda_2 = -7$ 的特征向量:

$$\lambda_2 I - A = \begin{pmatrix} -8 & 2 & -2 \\ 2 & -5 & -4 \\ -2 & -4 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

同解方程组 $\begin{cases} x_1 = -\frac{1}{2}x_3 \\ x_2 = -x_3 \end{cases}$, 特征向量: $\alpha_3 = (1, 2, -2)^T$,

将 $\beta_1, \beta_2, \alpha_3$ 单位化:

$$\gamma_1 = \frac{1}{\|\beta_1\|} \beta_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} (-2, 1, 0)^T, \quad \gamma_2 = \frac{1}{\|\beta_2\|} \beta_2 = \frac{1}{\sqrt{45}} (2, 4, 5)^T$$

$$\gamma_3 = \frac{1}{\|\alpha_3\|} \alpha_3 = \frac{1}{3} (1, 2, -2)^T.$$

$$\text{令 } C = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) = \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{3\sqrt{5}} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

$$X = (x_1, x_2, x_3)^T, \quad Y = (y_1, y_2, y_3)^T$$

则 $X = CY$ 为正交变换, 且

$$f = 2y_1^2 + 2y_2^2 - 7y_3^2$$

练习 用正交变换, 将二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + 3x_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 6x_2x_3$$

化为标准形.

解 二次型的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 3 \\ -1 & 5 & -3 \\ 3 & -3 & 3 \end{pmatrix}$,

可求得 $|\lambda I - A| = \lambda(\lambda - 4)(\lambda - 9)$,

于是 A 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 4, \lambda_3 = 9$,

对应特征向量为 $p_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, p_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, p_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

将其单位化得

$$\mathbf{q}_1 = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{q}_2 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{q}_3 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} \\ -1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}.$$

故正交变换为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix},$$

化二次型为 $f = 4y_2^2 + 9y_3^2.$