



电子科技大学

University of Electronic Science and Technology of China



中国大学MOOC

二阶齐次微分方程

- 一、线性微分方程的解的结构
- 二、二阶常系数齐次方程的解法
- 三、 n 阶常系数齐次线性方程解法

电子科技大学数学科学学院

§ 4 二阶齐次微分方程

二阶线性微分方程 $\frac{d^2 y}{dx^2} + P(x) \frac{dy}{dx} + Q(x)y = f(x)$

当 $f(x) = 0$ 时, 二阶线性齐次微分方程

当 $f(x) \neq 0$ 时, 二阶线性非齐次微分方程

n 阶线性微分方程 $y^{(n)} + P_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + P_{n-1}(x)y' + P_n(x)y = f(x)$.

若记 $Ay = y^{(n)} + P_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + P_{n-1}(x)y' + P_n(x)y$.

则 n 阶线性微分方程可以简记为 $Ay = f$

线性映射 $A: y \in C^n[a, b] \mapsto f \in C[a, b]$

n 阶线性方程组 $A \in R_{n \times n}: y \in R^n \mapsto f \in R^n$

齐次方程: 叠加原理、通解? 齐次方程与非齐次方程解的关系?

一、线性微分方程的解的结构

1. 二阶齐次方程解的结构: $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ (1)

叠加原理

定理 1. 如果函数 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 是方程(1)的两个解, 那么 $y = C_1y_1 + C_2y_2$ 也是(1)的解, 其中 C_1 、 C_2 是常数.

问题: $y = C_1y_1 + C_2y_2$ 是否为通解?

线性方程组: 需要
线性无关性

进一步的问题: 如何定义函数的线性无关?

定义 设 y_1, y_2, \dots, y_n 为定义在区间 I 内的 n 个函数. 如果存在 n 个不全为零的常数, 使得当 x 在该区间内时有恒等式 $k_1 y_1 + k_2 y_2 + \dots + k_n y_n \equiv 0$, 则称这 n 个函数在区间 I 内线性相关, 否则称线性无关.

如何判断一组函数是否线性无关?

例如: 当 $x \in (-\infty, +\infty)$ 时,

e^x, e^{-x}, e^{2x} 线性无关; $1, \cos^2 x, \sin^2 x$ 线性相关.

特别: 若在 I 上有 $\frac{y_1(x)}{y_2(x)} \neq \text{常数}$, 则函数 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 在 I 上线性无关.

齐次方程通解的结构

定理 2. 如果 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 是方程

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0 \quad (1)$$

的两个线性无关的特解, 则 $y = C_1y_1 + C_2y_2$ 就是方程(1)的通解.

例如: $y'' + y = 0$

$$y_1 = \cos x, \quad y_2 = \sin x, \quad \text{且} \quad \frac{y_2}{y_1} = \tan x \neq \text{常数},$$

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x.$$

复值情形解的性质

定理 3. 如果二阶齐次方程

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0 \quad (1)$$

的系数 $P(x), Q(x)$ 都是实值函数, 且 $y = \varphi(x) + i\psi(x)$ 是方程的解, 则 $\varphi(x), \psi(x), \varphi(x) - i\psi(x)$ 都是方程(1)的解.

二、二阶常系数齐次方程的解法

n 阶常系数线性微分方程的标准形式

$$y^{(n)} + p_1 y^{(n-1)} + \cdots + p_{n-1} y' + p_n y = f(x)$$

二阶常系数非齐次线性方程的标准形式

$$y'' + py' + qy = f(x)$$

二阶常系数齐次线性方程的标准形式

$$y'' + py' + qy = 0$$

二阶常系数齐次方程的解法

特征方程法
Euler, 1743

中国大学MOC

$$y'' + py' + qy = 0$$

设 $y = e^{rx}$, 将其代入上方程, 得 $(r^2 + pr + q)e^{rx} = 0$

$$r^2 + pr + q = 0$$

特征方程

特征根 $r_{1,2} = \frac{-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}.$

(1) 有两个不相等的实根 ($\Delta > 0$)

特征根为 $r_1 = \frac{-p + \sqrt{p^2 - 4q}}{2}, r_2 = \frac{-p - \sqrt{p^2 - 4q}}{2}.$

两个线性无关的特解 $y_1 = e^{r_1 x}, y_2 = e^{r_2 x}.$

故齐次方程的通解为: $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x};$

(2) 有两个相等的实根 ($\Delta = 0$)

特征根为 $r_1 = r_2 = -\frac{p}{2}$, 一特解为 $y_1 = e^{r_1 x}$,

另一解: 常数变易法
或线性无关性

设另一特解为 $y_2 = u(x)e^{r_1 x}$,

将 y_2, y_2', y_2'' 代入原方程并化简, $u'' + \underline{(2r_1 + p)u'} + \underline{(r_1^2 + pr_1 + q)u} = 0$,
知 $u'' = 0$, 取 $u(x) = x$, 则 $y_2 = xe^{r_1 x}$.

故齐次方程的通解为: $y = (C_1 + C_2 x)e^{r_1 x}$;

(3) 有一对共轭复根 ($\Delta < 0$)

特征根为 $r_1 = \alpha + i\beta, r_2 = \alpha - i\beta$,

$y_1 = e^{(\alpha + i\beta)x}, y_2 = e^{(\alpha - i\beta)x}$,

重新组合或定理4: $\bar{y}_1 = \frac{1}{2}(y_1 + y_2) = e^{\alpha x} \cos \beta x, \bar{y}_2 = \frac{1}{2i}(y_1 - y_2) = e^{\alpha x} \sin \beta x$.

故齐次方程的通解为: $y = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$.

总结如下:

$$y'' + py' + qy = 0$$

$$r^2 + pr + q = 0$$

特征根的情况	通解的表达式
实根 $r_1 \neq r_2$	$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x};$
实根 $r_1 = r_2$	$y = (C_1 + C_2 x) e^{r_1 x};$
复根 $r_{1,2} = \alpha \pm i\beta$	$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x).$

例1. 求微分方程 $y'' + 2y' - 3y = 0$ 的通解.

解 特征方程为 $r^2 + 2r - 3 = 0$ 其特征根为两个不相等的实根 $r_1 = 1, r_2 = -3$
方程的通解为 $y = C_1 e^x + C_2 e^{-3x}$.

例2. 求方程 $y'' + 4y' + 4y = 0$ 的通解.

解 特征方程为 $r^2 + 4r + 4 = 0$, 解得 $r_1 = r_2 = -2$,
故所求通解为 $y = (C_1 + C_2 x)e^{-2x}$.

例3. 求方程 $y'' + 2y' + 5y = 0$ 的通解.

解 特征方程为 $r^2 + 2r + 5 = 0$, 解得 $r_{1,2} = -1 \pm 2i$,
故所求通解为 $y = e^{-x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$.

三、 n 阶常系数齐次线性方程解法

$$y^{(n)} + P_1 y^{(n-1)} + \cdots + P_{n-1} y' + P_n y = 0$$

特征方程为 $r^n + P_1 r^{n-1} + \cdots + P_{n-1} r + P_n = 0$

特征方程的根	通解中的对应项
(1)单实根 r	给出一项 Ce^{rx}
(2)一对单复根 $r = \alpha \pm \beta i$	给出二项 $y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$
(3) k 重实根 r	给出 k 项 $(C_0 + C_1 x + \cdots + C_{k-1} x^{k-1})e^{rx}$
(4)一对 k 重复根 $r = \alpha \pm j\beta$	给出 $2k$ 项 $[(C_0 + C_1 x + \cdots + C_{k-1} x^{k-1}) \cos \beta x$ $+ (D_0 + D_1 x + \cdots + D_{k-1} x^{k-1}) \sin \beta x] e^{\alpha x}$

例4. 求微分方程 $y^{(4)} - y = 0$ 的通解.

解 特征方程为 $r^4 - 1 = 0 \Rightarrow r_1 = 1, r_2 = -1, r_{3,4} = \pm i$.

故方程的通解为 $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + C_3 \cos x + C_4 \sin x$, $C_i, i = 1, 2, 3, 4$ 为常数.

例5. 求微分方程 $\frac{d^4 x}{dt^4} + 2\frac{d^2 x}{dt^2} + x = 0$ 的通解.

二重复根

解 其特征方程为 $r^4 + 2r^2 + 1 = 0$, 特征根为 $r_{1,2} = \pm i$.

方程的通解为 $x = (C_1 + C_2 t) \cos t + (C_3 + C_4 t) \sin t$, C_1, C_2, C_3, C_4 均为常数.

例6. 求方程 $y^{(5)} + y^{(4)} + 2y^{(3)} + 2y'' + y' + y = 0$ 的通解.

解 特征方程为 $r^5 + r^4 + 2r^3 + 2r^2 + r + 1 = 0, \Rightarrow (r+1)(r^2+1)^2 = 0$,

特征根为 $r_1 = -1, r_{2,3} = \pm i$

二重复根

故所求通解为 $y = C_1 e^{-x} + (C_2 + C_3 x) \cos x + (C_4 + C_5 x) \sin x$.

例7. 证明: $f(x)$ 满足 $f'(x) = f(1-x)$, 则必满足方程 $f''(x) + f(x) = 0$, 中国大学MOC

并求方程 $f'(x) = f(1-x)$ 的解.

证明: $f''(x) = f'(1-x)(1-x)' = -f'(1-x) = -f(1-(1-x)) = -f(x)$

$f''(x) + f(x) = 0$ 的通解为 $f(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x$.

$$\because f'(x) = f(1-x)$$

$$\therefore -C_1 \sin x + C_2 \cos x = C_1 \cos(1-x) + C_2 \sin(1-x)$$

$$\text{令 } x = 0, \rightarrow C_2 = \frac{C_1(1 + \sin 1)}{\cos 1}$$

$$\text{从而, } f(x) = C_1 \left(\cos x + \frac{1 + \sin 1}{\cos 1} \sin x \right)$$

练习1. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = 5 - \int_0^x (x-t-1)f(t)dt$, 求 $f(x)$.

练习2. 写出以 $y = C_1 e^x + C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x$ 为通解的常系数齐次线性微分方程.