Figure 3 | ESCORT-1ST: frozen external evaluation

A

Progression-free survival



No. at risk (cumulative censored)

B | CT	109 (0)	50 (0)	21 (0)	7 (7)	1 (10)
B | ICI+CT	98 (0)	58 (0)	43 (0)	23 (11)	6 (22)
NB | CT	71 (0)	35 (0)	16 (0)	10 (3)	3 (7)
NB | ICI+CT	82 (0)	24 (0)	15 (0)	6 (3)	4 (5)

B **PFS treatment effects**

Subgroup	ICI+CT Events/ patients	ICI+CT Median months (95% CI)	CT Events/ patients	CT Median months (95% CI)	HR (95% CI)
Overall	147/180	9.56 (7.07-14.87)	160/180	10.60 (8.73-13.74)	0.85 (0.68-1.06)
B	72/98	17.67 (11.29-27.84)	98/109	9.35 (7.84-14.12)	0.55 (0.40-0.76)
NB	75/82	5.97 (3.75-8.27)	62/71	11.92 (9.48-15.20)	1.41 (1.00-1.97)



Ratio of treatment HRs (95% CI): 0.39 (0.25-0.62)
B/NB; Altman-Bland P < 0.001

C

Overall survival



No. at risk (cumulative censored)

B | CT	109 (0)	87 (0)	53 (0)	19 (12)	5 (20)
B | ICI+CT	98 (0)	85 (0)	64 (0)	36 (13)	10 (30)
NB | CT	71 (0)	55 (0)	36 (0)	17 (5)	4 (14)
NB | ICI+CT	82 (0)	51 (0)	33 (0)	15 (7)	5 (14)

D **OS treatment effects**

Subgroup	ICI+CT Events/ patients	ICI+CT Median months (95% CI)	CT Events/ patients	CT Median months (95% CI)	HR (95% CI)
Overall	124/180	26.88 (19.80-31.25)	137/180	23.79 (20.25-26.77)	0.83 (0.65-1.06)
B	60/98	34.76 (27.29-42.01)	84/109	23.65 (19.97-28.25)	0.58 (0.41-0.82)
NB	64/82	16.74 (12.74-24.59)	53/71	24.80 (19.21-30.14)	1.27 (0.89-1.83)



Ratio of treatment HRs (95% CI): 0.46 (0.28-0.75)
B/NB; Altman-Bland P = 0.002

HR: ICI+CT / CT. Binary interaction: Altman-Bland. Internal OOF Cox: fold-stratified; external/apparent Cox: no fold strata. NR: not reached.

SIMULATED DATA — workflow demonstration only