2. NAL.

$L = \{ a^i b^j \mid i \text{ deli } j \}$

1) aaa bbbbbb

B

2)

aaa	1. TRAK
bbbbbb	2. TRAK

$\delta(g_0, a, B) = (g_0, (a, R), (B, S))$
$\delta(g_0, b, B) = (g_0, (B, R), (b, R))$
$\delta(g_0, B, B) = (g_1, (B, L), (B, L))$
$\delta(g_1, B, b) = (g_1, (B, L), (b, L))$
$\delta(g_1, a, B) = (g_2, (a, L), (B, S))$

KOPIRANJE + PREMIK NA START

$\delta(g_2, a, b) = (g_2, (a, R), (b, R))$ — 1a 1b } ZAČNEŠ ŠTET

$\delta(g_2, B, B) = (g_F, (B, S), (B, S))$ ← KONEC: GPREJMEŠ

$\delta(g_2, B, b) = (g_3, (B, L), (b, S))$
$\delta(g_3, a, b) = (g_3, (a, L), (b, S))$
$\delta(g_3, B, b) = (g_2, (B, R), (b, S))$

NAZAJ NA ZAČETEK A

3. NALOGA

$L = \{ A^p \mid p = \text{PRAŠTEVILO} \}$

IDEA:

za 0 do #b "a"-jev
PREGLEDAMO ČE #a DELI #b.
↳ ČE DELI, JE SLABO
IN GREMO V NEKO
SHIT STANJE

↳ KO JE #a == #b SMO
KONČAL



4. NALOGA

T_1 101

T_2 110,1,1,1

T_3 111100

1) PREMIK DO KONCA NA T_1 in T_2



$a = \{0,1\}$ $b = \{0,1\}$

$\delta(g_0, a, b, B) = (g_0, (a,R), (b,R), (B,S))$

$\delta(g_0, B, b, B) = (g_0 (B,S), (b,R), (B,S))$

$\delta(g_0, 0, B, B)$

$\delta(g_0, B, B, B) = (g_1, (B,L), (B,L), (B,L))$

SEŠTEVANJE:

$\delta(g_{01}, 0, 0, B) = (g_{01} (0,L) (0,L) (0,L))$ } CARRY = 0

$\delta(g_{01}, 0, 1, B) = (g_{01} (0,L), (1,L), (0,L))$

1 0

$\delta(g_{01}, 1, 1, B) = (g_2, (1,L), (1,L), (0,L))$

$\delta(g_2, 0, 0, B) = (g_1 (0,L) (0,L) (1,L))$ } CARRY = 1

$\delta(g_2, 0, 1, B) = (g_2 (0,L) (1,L) (0,L))$

1 0

$\delta(g_2, 1, 1, B) = (g_2 (1,L) (1,L) (1,L))$

NA KONC POTAUDLAŠ BLANKE

5. NALOGA

$L = \{ w\,w \mid w \in \{0,1\}^* \}$

$\delta(q_0, a, B, B) = \{ q_0 \ (a,R)\ (a,R)\ (B,S)$
$q_1 \ (a,S)\ (B,S)\ (B,S) \}$ IGNORES STANJE

$\delta(q_1, a, B, B) = \{ (q_1, (a,R), (B,S), (a,R)) \}$

$\delta(q_2, B, B, B) = \{ (q_2, (B,S), (B,L), (B,L)) \}$

001 001
001
001

$\delta(q_2, B, a, a) = \{ q_2, (B,S), (a,L), (a,L) \}$

$\delta(q_2, B, B, B) = \{ q_F \ (B,S)\ (B,S)\ (B,S) \}$