BIOLAB

Préconisation pour le patient ECBU (Examen Cytobactériologique des Urines)

Réf : MU-C1-INS-001-V05 Version : 05 Applicable le : 30-04-2016

Recommandations

- De préférence, recueillir les premières urines du matin au réveil ou s'abstenir d'uriner au moins pendant 3 heures.
- En cas de crise, on peut recueillir les urines à n'importe quel moment de la journée
- Recueillir les urines avant tout traitement antibiotique.
- Sinon attendre au moins 48h00 après l'arrêt du traitement Antibiotique, sauf en cas de signes cliniques aigus.

Préconisations pour le recueil



Identifier le flacon avec votre nom et prénom si cela n'a pas été fait par le laboratoire Remplir la fiche de renseignements jointe

Rapporter les urines au laboratoire dans les plus brefs délais. Si elles ne peuvent être rapportées immédiatement, les conserver maximum 2h à T° ambiante ou 12h00 au réfrigérateur.

	portées immédiatement, le durée habituelle d'obten				réfrigérateur.
NOM – Prénom – NOM de jeune fille :					
				CO	CHER AVEC UNE CROIX SVP
	RENSEIGNEM	ENTS CLINIQU	ES : (à remplir	par le patien	t)
Modalités de prélèvement Symptômes		Sondage aller-r s dans le bas du dos	etour S	onde à demeure Envie fréquente	☐ Poche d'uriner ☐ Pas de symptomes
Délai de début des symptô	òmes □1; □2; □3; □	4j5j1sem	2sem	3sem	☐ 1mois ☐ >1mois
Antécédants d'infection u	rinair Non, jamais	Oui, rarement	Oui, plusieurs fois par	an	
Prescription antibiotique	Oui Non Contrôle	après traitement	==> si oui, déjà com	mencé ? Oui	Non
Nom de l'antibiotique ? (1 seule réponse)	Amoxicilline-ac. clavulaniqu Ciprofloxacine (UNIFLOX, Fosfomycine (FOSOCINE Ne sait pas	CIFLOX)	Céfixime (OROKEN) Norfloxacine (NORXI Cotrimoxazole (BAC	NE)	Ceftiaxome (ROCEPHINE) Ofloxacine (OFLOCET) Autre (préciser):
Immunodépression	Non Diabète Autre (préciser)		nale Maladie ond	ologique Médic	caments immunodépresseurs