

Suites et Séries – TD₂

19-20 septembre 2022

Exercice 1

Dans chacun des cas, donner un exemple d'une suite réelle qui est :

1. décroissante, positive et qui ne tend pas vers 0 ;
2. bornée et non convergente ;
3. positive, non bornée et ne tendant pas vers $+\infty$;
4. non monotone et qui tend vers 0 ;
5. positive, qui tend vers 0 et qui n'est pas décroissante.

Exercice 2

Dans chacun des cas, déterminer un équivalent le plus simple possible quand $n \rightarrow +\infty$ de la suite de terme général :

1. $5n^3 - 2n + 4$;
2. $\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n-1}$;
3. $\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}$;
4. $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$;
5. $\cos\left(\pi\sqrt{1+n^2}\right)$.

Exercice 3

Soit $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_n = \frac{1}{n^2}.$$

En revenant à la définition de la limite d'une suite, montrer que u converge vers 0.

Exercice 4

Soient $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $v = (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites à valeurs dans $[0, 1]$. Montrer que si

$$u_n v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1.$$

alors u et v convergent vers 1 (*indication : on pourra raisonner par l'absurde*).

Exercice 5

Soit $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de nombres réels. Posons

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad v_n = \frac{u_1 + \cdots + u_n}{n}.$$

La suite $v = (v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ s'appelle la *suite des moyennes de Cesàro* de u .

1. (a) Montrer que si u converge vers $\ell \in \mathbb{R}$, alors v converge vers ℓ .
 (b) La réciproque est-elle vraie ?
 (c) Montrer que si

$$u_{n+1} - u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \in \mathbb{R}$$

alors

$$\frac{u_n}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell.$$

2. (a) Dans cette question on suppose que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$. Montrer que si

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell > 0,$$

alors $(\sqrt[n]{u_n})_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers ℓ .

- (b) En déduire la limite de la suite $p = (p_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad p_n = \left(\frac{2n}{n} \right)^{\frac{1}{n}}.$$

3. (a) Soit $w = (w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de nombres réels strictement positifs telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad w_{n+1} = \sqrt{\sum_{k=0}^n w_k}.$$

Montrer que

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1.$$

- (b) En déduire un équivalent de w .

Exercice 6

Soient $a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $b = (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites de nombres réels strictement positifs telles que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \quad \text{et} \quad b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}.$$

Montrer que les suites a et b sont adjacentes.