ESTUDO DIRIGIDO – UC Técnicas Cirúrgicas

Profa. MSc. Amanda Feitoza

ALUNO: _____

A prática da cirurgia oral menor exige do cirurgião-dentista conhecimento sobre biossegurança, avaliação sistêmica do paciente e prescrição medicamentosa adequada. Considerando esses aspectos, responda às questões a seguir. Analise cada questão com atenção e assinale a alternativa correta.

ATENÇÃO E BOA SORTE! :)

QUESTÃO 1. A biossegurança na prática odontológica tem como principal objetivo:

a) Reduzir custos operacionais do consultório.
b) Controlar e prevenir riscos biológicos durante o atendimento.
c) Aumentar a produtividade clínica.
d) Substituir o uso de medicamentos antimicrobianos.

QUESTÃO 2. Durante procedimentos cirúrgicos odontológicos, qual conjunto de EPIs é essencial para proteção do profissional?

a) Apenas luvas.
b) Máscara cirúrgica, óculos de proteção, gorro e luvas.
c) Apenas máscara.
d) Apenas avental.

QUESTÃO 3. A antissepsia extrabucal da região perioral antes de procedimentos cirúrgicos pode ser realizada com:

a) Soro fisiológico.
b) Digluconato de clorexidina 2%.
c) Digluconato de clorexidina 0,12%.
d) Água destilada.
e) Álcool absoluto.

QUESTÃO 4. O método mais seguro e utilizado para esterilização de instrumentais odontológicos é:

a) Água fervente.
b) Autoclave.
c) Estufa doméstica.
d) Álcool 70%.

QUESTÃO 5. A higienização das mãos antes e após procedimentos clínicos é considerada:

a) Opcional.
b) Fundamental na prevenção de infecção cruzada.
c) Necessária apenas após cirurgias.
d) Necessária apenas no início do expediente.

QUESTÃO 6. A anamnese no pré-operatório odontológico tem como principal finalidade:

a) Reduzir o tempo da consulta.
b) Identificar condições sistêmicas que possam interferir no procedimento.
c) Substituir o exame clínico.

d) Evitar exames complementares.

QUESTÃO 7. Pacientes com hipertensão arterial não controlada apresentam maior risco de:

a) Fraturas ósseas.
b) Hemorragia e complicações cardiovasculares.
c) Hipersensibilidade dentária.
d) Infecção local.

QUESTÃO 8. Antes de realizar uma exodontia, o cirurgião-dentista deve avaliar:

a) Apenas a radiografia.
b) Apenas o dente.
c) Condições sistêmicas, medicamentos em uso e exame clínico.
d) Apenas a idade do paciente.

QUESTÃO 9. Pacientes em uso de anticoagulantes devem:

a) Suspender o medicamento por conta própria.
b) Realizar cirurgia normalmente sem avaliação.
c) Ser avaliados quanto ao risco de sangramento e, se necessário, ter parecer médico.
d) Não realizar procedimentos odontológicos.

QUESTÃO 10. A Classificação ASA é utilizada para:

a) Classificar as soluções anestésicas.
b) Avaliar o estado de físico e risco cirúrgico do paciente.
c) Classificar tipos de sutura.
d) Classificar infecções odontogênicas.

QUESTÃO 11. O objetivo da analgesia perioperatória é:

a) Prevenir e controlar a dor relacionada ao procedimento cirúrgico.
b) Combater infecções bacterianas.
c) Reduzir ansiedade do paciente.
d) Evitar anestesia local.

QUESTÃO 12. A Dexametasona 4 mg prescrita no pré-operatório tem como principal função:

a) Controle da pressão arterial.
b) Redução do edema e inflamação pós-operatória.
c) Controle da dor aguda.
d) Ação antibacteriana (Profilaxia antibiótica).

QUESTÃO 13. Analgésicos frequentemente indicados em cirurgias odontológicas simples incluem:

a) Amoxicilina.
b) Dipirona ou Paracetamol.
c) Metronidazol.
d) Cefalexina.

QUESTÃO 14. A associação de Amoxicilina e Metronidazol pode ser indicada em casos de:

a) Infecções odontogênicas mais extensas.
b) Dor muscular (Ex.: DTM).
c) Cárie dentária extensa.

d) Trauma oclusal.

QUESTÃO 15. Uma prescrição medicamentosa odontológica deve conter obrigatoriamente:

a) Apenas o nome do medicamento.
b) Nome do medicamento, dose, posologia, identificação e assinatura do profissional.
c) Apenas a assinatura do prescritor.
d) Apenas a dose da medicação e tempo de uso.

QUESTÃO 16. Paciente de 22 anos procura atendimento odontológico relatando dor na região posterior da mandíbula. Ao exame clínico observa-se terceiro molar inferior parcialmente erupcionado, com presença de inflamação no tecido gengival que recobre parcialmente a coroa do dente, além de edema e sensibilidade à palpação. A hipótese diagnóstica é pericoronarite. Qual a conduta inicial mais adequa

da?

a) Realizar exodontia imediata.
b) Prescrever antibiótico e anti-inflamatório e reavaliar posteriormente.
c) Apenas prescrever analgésico para controle da dor.
d) Não realizar tratamento e aguardar regressão do quadro.

QUESTÃO 17. Antes da extração de um molar com indicação de exodontia, o exame complementar mais indicado é:

a) Hemograma.
b) Radiografia periapical.
c) Ultrassonografia.
d) Eletrocardiograma.

QUESTÃO 18. Paciente retorna ao consultório três dias após a realização de uma exodontia, relatando dor intensa na região operada. Ao exame clínico observa-se ausência de coágulo no alvéolo dentário e presença de odor fétido local. Diante desse quadro clínico, qual é o diagnóstico mais provável?

a) Abscesso periodontal.
b) Alveolite.
c) Parestesia.
d) Hemorragia.

QUESTÃO 19. Após a realização de uma exodontia, o paciente apresenta sangramento persistente na região do alvéolo dentário. Diante dessa situação clínica, qual deve ser a primeira conduta do cirurgião-dentista para controle do sangramento?

a) Prescrever antibiótico.
b) Realizar compressão local com gaze estéril.
c) Realizar nova exodontia.
d) Prescrever anti-inflamatório.

QUESTÃO 20. Após extração de terceiro molar inferior, o paciente relata dormência no lábio inferior. Essa complicação pode estar relacionada a:

a) Lesão do nervo alveolar inferior.
b) Infecção local.
c) Fratura dentária.
d) Trauma oclusal.