

武汉大学 2011-2012 学年第二学期期末考试
高等数学 B2 (A 卷答题卡)

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

一、(8') 已知 $\vec{a} = \vec{i}, \vec{b} = \vec{j} - 2\vec{k}, \vec{c} = 2\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$, 求一单位向量 \vec{m} , 使 $\vec{m} \perp \vec{c}$, 且 \vec{m} 与 \vec{a}, \vec{b} 共面。

二、(11') 设 $f(x, y) = \sqrt[3]{x^2 y}$, 问 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点: (1) 是否连续? (2) 偏导数是否存在? (3) 是否可微?

三、(8') 设函数 $y = y(x)$ 由方程组 $\begin{cases} y = f(x, t) \\ t = F(x, y) \end{cases}$ 所确定, 求 $\frac{dy}{dx}$ (假定隐函数定理条件满足)。

四、(8') 设 $z = u(x, y)e^{ax+by}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 0$, 试确定常数 a, b 使 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} + z = 0$.

五、(10') 求函数 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 在条件 $a_1x + a_2y + a_3z = 1$ ($a_i > 0, i = 1, 2, 3$) 下的最小值。

六、(8') 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} x^3 y^2 z dV$, Ω 为马鞍面 $z = xy$ 与平面 $y = x, x = 1, z = 0$ 所包围的空间区域。

七、(8') 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} [\frac{1}{2^n} + (-2)^n](x+1)^n$ 的收敛域。

八、(8') 求二重积分 $I = \iint_D |x^2 + y^2 - 4| dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 16\}$.

九、(10') 计算曲面积分 $\iint_S (2x + z) dy dz + z dx dy$, 其中 S 为有向曲面 $z = x^2 + y^2 (0 \leq z \leq 1)$, 其法向量与 z 轴正向的夹角为锐角.

十、(11') 已知 L 是第一象限中从点 $O(0,0)$ 沿圆周 $x^2 + y^2 = 2x$ 到点 $A(2,0)$, 再沿圆周 $x^2 + y^2 = 4$ 到点 $B(0,2)$ 的曲线段, 计算曲线积分 $I = \int_L 3x^2 y dx + (x^3 + x - 2y) dy$.

十一、(10') 将函数 $f(x) = 1 - x^2 (0 \leq x \leq \pi)$ 展开成余弦级数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 的和。

武汉大学 2011-2012 学年第二学期

《高等数学 B2》(A 卷) 标准答案

一、(8 分)(每个划线部分 2 分)解: 设 $\vec{m} = (x, y, z)$, 则 $\vec{m} \perp \vec{c}$ 意味着 $2x - 2y + z = 0$, \vec{m} 与 \vec{a}, \vec{b} 共面意味着

$$\begin{vmatrix} x & y & z \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 0 \text{ 得 } z = -2y, \text{ 单位向量 } \vec{m} \text{ 意味着 } x^2 + y^2 + z^2 = 1, \text{ 解上述三个方程得 } \vec{m} = \pm \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3} \right).$$

二、(11 分)解: $\lim_{x \rightarrow 0, y \rightarrow 0} f(x, y) = f(0, 0) = 0$, 所以 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点连续,4 分

$$f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0 = f_y(0, 0), \text{ 所以偏导数存在,4 分}$$

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\Delta z - f_x(0, 0)\Delta x - f_y(0, 0)\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{(\Delta x)^{\frac{2}{3}}(\Delta y)^{\frac{1}{3}}}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}}, \text{ 取 } \Delta y = k\Delta x \text{ 求该极限, 可知极限不存在,}$$

所以不可微。.....3 分

$$\text{三、(8 分) 解: } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial x} e^{ax+by} + aue^{ax+by}, \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial y} e^{ax+by} + bue^{ax+by}, \text{4 分}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} e^{ax+by} + b \frac{\partial u}{\partial x} e^{ax+by} + a \frac{\partial u}{\partial y} e^{ax+by} + abu^{ax+by} = b \frac{\partial u}{\partial x} e^{ax+by} + a \frac{\partial u}{\partial y} e^{ax+by} + abue^{ax+by}, \text{2 分}$$

$$\text{而 } \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} + z = (b-1) \frac{\partial u}{\partial x} + (a-1) \frac{\partial u}{\partial y} + (ab-a-b+1)u = 0, \text{ 由}$$

$u = F(x) + G(y)$ (F, G 任意) 可知只有系数 $a=1, b=1$2 分

$$\text{四、(8 分) 在 } y = f(x, F(x, y(x))) \text{ 两边同时关于 } x \text{ 求导, 可得 } \frac{dy}{dx} = f_x + f_t \left(\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{dy}{dx} \right), \text{5 分}$$

$$\text{整理得 } \frac{dy}{dx} = \frac{f_x + f_t F_x}{1 - f_t F_y} \text{3 分}$$

五、(10 分) 解: 做 Lagrange 函数 $F(x, y, z, \lambda) = x^2 + y^2 + z^2 - \lambda(a_1x + a_2y + a_3z - 1)$, 求导得

$$\begin{cases} F_x(x, y, z, \lambda) = 2x - a_1\lambda = 0 \\ F_y(x, y, z, \lambda) = 2y - a_2\lambda = 0 \\ F_z(x, y, z, \lambda) = 2z - a_3\lambda = 0 \\ a_1x + a_2y + a_3z = 1 \end{cases} \text{5 分}$$

$$\lambda = \frac{2}{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}, x = \frac{a_1}{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}, y = \frac{a_2}{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}, z = \frac{a_3}{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}, \text{4 分}$$

所以 $F_{\min} = \frac{1}{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$ 1 分

六、(8 分) 解: 原式 $= \int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^{xy} x^3 y^2 z dz$ 4 分 $= \frac{1}{110}$ 4 分

七、(8 分) 解: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} (x+1)^n$ 的收敛半径为 $R_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = 2$, $\sum_{n=1}^{\infty} (-2)^n (x+1)^n$ 的收敛半径为

$$R_2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \frac{1}{2} \text{ 4'}$$

故原级数的收敛半径为 $R = \min\{R_1, R_2\} = \frac{1}{2}$, 收敛区间则为 $(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2})$, 2'

当 $x = -\frac{3}{2}$ 时, 级数发散, 当 $x = -\frac{1}{2}$ 时, 级数发散, 所以收敛域为 $(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2})$ 2'

八、(8 分) 解: $I = \iint_D |x^2 + y^2 - 4| dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 (4 - r^2) r dr + \int_0^{2\pi} d\theta \int_2^4 (r^2 - 4) r dr$ 6 分 $= 80\pi$ 2 分

九、(10 分) 解一: 补充平面 $S_1: z=1$, 法向量向下, 形成封闭区域 Ω , 由 Gauss 公式得

$$\iint_S (2x+z) dy dz + z dx dy = -3 \iiint_{\Omega} dx dy dz = -3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_{x^2}^1 dz = -\frac{3}{2} \pi, \text{ 5'}$$

再计算平面 $z=1$ 上的曲面积分 $\iint_{S_1} (2x+z) dy dz + z dx dy = \iint_{\{x^2+y^2 \leq 1\}} dx dy = \pi$, 4'

综合得 $I = -\frac{\pi}{2}$ 1'

解二: 用投影法求解, 这里 $z_x' = 2x, z_y' = 2y$ 2'

原式 $= \iint_S [(2x+z)(-2x)+z] dx dy = - \iint_S (z-2xz-4x^2) dx dy = \iint_D (x^2+y^2-2x(x^2+y^2)-4x^2) dx dy$ 3'

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (r^2 - 2r^3 \cos \theta - 4r^2 \cos^2 \theta) r dr = -\frac{\pi}{2} \text{ 5'}$$

十、(11') 解: ① $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = (3x^2+1-3x^2) = 1$, 2'

② 曲线 L 不封闭, 添加辅助线 L_1 : 沿 y 轴由点 $B(0,2)$ 到点 $O(0,0)$,

$$\int_{L_1} 3x^2 y dx + (x^3 + x - 2y) dy = \int_{L_1} Q(0, y) dy = \int_2^0 -2y dy = 4, \text{ 3'}$$

③ 在封闭区域上运用 Green 公式, 可得

$$\int_{L \cup L_1} 3x^2 y dx + (x^3 + x - 2y) dy = \iint_D 1 dx dy = \frac{1}{4} \pi \cdot 2^2 - \frac{1}{2} \pi \cdot 1^2 = \frac{\pi}{2}, \text{ 4'}$$

因此 $I = \int_L 3x^2 y dx + (x^3 + x - 2y) dy = \frac{\pi}{2} - 4$ 2'

$$\begin{aligned}
 \text{十一、(10')} \quad a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \cos nxdx = \frac{2}{\pi} \left(\int_0^\pi \cos nxdx - \int_0^\pi x^2 \cos nxdx \right) = \frac{2}{\pi} \left(-\int_0^\pi x^2 \cos nxdx \right) \\
 &= \frac{2}{\pi} \cdot \frac{2\pi(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{4(-1)^{n-1}}{n^2}, \quad \text{.....4'} \qquad a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x)dx = 2\left(1 - \frac{\pi^2}{3}\right), \quad \text{.....2'}
 \end{aligned}$$

$$\text{所以 } 1 - x^2 = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx = 1 - \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^{n-1}}{n^2} \cos nx, \quad \text{.....2'}$$

$$\text{取 } x=0, \text{ 得 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12} \quad \text{.....2'}$$

满绩小铺QQ: 1433397577