

西南交通大学 2018 —2019 学年第(一)学半期考试

课程代码 6010500 课程名称 线性代数 B 考试时间 90 分钟

题号	一	二	三	四	总成绩
得分					

阅卷教师签字: _____

一、选填空题（每空 5 分，共 25 分）

1. 设 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 0 \end{vmatrix}$, A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式, 则 $A_{31} + A_{32} + A_{33} + 2A_{34} = \underline{-12}$.

2. 设 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ 均为四维列向量, 记 $A = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4), B = (\gamma_1 + 2\gamma_2, 3\gamma_1 + 4\gamma_3, \gamma_2, \gamma_4)$, 如果 $|A| = 4$, 则 $|B| = \underline{-16}$.

3. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 7 & 9 \\ 6 & 5 & 4 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 则 $P^{2018}AP^{2019} = \underline{\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -2 & 9 & 7 \\ 6 & 4 & 5 \end{pmatrix}}$.

4. 设 A, B 均为三阶方阵, 且 $|A| = 2, |B| = 3$ 则 $|-A^2B^3| = \underline{-108}$.

5. 计算行列式 $\begin{vmatrix} 1717 & 1708 \\ 2828 & 2819 \end{vmatrix} = \underline{9999}$.

二、选择题（每空 5 分，共 15 分）

1. 设 A, B 为三阶方阵, 则下述结论正确的是 (C)

- A. A 或 B 可逆, 则 AB 可逆 B. A 且 B 可逆, 则 $A+B$ 可逆
C. A 或 B 不可逆, 则 AB 不可逆 D. A 与 B 不可逆, 则 $A+B$ 不可逆

2. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A^3 =$ (D)

A. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 4 & 4 \end{pmatrix}$

3. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & \lambda & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 7 & 9 \end{pmatrix}$, 当 A 的秩为 2 时, $\lambda =$ (B)

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

三、计算题 (每题 10 分, 共 40 分)

1. 计算行列式 $D_n = \begin{vmatrix} a+b & b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a & a+b & b & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a & a+b & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a+b & b \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & a+b \end{vmatrix}$

解: 按第一行展开得

$$D_n = (a+b)D_{n-1} - abD_{n-2}, \text{-----}5$$

$$\text{故 } D_n - aD_{n-1} = b(D_{n-1} - aD_{n-2}) = \cdots = b^{n-2}(D_2 - aD_1) = b^n \quad (1) \text{-----}8$$

由 a, b 的对称性知

$$D_n - bD_{n-1} = a^n \quad (2)$$

由 (1) 与 (2) 得

当 $a \neq b$ 时 $D_n = \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a - b}$. -----10

当 $a = b$ 时 $D_n = aD_{n-1} + a^n = a^n + a(aD_{n-2} + a^{n-1}) = 2a^n + a^2D_{n-2} = \cdots = (n+1)a^n$. -----11

法二，由 (1) 得

$$D_n = aD_{n-1} + b^n = a(aD_{n-2} + b^{n-1}) + b^n = a^2D_{n-2} + ab^{n-1} + b^n = \cdots \\ = a^n + a^{n-1}b + a^{n-2}b^2 + \cdots + ab^{n-1} + b^n.$$
 --11

2. 设 $f(x) = x^2 - x + 1$, $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, 求 $[f(A)]^T$.

解：依定义得：

$$f(A) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}^2 - \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 1 & 3 \\ 8 & 2 & 3 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \text{-----9}$$

故

$$[f(A)]^T = \begin{pmatrix} 7 & 1 & 3 \\ 8 & 2 & 3 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 7 & 8 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 0 \end{pmatrix} \text{-----11}$$

3. 已知 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$, 求解方程 $AX + B = X$.

解 因为 $AX + B = X$, 所以 $(E - A)X = B$,

又 $E - A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 且 $|E - A| \neq 0$

则 $E - A$ 可逆且 $X = (E - A)^{-1}B$ -----9

因此, $X = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 5 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. -----11

4. 解非齐次线性方程组
$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 = -2 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 = 1 \end{cases}.$$

解
$$B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{-----6}$$

方程组解为
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{-----11}$$

四、证明题（每题 8 分，共 16 分）

1. 设三阶方阵 A 满足 $A^2 - A - 2E = O$, 证明 A 及 $A + 2E$ 都可逆, 并求 A^{-1} 及 $(A + 2E)^{-1}$.

证明: 由 $A^2 - A - 2E = O$ 得 $A^2 - A = 2E$, 两端同时取行列式: $|A^2 - A| = 8$

即 $|A||A - E| = 8$, 故 $|A| \neq 0$ 所以 A 可逆. -----2

而 $A + 2E = A^2$, $|A + 2E| = |A^2| = |A|^2 \neq 0$ 故 $A + 2E$ 也可逆. -----4

由 $A^2 - A - 2E = O \Rightarrow A(A - E) = 2E \Rightarrow A^{-1}A(A - E) = 2A^{-1}E \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{2}(A - E)$ -----7

又由 $A^2 - A - 2E = O \Rightarrow (A + 2E)A - 3(A + 2E) = -4E \Rightarrow (A + 2E)(A - 3E) = -4E$

$\therefore (A + 2E)^{-1}(A + 2E)(A - 3E) = -4(A + 2E)^{-1}$

$\therefore (A + 2E)^{-1} = \frac{1}{4}(3E - A)$ -----10

2. 设 n 阶矩阵 A 的伴随矩阵为 A^* , 证明:

(1) 若 $|A| = 0$, 则 $|A^*| = 0$;

(2) $|A^*| = |A|^{n-1}$.

证明 (1) 用反证法证明. 假设 $|A^*| \neq 0$ 则有 $A^*(A^*)^{-1} = E$ -----3

由此得 $A = AA^*(A^*)^{-1} = |A|E(A^*)^{-1} = O \therefore A^* = O$ -----5

这与 $|A^*| \neq 0$ 矛盾, 故当 $|A| = 0$ 时有 $|A^*| = 0$.

(2) 由于 $A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*$, 则 $AA^* = |A|E$ 取行列式得到: $|A||A^*| = |A|^n$ -----8

若 $|A| \neq 0$ 则 $|A^*| = |A|^{n-1}$ -----9

若 $|A| = 0$ 由(1)知 $|A^*| = 0$ 此时命题也成立-----10 故有 $|A^*| = |A|^{n-1}$.