

# Топология

Никита Латушкин

10 января 2022 г.

## 1 **Понятие МП.** Изометрия. Подпространство в МП. Примеры

Метрикой на множестве  $X$  называют функцию  $\rho(x, y)$ , то есть отображение  $\rho : X \times X \rightarrow R$ , которое обладает следующими свойствами:

- 1)  $\rho(x, y) \geq 0, \rho(x, y) = 0 \iff x = y$
- 2)  $\rho(x, y) = \rho(y, x)$
- 3)  $\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(y, z) \quad \forall x, y, z \in X$

$(X, \rho)$  - метрическое пространство (МП)

### Примеры:

- 1) Евклидова метрика в  $R^n$

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

- 2) Дискретная метрика на прямой  $R$ :

$$\delta(x, y) = \begin{cases} 1, & x \neq y \\ 0, & x = y \end{cases}$$

- 3) В  $R^n$

$$\mu(x, y) = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i|$$

- 4) Метрика равномерной сходимости на  $C[0; 1]$  (множество всех непрерывных на  $[0; 1]$  функций):

$$\mu(f, g) = \max_{x \in [0; 1]} |f(x) - g(x)|$$

5) Метрика интегральной сходимости на  $C[0;1]$

$$\sigma_k(f, g) = \sqrt[k]{\int_0^1 |f(x) - g(x)|^k dx}$$

Но мы будем рассматривать только при  $k=1$ , то есть

$$\sigma_1(f, g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx$$

Пусть даны МП  $(X, \rho), x \in X$ .

1) **Открытым шаром** с центром в точке  $x$  и радиуса  $\epsilon$  называется множество

$$B(x, \epsilon) = \{y \in X | \rho(x, y) < \epsilon\}$$

2) **Замкнутым шаром** с центром в точке  $x$  и радиуса  $\epsilon$  называется множество

$$D(x, \epsilon) = \{y \in X | \rho(x, y) \leq \epsilon\}$$

3) **Сферой** с центром в точке  $x$  и радиуса  $\epsilon$  называется множество

$$S(x, \epsilon) = \{y \in X | \rho(x, y) = \epsilon\}$$

Пусть  $X$  и  $Y$  – МП с метриками  $\rho_1$  и  $\rho_2$  соответственно. **Изометрией** между  $X$  и  $Y$  называется биекция  $f : X \rightarrow Y$  такая, что  $\forall x, y \in X$  имеет место равенство:  $\rho_1(x, y) = \rho_2(f(x), f(y))$ . Если изометрия между МП существует, то они называются **изометричными**.

### Примеры


1)  $R^k$  изометрично вкладывается в  $R^n$  при  $k \leq n$

Пусть  $x = (x_1, \dots, x_k) \in R^k$ . Поставим точке  $x$  в соответствие точку  $x' = (x_1, \dots, x_k, 0, \dots, 0)$  (добавили в координаты  $(n-k)$  нулей)

2)  $(X, \delta)$  изометрично вкладывается в  $R^n$  при  $|X| \leq n + 1$

Случай  $n = 2$ :

Точкам из пространства  $(X, \delta)$  ставим в соответствие вершины правильного треугольника со стороной 1, лежащего в  $R^2$ :



Случай  $n = 3$ :

Точкам из пространства  $(X, \delta)$  ставим в соответствие вершины правильного тетраэдра с ребром 1, лежащего в  $R^3$ .

В общем случае, точкам пространства  $(X, \delta)$  в соответствие надо ставить вершины  $n$ -мерного симплекса со стороной 1.

Пусть даны  $(X, \rho)$ ,  $A \subset X$ . Рассмотрев метрику  $\rho$  только на точках множества  $A$ , получим метрику на  $A$ , которая называется **индуцированной** и обозначается  $\rho|_A$ . Таким образом получаем МП  $(A, \rho|_A)$ , которое является **подпространством** МП  $(X, \rho)$

## 2 Топология МП. Свойства открытых и замкнутых множеств в МП. Примеры

Семейство всех открытых множеств  $\tau$  называется **топологией** МП.

Пусть даны МП  $(X, \rho)$ ,  $U \subset X$ . Множество  $U$  называется **открытым**, если с каждой своей точкой оно содержит какую-то её окрестность.

**Обозначение:**  $U \subset_{op} X$

### Свойства открытых множеств

- 1)  $\emptyset \in \tau, X \in \tau$
- 2) Объединение любого числа открытых множеств открыто
- 3) Пересечение любого **конечного** числа открытых множеств открыто

Пусть даны МП  $(X, \rho), B \subset X$ . Множество  $B$  называется **замкнутым**, если его дополнение  $X \setminus B$  открыто.

**Обозначение:**  $B \subset_{cl} X$

$\phi$  – семейство всех замкнутых множеств

### Свойства замкнутых множеств

- 1)  $\emptyset \in \phi, X \in \phi$
- 2) Пересечение любого числа замкнутых множеств замкнуто
- 3) Объединение любого **конечного** числа замкнутых множеств замкнуто

#### Пример

В МП  $(X, \rho)$  открытый шар – открытое множество, замкнутый шар – замкнутое множество.

## 3 Понятие ТП. Примеры. Метризуемые ТП

Пусть  $X$  – некоторое множество, семейство  $\tau \subset 2^X$  – называется топологией на  $X$ , а элементы  $\tau$  – открытыми множествами  $U \subset_{op} X$ , если:

- 1)  $\emptyset \in \tau, X \in \tau$
  - 2) Объединение любого числа открытых множеств открыто
  - 3) Пересечение любого конечного числа открытых множеств открыто
- $(X, \tau)$  – топологическое пространство (ТП)

Пусть даны ТП  $(X, \tau), x \in X$ . Окрестностью точки  $x$  называется

$$\forall U \subset_{op} X, x \in U$$

**На любом множестве  $X$  можно задать следующие топологии:**

- 1)  $\tau^0 = \{\emptyset, X\}$  – антидискретная топология. В ней открытыми являются только пустое множество и всё пространство  $X$
- 2)  $\tau^* = 2^X$  – дискретная топология. В ней открытым является любое подмножество  $X$

3)  $\tau_F = \{\emptyset, X, X \setminus A \mid |A| < \infty\}$  – топология Зарисского. В ней открытыми являются пустое множество, всё пространство  $X$ , и любое множество, полученное выбрасыванием из  $X$  конечного числа элементов

4)  $\tau_C = \{\emptyset, X, X \setminus A \mid |A| \leq \omega\}$ . В ней открытыми являются пустое множество, всё пространство  $X$ , и любое множество, полученное выбрасыванием из  $X$  счётного числа элементов.

ТП  $(X, \tau)$  называется **метризуемым**, если  $\tau$  можно задать некоторой метрикой  $\rho$

В таком случае пишут  $\tau = \tau_\rho$

#### Примеры

1)  $\forall$  МП – метризуемое ТП

2) ТП с дискретной топологией метризуемо дискретной метрикой

## 4 **ФСО**. Задание топологии через ФСО. Примеры

Пусть дано ТП  $X$ , каждой точке  $x \in X$  поставим в соответствие непустое семейство окрестностей этой точки  $\nu_x = \{V_t^x \mid t \in T_x\}$ ,  $T_x$  – семейство индексов, которыми занумерованы окрестности (не обязательно целые)

$V_t^x$  – элементарная (базовая) окрестность точки  $x$

$\nu = \{V_t^x \mid x \in X, t \in T_x\}$  – окрестностная база, или фундаментальная система окрестностей (ФСО)

#### Аксиомы ФСО

1)  $\forall x \in X$  семейство непусто,  $\forall V_t^x \in \nu_x : x \in V_t^x$

2)  $\forall V_t^x, V_{t'}^x \in \nu_x : \exists V_{t''}^x : V_{t''}^x \subset (V_t^x \cap V_{t'}^x)$  – для двух любых элементарных окрестностей найдётся третья, которая лежит в их пересечении.

3)  $y \in V_t^x \iff \exists V_{t'}^y \subset V_t^x$  – если точка  $y$  лежит в элементарной окрестности точки  $x$ , то найдётся элементарная окрестность точки  $y$ , которая целиком лежит в элементарной окрестности точки  $x$

**Если все аксиомы выполняются, то ФСО определена однозначно**

### Задание топологии через ФСО

Если в пространстве задана ФСО для некоторой топологии  $\tau$ , то топология определена однозначно и описывается как совокупность всех множеств  $U \in X$  таких, что  $\forall x \in U$  найдётся элементарная окрестность  $V_t^x \subset U$ , для которой выполняется условие  $V_t^x \subset U$ . Значит для задания топологии достаточно указать некоторую ФСО  $\nu$ .

## 5 Сравнение топологий. Роль ФСО. Примеры

Пусть  $\tau_1$  и  $\tau_2$  — некоторые топологии на пространстве  $X$ . Если  $\tau_1 \supset \tau_2$ , то говорят, что  $\tau_1$  сильнее  $\tau_2$ , или  $\tau_2$  слабее  $\tau_1$  и пишут  $\tau_1 \geq \tau_2$ . Если же  $\tau_1 \supset \tau_2$ , причём  $\tau_1 \neq \tau_2$ , то говорят, что  $\tau_1$  существенно сильнее  $\tau_2$ , или  $\tau_2$  существенно слабее  $\tau_1$  и пишут  $\tau_1 > \tau_2$ . Но может оказаться так, что  $\tau_1 \not\supset \tau_2$  и  $\tau_2 \not\supset \tau_1$ . Тогда говорят, что  $\tau_1$  и  $\tau_2$  несравнимы.

### Признак сравнения топологий с помощью ФСО

Пусть топологии  $\tau_1$  и  $\tau_2$  на множестве  $X$  порождены некоторыми ФСО  $\nu_1 = \{V_\alpha^x | x \in X, \alpha \in A_x\}$  и  $\nu_2 = \{W_\beta^x | x \in X, \beta \in B_x\}$ ,  $A_x, B_x$  — семейства индексов.

$\tau_1 \geq \tau_2 \iff \forall x \in X, W_\beta^x \in \nu_2 \exists V_\alpha^x \in \nu_1 : V_\alpha^x \subset W_\beta^x$ , то есть для любой точки  $x$  из  $X$  и её окрестности  $W_\beta^x$  из ФСО  $\nu_2$  найдётся такая окрестность  $V_\alpha^x$  из ФСО  $\nu_1$ , что  $V_\alpha^x$  целиком лежит в  $W_\beta^x$ .

### Примеры

1) На любом пространстве  $X$ :  $\tau^* > \tau^0$

Действительно,  $\emptyset$  и  $X$ , открытые в топологии  $\tau^0$ , будут открыты и в  $\tau^*$ , но обратное неверно, так как открытое в  $\tau^*$  одноточечное подмножество не будет открытым в  $\tau^0$ .

2) На  $R^2$ :  $\tau^\infty > \tau^2$  (пример на сравнение с помощью ФСО)

$\forall x \in R^2, \epsilon > 0$  "бабочка" радиуса  $\epsilon$  лежит в открытом шаре такого же радиуса, но обратное неверно, то есть открытый шар радиуса  $\epsilon$  не будет лежать ни в какой бабочке с центром в этой же точке.

## 6 **Понятие базы топологии, 1 аксиомы счётности и сепарабельности и их взаимосвязь.**

### **Примеры**

Пусть дано ТП  $(X, \tau)$

Семейство  $\beta \subset X$  открытых в  $X$  множеств называется **базой топологии**, если  $\forall U \subset X$  найдётся подсемейство  $\gamma \subset \beta$  такое, что  $U = \bigcup_{or} \gamma$ , то есть любое открытое множество  $U$  представимо в виде объединения некоторых элементов  $\beta$ .

**Любая ФСО автоматически база**

**Локальной базой** в точке  $x$  пространства  $X$  (**локальной базой точки  $x$** ) называется семейство  $\beta(x)$  окрестностей точки  $x$  такое, что  $\forall U \in \tau(x) \exists V \in \beta(x) : x \in V, V \subset U$ .

Пусть дано ТП  $(X, \tau)$ . Говорят, что  $X$  **удовлетворяет первой аксиоме счётности**, если  $\forall x \in X$  существует конечная или счётная локальная база в точке  $x$ .

Пусть даны ТП  $(X, \tau)$ ,  $A \subset X$

**$A$  всюду плотно** в  $X$  тогда и только тогда, когда

$$\forall U \in \tau(x) : U \cap A \neq \emptyset$$

ТП  $(X, \tau)$  называется **сепарабельным**, если оно содержит конечное или счётное множество, всюду плотное в  $X$ .

### **Теорема**

Пусть дано ТП  $(X, \tau)$ . Если  $X$  имеет счётную базу, то оно сепарабельно.

## 7 Операция замыкания и её свойства. Примеры

Пусть даны ТП  $(X, \tau)$ ,  $A \subset X$ ,  $x \in X$ .

Точка  $x$  называется **близкой** или **точкой прикосновения**, если  $\forall U \in \tau(x) : U \cap A \neq \emptyset$

Множество всех точек, близких для  $A$ , называется **замыканием** множества  $A$  (**обозначение**  $\overline{A}$  )

Свойства операции замыкания

- 1)  $\overline{A} \subset_{cl} X$
- 2)  $A \subset F \subset_{cl} X \implies \overline{A} \subset F$
- 3)  $A \subset_{cl} X \iff \overline{A} = A$

**Примеры**

1) В  $R$   $A = (0; 1) \implies \overline{A}^R = [0; 1]$

2) В  $R$   $A = Q$   
 $\overline{A} = R$

3) ТП  $(X, \tau)$ ,  $A \subset X$ ,  $A$  – всюду плотно.  
 $\overline{A} = X$



## 8 Внутренность и граница множества. Связь с операцией замыкания. Примеры

Пусть даны ТП  $(X, \tau)$ ,  $A \subset X$ ,  $x \in X$ .

Точка  $x$  называется **внутренней**, если  $\exists U \in \tau(x) : U \subset A$

Множество всех точек, внутренних для  $A$ , называется его **внутренностью**. (обозначение  $\text{int}A$ )

Свойства операции внутренности

- 1)  $\text{int}A \subset X$
- 2)  $X \supset \underset{op}{U} \subset A \implies U \subset \text{int}A$
- 3)  $A \subset \underset{op}{X} \iff \text{int}A = A$
- 4) Вычислительная формула  
 $\text{int}A = X \setminus \overline{(X \setminus A)}$

Пусть даны ТП  $(X, \tau)$ ,  $A \subset X$ ,  $x \in X$ .

Точка  $x$  называется **граничной**, если  $\forall U \in \tau(x)$

$$\begin{cases} U \cap A \neq \emptyset \\ U \cap (X \setminus A) \neq \emptyset \end{cases}$$

Множество всех граничных точек называется его **границей**. (обозначение  $\partial A$ )

Свойства границы

- 1)  $\partial A \subset \underset{cl}{X}$
- 2)  $\partial A = \overline{A} \cap \overline{X \setminus A}$
- 3)  $\overline{A} = (\text{int}A) \cup \partial A$ ,  $\text{int}A \cap \partial A = \emptyset$

### Примеры

- 1) В  $R$   $A = [0; 1]$

$$\text{int}_R A = (a; b)$$

$$\partial_R A = \{a; b\}$$

- 2) В  $R$   $A = Q$

$$\text{int}A = \emptyset$$

$$\partial A = R$$

## 9 Понятие подпространства в ТП. Индуцированная топология и её свойства. Примеры. "Теория относительности"

Пусть даны ТП  $(X, \tau)$ ,  $A \subset X$

$\tau|_A = \{U \cap A | U \in \tau\}$  – является топологией на  $A$  (**индуцированной**)  
 ТП  $(A, \tau|_A)$  – топологическое подпространство (ТПП) в ТП  $X$

### Теорема

Пусть даны ТП  $(X, \tau)$ ,  $A \subset X$ , ФСО  $\nu = \{V_t^x | x \in X, t \in T_x\}$ ,  $\beta$  – база, тогда:

- 1)  $\phi|_A = \{F \cap A | F \underset{op}{\subset} X\}$  – семейство всех замкнутых множеств в  $A$
- 2)  $\nu|_A = \{V_t^a | a \in A, t \in T_a\}$  – ФСО в  $A$
- 3)  $\beta|_A = \{V \cap A | V \in \beta\}$  – база в  $A$

### Следствие

- 1)  $X$  с первой аксиомой счётности  $\implies A$  с первой аксиомой счётности
- 2)  $X$  со счётной базой  $\implies A$  со счётной базой
- 3)  $X$  метризуемо и сепарабельно  $\implies A$  сепарабельно

### Теория относительности


Пусть даны ТП  $(X, \tau)$ ,  $B \subset A \subset X$

- 1)  $B \underset{op}{\subset} X \implies B \underset{op}{\subset} A$
- 1')  $B \underset{cl}{\subset} X \implies B \underset{cl}{\subset} A$
- 2)  $B \underset{op}{\subset} A \underset{op}{\subset} X \implies B \underset{op}{\subset} X$
- 2')  $B \underset{cl}{\subset} A \underset{cl}{\subset} X \implies B \underset{cl}{\subset} X$
- 3)  $U \underset{op}{\subset} X, F \underset{cl}{\subset} X \implies$

$$\begin{cases} (U \setminus F) \underset{op}{\subset} X \\ (F \setminus U) \underset{cl}{\subset} X \end{cases}$$

### Примеры

1)  $(X, \tau) = \mathbb{R}, A = \mathbb{Z}$




Фиксируем  $\forall n \in \mathbb{Z}, a, b$ , например  $n-1 < a < n, n < b < n+1$ .

$(a; b) \cap \mathbb{Z} = \{n\}$  (в интервале только одно целое число —  $n$ )


Если мы будем брать другие  $a$  и  $b$ , то в пересечении будем получать другие подмножества целых чисел (не обязательно состоящие из одного целого числа).

$$\tau^1|_Z = \tau^*$$

2)  $(\mathbb{R}^2, \tau), A = L$  — прямая



Если  $L \not\perp OX$ , то пересекая бабочку прямой, будем получать или один интервал (прямая а), или два (прямая b). Поэтому  $\tilde{\tau}|_L = \tau^1$  ( $L \not\perp OX$ )



Если же  $L \perp OX$ , то пересекая бабочку прямой, будем получать одну точку (центр бабочки), поэтому  $\tilde{\tau}|_L = \tau^*$  ( $L \perp OX$ )

## 10 Непрерывное отображение и его свойства.

### Примеры

Пусть даны ТП  $(X, \tau)$  и  $(Y, \tau')$  и  $f : X \rightarrow Y$ .

$f$  непрерывно в точке  $x \iff \forall V \in \tau'(f(x)) \exists U \in \tau(x) : f(U) \subset V$

**Теорема (критерии непрерывности)**

Для  $f : X \rightarrow Y$  эквивалентны условия

- 1)  $f^{-1}$  – непрерывно
- 2)  $f^{-1}(V) \underset{op}{\subset} X \quad \forall V \underset{op}{\subset} Y$
- 3)  $f^{-1}(B) \underset{cl}{\subset} X \quad \forall B \underset{cl}{\subset} Y$

**Свойства непрерывных отображений**

Пусть даны ТП  $(X, \tau), (Y, \tau'), (Z, \tau'')$

- 1)  $f, g$  – непрерывны  $\implies g \circ f$
- 2)  $f$  – непрерывно  $\implies f|_A : A \rightarrow Y$  – непрерывно

### Примеры

1) Постоянное отображение  $f : X \rightarrow Y$ , которое отображает пространство  $X$  в некоторую фиксированную точку  $y_0 \in Y$ , то есть  $f(X) = \{y_0\}$ , непрерывно.

2) Отображение  $f : C[a; b] \rightarrow R, x \rightarrow f(x) = \int_a^b x(t)dt$  — непрерывно

$\forall x \in C[a; b], (f(x) - \epsilon; f(x) + \epsilon), \epsilon > 0$

Пусть  $\delta > 0, y \in B(x, \delta)$

$$|f(x) - f(y)| = \left| \int_a^b (x(t) - y(t))dt \right| \leq \int_a^b |x(t) - y(t)|dt < \int_a^b \delta dt = \delta(b - a)$$

$$\epsilon = \delta(b - a)$$

$$\delta = \frac{\epsilon}{b-a}$$

Если положить  $\delta = \frac{\epsilon}{b-a}$ , получим, что  $f(B(x, \delta)) \subset (f(x) - \epsilon; f(x) + \epsilon)$

## 11 Понятие гомеоморфизма. Примеры

Пусть даны ТП  $(X, \tau), (Y, \tau')$  и  $f : X \rightarrow Y$ .

$f$  — гомеоморфизм, если


1)  $f$  — биекция

2)  $f$  и  $f^{-1}$  непрерывны

При этом  $X$  и  $Y$  гомеоморфны (обозначение  $X \approx Y$ )

### Примеры

1)  $(0; 7) \approx R$




Изогнули интервал в полуокружность. Далее каждой точке  $x$  в соответствие ставим её центральную проекцию  $f(x)$  на  $\mathbb{R}$  (проводим луч из центра полуокружности в точку  $x$  из интервала,  $f(x)$  – пересечение луча и прямой  $\mathbb{R}$ ). Очевидно, что  $f$  биекция и что  $f$  непрерывно в обе стороны (для любого интервала в  $\mathbb{R}$  найдётся дуга окружности, образ которой лежит в этом интервале и наоборот: для любой дуги окружности найдётся интервал на  $\mathbb{R}$ , образ которого лежит внутри этой дуги).

Таким образом,  $(0; \pi) \approx \mathbb{R}$


$$2) B^n(x, \epsilon) \approx \mathbb{R}^n$$

Для начала покажем, что  $B^n(x, \epsilon) \approx B^n(0, 1)$ , а затем, что  $B^n(0, 1) \approx \mathbb{R}^n$  (композиция двух гомеоморфизмов – гомеоморфизм).

Каждую точку  $y \in B^n(x, \epsilon)$  отождествим с её радиус-вектором, имеющим начало в точке  $x$  и конец в точке  $y$ .



Определим отображение  $g : B^n(x, \epsilon) \rightarrow B^n(O, 1)$ ,  $O = (0, 0, \dots, 0)$  (н нулей):  $x \rightarrow O$ , для любой другой точки  $y \in B^n(x, \epsilon)$  делим её радиус-вектор на  $\epsilon$ , откладываем от точки  $O$ , конец этого вектора и есть точка  $g(y)$ .  $g$  – биекция и непрерывно в обе стороны, значит  $g$  – **гомеоморфизм**.



Опять каждую точку  $x \in B^n(0; 1)$  отождествляем с её радиус-вектором  $\vec{x}$ .

Определим отображение  $f : B^n(0; 1) \rightarrow R^n$ ,  $x \rightarrow \frac{\vec{x}}{1-|\vec{x}|}$ .

Очевидно, что  $f$  – биекция и  $f$  непрерывно в обе стороны (при  $|\vec{x}| = 1$  просто уходим в бесконечность). Значит  $f$  – **гомеоморфизм**.

Таким образом,  $g \circ f$  – гомеоморфизм, то есть  $B^n(x, \epsilon) \approx R^n$

3) Любая изометрия является гомеоморфизмом.

## 12 Аксиомы отделимости и их иерархия. Критерии регулярности и нормальности. Примеры

Пусть дано ТП  $(X, \tau)$ . ТП  $(X, \tau)$  называется  $T_1$  - пространством, если в нём любое одноточечное множество открыто, т.е.

$$\forall x \in X \quad \{x\} \underset{cl}{\subset} X$$

ТП называется  $T_2$  - пространством, или **хаусдорфовым**, если для любых двух точек  $x$  и  $y$ ,  $x \neq y$  найдутся дизъюнктные окрестности, т.е.

$$\forall x, y \in X, x \neq y \quad \exists U \in \tau(x), V \in \tau(y) : U \cap V = \emptyset$$

ТП называется  $T_3$  - пространством, или **регулярным**, если

$$\begin{cases} X - T_1 \\ \forall F \underset{cl}{\subset} X, x \in (X \setminus F), \exists U \in \tau(F), V \in \tau(x) : U \cap V = \emptyset \end{cases}$$

то есть если для любого замкнутого множества и точки из его дополнения найдутся дизъюнктные окрестности

ТП называется  $T_4$  - пространством, или **нормальным**, если

$$\begin{cases} X - T_1 \\ \forall F \underset{cl}{\subset} X, B \underset{cl}{\subset} X, F \cap B = \emptyset, \exists U \in \tau(F), V \in \tau(B) : U \cap V = \emptyset \end{cases}$$

то есть если для любых двух замкнутых непересекающихся множеств найдутся дизъюнктные окрестности

### Иерархия отделимости

Пусть дано ТП  $(X, \tau)$

- 1) Если  $X - T_4$ , то  $X - T_3$
- 2) Если  $X - T_3$ , то  $X - T_2$
- 3) Если  $X - T_2$ , то  $X - T_1$
- 4) Если  $X - T_1$ , то  $X - T_0$



### Критерий регулярности

ТП  $(X, \tau)$  регулярно тогда и только тогда, когда  $X = T_1$ , в котором  $\forall x \in X$  и  $U \in \tau(x)$  найдётся окрестность  $V \in \tau(x)$  такая, что  $\overline{V} \subset U$

### Критерий нормальности

ТП  $(X, \tau)$  нормально тогда и только тогда, когда  $X = T_1$ , в котором  $\forall F \subset X$  и  $U \in \tau(F)$  найдётся окрестность  $V \in \tau(F)$  такая, что  $\overline{V} \subset U$

### Примеры

1) Не  $T_1$  пространство:  $(R, \tau^0)$

Действительно, в  $(R, \tau^0)$  открыты только  $\emptyset$  и  $R$ , значит замкнуты их дополнения, то есть  $R$  и  $\emptyset$ , а одноточечного множества среди замкнутых нет, значит  $(R, \tau^0)$  – не  $T_1$

2)  $(R, \tau_C) = T_1$ , но не  $T_2$


В  $(R, \tau_C)$  открыта прямая с конечным числом дырок, значит замкнутыми будут конечные множества.  $\{x\}$  – конечно  $\forall x \in X$ , значит  $(R, \tau_C) = T_1$

Пусть  $Ox = (R \setminus A)$ ,  $Oy = (R \setminus B)$ ,  $x, y \in R$ ,  $A, B$  – не более чем счётные  
 $Ox \cap Oy = (R \setminus A) \cap (R \setminus B) = R \setminus (A \cup B) \neq \emptyset$


Значит  $(R, \tau_C)$  – не  $T_2$

3)  $(R^2, \tau^\infty) = T_2$ , но не  $T_3$

Для двух различных точек мы можем нарисовать две непересекающиеся бабочки



значит  $(R^2, \tilde{\tau}) - T_2$



Пусть  $F = L \setminus \{x_0\}, F \subset_{cl} (R^2, \tau)$ , то есть в качестве замкнутого множества возьмём вертикальную прямую без центра бабочки.

По рисунку видно, что какие бы мы бабочки не построили, они всё равно будут пересекаться, то есть не будут дизъюнктными окрестностями.

4)  $(R, \tau_S) - T_4$ , но не метризуемо.

$\tau_S$  – топология Зоргенфрея: в ней открыты промежутки вида  $[a; b)$  ("стрелки")

## 13 Произведение ТП. Проектирование. Непрерывность отображения в произведение. Примеры

Пусть даны ТП  $(X_i, \tau_i), i = \overline{1, n}$

Рассмотрим декартово произведение  $X = X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n = \prod_{i=1}^n X_i$

$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ , где  $x_i \in X_i$

На  $X$  определена топология произведения  $\tau_\Pi$

$\tau_\Pi$  задаётся элементарными окрестностями.

Для  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  элементарная окрестность – любое множество вида  $U = U_1 \times U_2 \times \dots \times U_n$ , где  $U_i \in \tau(x_i)$

Пусть дано ТП  $X = \prod_{i=1}^n X_i$

$p_j : X \rightarrow X_j$  – **j-ое проектирование**

$A \subset X, p_j(A)$  – **проекция** множества  $A$

**Теорема 1**

Отображения  $p_j$  непрерывны

**Координатные отображения**

Пусть даны ТП  $(X, \tau), (Y_i, \tau'_i), i = \overline{1, n}$  и отображение

$X \rightarrow \prod_{i=1}^n Y_i : x \rightarrow y = (y_1, y_2, \dots, y_n), y_i \in Y_i$

$$\begin{cases} y_1 = f_1(x) \\ \dots \\ y_n = f_n(x) \end{cases}$$

Определены **координатные отображения**

$f_i : X \rightarrow Y_i : x \rightarrow y_i = f_i(x)$

$f = (f_1, f_2, \dots, f_n)$

**Теорема 2**


$f$  – непрерывно  $\iff$  все координатные отображения  $f_i$  непрерывны

### Примеры

1)  $R^n = \prod_{i=1}^n R \ni x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$

Евклидова топология на  $R^n$   $\tau^n = \tau\Pi$

2)  $R^3 \supset Z, Z : x^2 + y^2 = 1$  – цилиндр  
 $S \subset R^2, S : x^2 + y^2 = 1$  – окружность



$$Z = S \times R$$

## 14 Понятие компактности. Примеры. Свойства компактности. Критерий компактности метризуемого ТП

Пусть даны ТП  $(X, \tau), A \subset X$ ,

$\alpha \subset \tau$  – семейство называется **покрытием**  $A$ , если  $\cup \alpha \supset A$ ,

подсемейство  $\alpha' \subset \alpha$  – называется **подпокрытием** для  $A$ ,

если  $\cup \alpha' \supset A$

$A$  называется **компактным**, если из любого покрытия  $\alpha$  можно выбрать конечное подпокрытие  $\alpha'$

В частности, может быть, что  $A = X$

### Свойства компактности

Пусть даны ТП  $(X, \tau), (Y, \tau'), A \subset X, f : X \rightarrow Y$

- 1) Если  $X$  – компактно и  $A$  замкнуто, то  $A$  – компактно
- 2) Если  $X = T_2$  (хаусдорфово) и  $A$  – компактно, то  $A$  – замкнуто
- 3) Если  $A$  – компактно и  $f$  – непрерывно, то  $f(A)$  – компактно

### К критерию компактности метризуемого ТП

Пусть дано ТП  $(X, \tau)$ ,  $(x_n)_{n=1}^\infty$  – последовательность точек из  $X$ . Тогда говорят, что **последовательность точек сходится к точке  $x$**  ( $x_n \rightarrow x$ ), если для любой окрестности  $U$  точки  $x$  найдётся порядковый номер  $n$ , что все члены последовательности, начиная с  $n$ -ого, лежат в  $U$ , то есть

$$x_n \rightarrow x \iff \forall U \in \tau(x) \exists n : \{x_k | k \geq n\} \subset U$$

Если  $\tau$  задана некоторой метрикой  $\rho$ , то

$$x_n \rightarrow x \iff \rho(x, x_n) \rightarrow 0$$

### Критерий компактности метризуемого ТП

Пусть дано  $(X, \tau)$  – метризуемое ТП.  $X$  – компактно  $\iff$  из любой последовательности  $x_n \subset X$  можно выбрать сходящуюся подпоследовательность

### Примеры


1) Любое конечное множество компактно

2) Интервал  $(0; 1)$  не компактен

Покрывание:  $(0; 1) = \bigcup_{n \geq 2} (\frac{1}{n}; 1 - \frac{1}{n})$ , но из этого покрытия нельзя выбрать конечное подпокрытие

Аналогично  $[0; 1)$  не компактен

3)  $(R, \tau_S)$ ,  $A = [a; b]$  – не компактен



Покрываем  $[a; b]$  стрелками  $U_1 = [a; b - \frac{a+b}{2})$ ,  $U_2 = [a; b - \frac{a+b}{4})$ ,  $\dots$ ,  $U_n = [a; b - \frac{a+b}{2^n})$ ,  $\dots$ ,  $V = [b; b_1)$ ,  $b_1$  – любое

Из этого покрытия нельзя выбрать конечное подпокрытие

4) В  $(R, \tau_F)$   $\forall A \subset (R, \tau_F)$  – компактно

5) В  $(R, \tau_C)$   $\forall A \subset (R, \tau_F)$  – компактно  $\iff |A| < \infty$

## 15 Непрерывные отображения компактного ТП. Случай гомеоморфизма

### Теорема 1

Пусть даны ТП  $(X, \tau)$ ,  $f$  – непрерывное отображение. Если  $X$  – компактно, то  $\exists x_{\min}, x_{\max} \in X : f(x_{\min}) \leq f(x) \leq f(x_{\max}) \forall x \in X$

### Теорема 2

Пусть даны ТП  $(X, \tau), (Y, \tau'), f : X \rightarrow Y$

Если: 1)  $X$  – компактно; 2)  $Y = T_2$ ; 3)  $f$  – непрерывная биекция, то  $f$  – гомеоморфизм

### Теорема 3

Пусть даны ТП  $(X_i, \tau_i), i = \overline{1, n}$ . Если все  $X_i$  компактны, то  $\prod_{i=1}^n X_i$  – компактно.

## 16 Понятие полного МП. Вполне ограниченные множества в МП. Критерий компактности МП

Пусть даны МП  $(X, \rho)$ ,  $(x_n)_{n=1}^\infty \subset X$  – последовательность. Последовательность  $(x_n)_{n=1}^\infty$  называется **фундаментальной** или **последовательностью Коши**, если  $\forall \epsilon > 0 \exists n : \rho(x_k, x_m) < \epsilon \forall k, m \geq n$

### Теорема 1

Пусть даны МП  $(X, \rho)$ ,  $(x_n)_{n=1}^\infty \subset X$ . Если  $(x_n)_{n=1}^\infty$  сходится, то она фундаментальна.

### Определение 1

МП  $(X, \rho)$  и метрика  $\rho$  называются **полными**, если любая фундаментальная последовательность сходится.

### Теорема 2

Пусть даны МП  $(X, \rho)$ ,  $A \subset X$ , тогда

- 1) Если  $X$  – полное и  $A$  замкнутое, то  $A$  – полное
- 2) Если  $A$  – полное, то  $A$  замкнутое

### Определение 2

Пусть дано МП  $(X, \rho)$ ,  $A \subset X$ . Множество  $A$  называется **вполне ограниченным**, если  $\forall \epsilon_0 > 0$   $A$  можно покрыть конечным числом шаров вида  $B(x, \epsilon_0)$

**Теорема 3** Пусть дано МП  $(X, \rho)$ ,  $A \subset X$ . Если  $A$  вполне ограниченное, то оно ограниченное.

### Теорема 4

Пусть  $A \subset R^n$ .  $A$  – вполне ограниченное  $\iff A$  – ограниченное.

### Критерий компактности МП

МП  $(X, \rho)$  компактно  $\iff X$  полное и вполне ограниченное



## 17 Понятие связности. Примеры. Основные свойства связности

Пусть даны ТП  $(X, \tau)$ ,  $A \subset X$ . Говорят, что  $A$  **несвязно**, если  $A$  представимо в виде  $A = U \cup V$ , где  $U \neq \emptyset, V \neq \emptyset, U \subset A, V \subset A, U \cap V = \emptyset$ ,  
 $\text{ор} \qquad \text{ор}$   
 то есть в виде объединения двух непустых открытых дизъюнктивных множеств.

$A$  **связно**, если  $A$  не несвязно.

### Свойства связных множеств

Пусть даны ТП  $(X, \tau), (Y, \tau'), A \subset X, f : X \rightarrow Y$  – непрерывное отображение, тогда:

- 1)  $A$  – связно  $\implies f(A)$  – связно
- 2)  $A$  – связно  $\implies \overline{A}$  – связно
- 3) Если  $A_t \subset X, t \in T$  ( $T$  – семейство индексов),  $A_t$  связно  $\forall t \in T$ ,  
 $\bigcap_{t \in T} A_t \neq \emptyset \implies \bigcup_{t \in T} A_t$  – связно
- 4) Если  $A_i \subset X, i = \overline{1, n}, A_i$  – связно  $\forall i = \overline{1, n}$ ,  
 $A_i \cap A_{i+1} \neq \emptyset \forall i = \overline{1, n-1}$  (то есть  $\{A_1, \dots, A_n\}$  – связная цепочка)  
 $\implies \bigcup_{i=1}^n A_i$  – связно

### Примеры


- 1)  $Q \subset R$  – несвязно

Фиксируем  $\forall \alpha \in (R \setminus Q)$

$Q$  представимо в виде

$$Q = (-\infty; \alpha) \cap Q \cup (\alpha; +\infty) \cap Q$$

- 2)  $(R, \tau_S) \supset A = [0; 1], A$  – несвязно



$$A = U \cup V$$

$$U = [0; 1)$$

$$V = [1; \alpha) \cap A = \{1\} \subset A$$

*ор*

3)  $R \supset A = [0; 1] \cup [2; 3)$ ,  $A$  – несвязно

## 18 **Линейная связность и её свойства. Примеры**

Пусть дано ТП  $(X, \tau)$ . **Кривой** в  $X$  называется множество  $\gamma \subset X$  такое, что существует непрерывное отображение  $f : [a; b] \rightarrow X$ , для которого  $f([a; b]) = \gamma$ . В таком случае  $f$  называют **параметризацией кривой**  $\gamma$ .

Говорят, что точки  $x, y \in X$  соединены кривой  $\gamma$ , если эти точки лежат в этом множестве.

Множество  $A \subset X$  **линейно связно**, если  $\forall x, y \in X \exists$  кривая  $\gamma \subset A$ , которая соединяет  $x$  и  $y$ .

В частности, может быть, что  $A = X$ .

### **Свойства**

Пусть даны ТП  $(X, \tau)$ ,  $A \subset X$ ,  $(Y, \tau')$ ,  $f : X \rightarrow Y$  – непрерывное отображение, тогда:

1) Если  $A$  – линейно связно, то  $A$  – связно

2) Если  $A$  – линейно связно, то и образ  $A$  линейно связан

### Примеры

1) на  $R$   $[a; b]$ ,  $[a; b)$ ,  $R$  линейно связны

2) в  $R^n$   $\forall$  выпуклое множество линейно связно

(**выпуклое множество** – множество, которое вместе с двумя своими любыми точками содержит отрезок, соединяющий их)

3)  $S^n \subset R^{n+1}$  линейно связна

$S^n : x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = 1$  – сфера

## 19 Связная компонента в ТП и её свойства. Примеры

Пусть даны ТП  $(X, \tau)$ ,  $A \subset X$ ,  $A \neq \emptyset$

Тогда  $A$  – **связная компонента** в  $X$ , или **компонента связности**, если

1)  $A$  – связно

2)  $A \subset B \subset X$ ,  $A \neq B \iff B$  – несвязно

Если  $A$  – связная компонента в  $X$  и  $A \ni x$ , то обозначают  $A = C(x)$  или  $C_x$

### Свойства

Пусть даны ТП  $(X, \tau)$ ,  $A \subset X$ ,  $A \neq \emptyset$ , тогда:

1)  $A$  – связная компонента в  $X \implies A \underset{cl}{\subset} X$

2) Если  $A$  и  $B$  – связные компоненты в  $X$ ,  $A \cap B \neq \emptyset$ , то  $A = B$

### Примеры

1)  $\forall$  связная компонента множества  $Q$  одноточечна

Пусть для некоторого  $r \in Q$  связная компонента неодноточечна, т.е.

$C_r \ni q, q \neq r$ . Пусть для определённости  $r < q$ .

Фиксируем число  $\alpha \in (R \setminus Q), r < \alpha < q$ .

$C_r = U \cup V, U = (-\infty; \alpha) \cap C_r, V = (\alpha; +\infty) \cap C_r$ .

**Противоречие.**

Значит любая связная компонента множества  $Q$  одноточечна.

2) Если пространство  $X$  дискретно, то  $\forall x \in X$  имеем  $C_x = \{x\}$ , то есть все связные компоненты пространства  $X$  одноточечные.