## 2023-2 Topología Grupo 2 Primer Corte

## MÍNIMOS A SABER

- Definición de topoloía y ejemplos sobre conjuntos finitos.
- Ejemplos básicos: las topologías discreta e indiscreta, la topología del complemento finito, la topología del complemento contable, la topología euclidiana en  $\mathbb{R}$ , la topología de Zariski en  $\mathbb{R}^n$ .
- Saber comparar topologías, es decir, dadas dos topologías decidir cual es más fina o si no son comparables.
- Definiciones de base y sub-base para una topología.
- La topología generada por una base y la topología generada por una sub-base.
- La topología del orden, la topología producto, y la topología de subespacio.
- Conjuntos cerrados y axiomas de conjuntos cerrados.

## MISCELÁNEA DE EJERCICIOS

- 1. Construya todas las topologías sobre  $A = \{a, b, c\}$  y determine para cada par de ellas si una es más fina, más gruesa o no se puede comparar con la otra.
- 2. Probar que los intervalos no acotados  $(-\infty, b)$  y  $(a, \infty)$  también son abiertos en la topología euclidiana de  $\mathbb{R}$ .
- 3. Sea  $X = \mathbb{R}$ . Probar que  $\mathcal{T}_f \subseteq \mathcal{T}_E$ , que  $\mathcal{T}_f \subseteq \mathcal{T}_c$ , pero que  $\mathcal{T}_E$  y  $\mathcal{T}_c$  no son comparables.
- 4. Probar que la topología de Zariski en  $\mathbb R$  coincide con la topología del complemento finito.
- 5. Para cada entero positivo n, sea  $S_n = \{n, n+1, n+2, \dots\}$ . Muestre que la colección de todos los  $S_n$  es una base para una topología sobre  $\mathbb{N}$ .
- 6. Una partición de un conjunto X es una colección de subconjuntos disjuntos dos a dos, cuya unión es X. Pruebe que cada partición de X es una sub-base para una topología en X. ¿Es una base?
- 7. Suponga que S es una partición de X que contiene exactamente 4 subconjuntos, ¿cuántos abiertos tiene la topología generada por S?
- 8. Sea  $(X, \mathcal{T})$  un espacio topológico. Pruebe que si  $\{x_0\} \in \mathcal{T}$  para algún  $x_0 \in X$ , entonces  $\{x_0\} \in \mathcal{B}$  para cada base  $\mathcal{B}$  que genera la topología  $\mathcal{T}$ .
- 9. Sobre  $\mathbb{Z}^+$  definamos los siguientes conjuntos

$$B_n = \{x \in \mathbb{Z}^+ : n \text{ divide a } x\} \text{ para } n = 1, 2, 3, ...$$

- (a) Muestre que la colección  $\mathcal{B} = \{B_n : n = 1, 2, 3, ...\}$  es una base para una topología sobre  $\mathbb{Z}^+$ ;
- (b)  $\xi$ es  $\mathcal{B}$  una topología?
- 10. Un subconjunto A de un conjunto simplemente ordenado X se dice **convexo** si para cada  $a,b \in A$  con a < b, el intervalo  $[a,b] \subseteq A$ . Pruebe o refute: cada subconjunto convexo de X diferente de  $\emptyset$  y X es un intervalo o un rayo (es decir, un subconjunto de la forma  $(-\infty,b)$ ,  $(-\infty,b]$ ,  $(a,\infty)$ ,  $[a,\infty)$ ).
- 11. Pruebe que la topología de Zariski en  $\mathbb{R}^2$  no es el producto de la topología de Zariski en  $\mathbb{R}$  con si misma.

- 12. Denote por  $\mathbb{R}_f$  el conjunto de los números reales con la topología del complemento finito. Describa una base para la topología producto en  $\mathbb{R}_f \times \mathbb{R}$ .
- 13. Pruebe que la topología de  $\mathbb{Z}$  como subespacio de  $\mathbb{R}$ , con la topología euclidiana, es la topología discreta.
- 14. Pruebe que la topología de  $\mathbb{Z}$  como subespacio de  $\mathbb{R}$ , con la topología del complemento finito, es la topología del complemento finito.
- 15. Sea X un espacio topológico cuya topología es la discreta (también nos referimos a X como un espacio discreto). Describa todos los subconjuntos de X cuya topología de subespacio es la topología indiscreta.
- 16. Pruebe que si Y es un abierto de X y  $U \subseteq Y$  es un abierto en la topología de subespacio de Y, entonces U es abierto en X. De un ejemplo que muestre que la conclusión anterior es falsa si Y no es abierto.
- 17. Suponga que X es un espacio topológico y que  $A \subseteq Y \subseteq X$ . Muestre que la topología de A como subespacio de Y es la misma topología de A como subespacio de X.
- 18. Describa los cerrados de las topologías  $\mathcal{T}_f$  y  $\mathcal{T}_c$ , y de ejemplos de subconjuntos cerrados en las topologías del orden y euclidiana en  $\mathbb{R}$ .
- 19. Si  $Y \subset X$  es un subconjunto cerrado de X y A es un subconjunto cerrado de Y en la topología de subespacio de Y, entonces A es cerrado en X.
- 20. Un espacio topológico X se dice **irreducible** si no se puede expresar en la forma  $X = A \cup B$  con  $A \neq X$ ,  $B \neq X$ , ambos cerrados y no vacíos. Muestre que si X es infinito entonces X con la topología del complemento finito es un espacio topológico irreducible. Muestre que hay espacios topológicos **reducibles** (es decir, que no son irreducibles) con la topología del complemento contable.
- 21. Muestre que si X es un espacio topológico irreducible, entonces cada subconjunto abierto de X es irreducible con la topología de subespacio.