

# A WKB-Type Approximation to the Schrödinger Equation

Rene Czepluch <sup>\*</sup>, Rasmus Klitgaard <sup>†</sup>, Laurits N. Stokholm <sup>‡</sup>  
Department of physics

26. november 2017

## 1 Indledning

## 2 Solution to the stationary Schrödinger Equation

Hvis vi antager, at vi betragter en partikel i en dimension,  $x$ , er Schrödinger ligningen

$$\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + V(x)\psi = E\psi \quad (1)$$

isolerer  $\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}$  i ligning (1), får vi

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = 2m\psi(E - V(x)) \frac{1}{\hbar^2} \quad (2)$$

defineres

$$P(x) \equiv \sqrt{2m(E - V(x))} \quad (3)$$

Kan ligning (2) omskrives til

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = -\frac{P^2}{\hbar^2} \psi \quad (4)$$

## 3 kvantisering

## 4 The hydrogen atom

## 5 Tunnelering

## 6 Ionisation af et Rydberg-atom

## 7 konklusion

---

<sup>\*</sup>rene.czepluch@post.au.dk

<sup>†</sup>rasmusklitgaard97@gmail.com

<sup>‡</sup>laurits.stokholm@post.au.dk