

Borrador de divergencia cinemática

Copia para comparación, 29 de septiembre de 2026. Sólo capítulos 3, 5 y 6. Los textos se reproducen sin edición. Las referencias a material omitido se indican como «externa»; consultar la tesis completa. La paginación cambia en esta vista.

Índice

3. Fenomenología de las Asimetrías Azimutales en EAS	3
3.1. El plano de la lluvia y la ruptura de simetría	3
3.2. Origen físico de la modulación azimutal	4
3.2.1. Atenuación atmosférica	4
3.2.2. Efectos geométricos	5
3.2.3. Divergencia cinemática de la emisión de muones	6
3.2.4. Efectos por el campo geomagnético terrestre	9
3.3. Parametrización armónica de primer orden	9
5. Caracterización de la Asimetría en el Anillo Denso	11
5.1. El Anillo Denso como entorno de control	11
5.2. Efectos Sistemáticos: Discrepancias MC vs. REC	13
5.2.1. Bias Direccional en la Reconstrucción	16
5.2.2. Modelado del Bias: Implementación del <i>Toy Model</i> empírico	17
5.2.3. Bias Geométrico: Absorción de la Asimetría por la LDF	18
5.3. Estudios de Robustez	20
5.3.1. Invariancia azimutal de incidencia (ϕ_{shower})	20
5.3.2. Independencia del modelo hadrónico	21
5.4. Dependencia de la amplitud A_1 con la energía del primario	23
5.5. Discriminación de Masa Primaria: Protón vs. Hierro	24
5.5.1. El Factor de Mérito (MF) y el <i>Sweet Spot</i> de discriminación	24
5.6. Interpretación Física: dependencia con el X_{max}	26
5.6.1. Contraste fenomenológico con el Detector de Superficie	28
6. Dinámica Radial del Arreglo <i>Infill</i> en Simulaciones	31
6.1. Arreglo <i>Infill</i> usando el núcleo y ángulos Monte Carlo	31
6.1.1. Competencia de observables: UMD frente al SD Total	34
6.1.2. Desglose de señales: La inversión de la asimetría muónica	35

6.1.3. Propuesta de Modelado del Filtro Cinemático	38
6.2. Arreglo <i>Infill</i> usando la geometría reconstruida	39
6.2.1. Resiliencia de la componente electromagnética en la reconstrucción . .	40
6.2.2. La supervivencia de la asimetría geométrica muónica	41
6.3. Comparación de performance: UMD Monte Carlo vs. UMD Reconstruido . . .	41

3. Fenomenología de las Asimetrías Azimutales en EAS

La reconstrucción estándar de eventos se basa en el supuesto de que la densidad de partículas y específicamente de muones de una lluvia atmosférica extensa (EAS) presenta una simetría circular en el plano perpendicular a su eje de propagación en el plano de la lluvia. Sin embargo, esta hipótesis sólo es estrictamente válida para lluvias verticales. Para lluvias inclinadas, la simetría en el plano de la lluvia se rompe de manera sistemática, dando lugar a patrones en la densidad de muones que presentan una fuerte dependencia con el ángulo azimutal (ϕ).

En este capítulo se describe el origen físico de esta asimetría, originada por la competencia entre la atenuación longitudinal de la cascada, efectos puramente cinemáticos de divergencia (geométricos) y el efecto del campo geomagnético terrestre, y se define el formalismo matemático utilizado para su parametrización armónica.

3.1. El plano de la lluvia y la ruptura de simetría

Para estudiar la distribución espacial de las partículas, es imperativo distinguir entre el sistema de referencia topográfico y el sistema intrínseco de la cascada. Los detectores del Observatorio Pierre Auger se encuentran fijos sobre la superficie terrestre, definiendo el *plano del suelo* (o *ground plane*). Sin embargo, la física del desarrollo de la cascada posee simetría cilíndrica (en su aproximación de orden cero) respecto a su propio eje de propagación. El plano perpendicular a este eje es como se define el *plano de la lluvia* (o *shower plane*).

A lo largo de todo este trabajo, las coordenadas espaciales utilizadas para caracterizar la densidad de partículas, la distancia radial al núcleo (r) y el ángulo azimutal (ϕ), están estrictamente definidas sobre el plano de la lluvia. Para obtenerlas, las posiciones de las estaciones activadas en el terreno se proyectan geométricamente sobre este plano transversal al eje, tal como se esquematiza en la Figura 3.1.




Figura 3.1: Esquema geométrico de una Lluvia Atmosférica Extensa (EAS). Se ilustra la proyección de las posiciones de los detectores desde el plano del suelo hacia el plano de la lluvia, definiendo las coordenadas intrínsecas r y el ángulo azimutal ϕ (en el dibujo escrita como ζ) del plano de la lluvia.

En el caso ideal de una lluvia estrictamente vertical ($\theta = 0^\circ$), ambos planos coinciden de manera exacta. En esta configuración, la distancia de vuelo que recorren las partículas desde

el punto de primera interacción hasta alcanzar el nivel del suelo depende exclusivamente de la distancia radial al núcleo (r). Por lo tanto, los detectores ubicados a una misma distancia r registrarán, en promedio, idénticas densidades de muones, reflejando una simetría circular independiente del ángulo azimutal (ϕ).

Sin embargo, cuando el rayo cósmico primario incide con un ángulo cenital $\theta > 0^\circ$, el plano de la lluvia deja de ser paralelo al plano del suelo. Esta inclinación geométrica rompe inherentemente la simetría del sistema respecto al observador terrestre.

Para comprender esta ruptura geométrica, es necesario analizar la intersección del frente de la lluvia con la superficie del arreglo. Al inclinar la cascada, los detectores ubicados a una misma distancia radial r en el plano de la lluvia ya no se encuentran a la misma distancia física del centro de la lluvia en el plano del suelo, ni tampoco del máximo de desarrollo de la lluvia (X_{max}). Por ende las distintas partículas que componen la lluvia no recorren caminos idénticos antes de impactar contra el suelo. Esto define dos regiones azimutales extremas y fundamentales para el análisis de asimetrías:

- **Región Temprana** ($\phi \approx 0^\circ$): Corresponde a la sección del frente de lluvia que se encuentra más cerca de la superficie topográfica (el suelo) y, por ende, impacta primero contra el arreglo de detectores. Las partículas que arriban a esta zona tienen el camino geométrico más corto y recorren la menor cantidad de atmósfera.
- **Región Tardía** ($\phi \approx \pm 180^\circ$): Corresponde a la sección diametralmente opuesta del frente, la cual se encuentra ‘elevada’ respecto al suelo. Las partículas en esta dirección deben continuar propagándose a través de la atmósfera después de que el lado *temprano* ya ha impactado, acumulando una distancia atravesada en la atmósfera significativamente mayor antes de ser detectadas y por ende siendo más atenuadas.

Esta diferencia estructural de origen geométrico en las distancias de propagación para un mismo radio r justifica junto a otras razones, los fenómenos físicos responsables de modular la densidad de muones, los cuales se describen a continuación.

3.2. Origen físico de la modulación azimutal

La ruptura de la simetría circular detallada anteriormente es el resultado de la superposición de tres mecanismos físicos y cinemáticos que actúan sobre la cascada durante su desarrollo y propagación. Si bien la asimetría dominante en este trabajo es de tipo *temprano-tardía*, es fundamental caracterizar cada una de las 3 contribuciones [1] para comprender la firma total de la densidad de muones a nivel del suelo.

3.2.1. Atenuación atmosférica

La atenuación longitudinal es consecuencia de la evolución de la cascada a través del medio. Como se estableció en la Sección 3.1, las partículas en la región tardía deben atravesar una profundidad atmosférica mayor que aquellas en la región temprana cuando la lluvia está inclinada, es decir, no es estrictamente vertical. Esto se puede entender al considerar que la parte temprana de la lluvia impacta contra el suelo ‘antes’ que la tardía, y por ende esta última atraviesa más atmósfera. Este es el efecto dominante que afecta a la componente muónica de las lluvias detectadas en el UMD en el rango angular estudiado.

Dado que la cascada evoluciona y se absorbe a medida que penetra en la atmósfera, este camino extra resulta en un vaciamiento relativo de partículas en la zona tardía. Físicamente, la atenuación genera un exceso de densidad de muones en la dirección $\phi = 0^\circ$ temprana respecto de la zona tardía. Este fenómeno ha sido ampliamente documentado en simulaciones y datos experimentales del SD [2, 3]. Vale aclarar que este fenómeno ocurre tanto para la componente electromagnética como la muónica pero con mayor magnitud para la componente EM, razón por la cual este mecanismo ya estaba caracterizado.

Si bien los muones poseen un gran poder de penetración y menor sección eficaz de interacción que la componente de e^-/γ , el efecto tiene un impacto relevante para esta componente de la lluvia. A grandes distancias del núcleo ($r > 400$ m), el espectro muónico está dominado por partículas de menor energía (muones blandos) [4]. En este régimen, la probabilidad de decaimiento aumenta sensiblemente con el trayecto adicional hacia la región tardía, consolidando la atenuación atmosférica como el efecto dominante para la componente muónica pura. En este contexto, el blindaje de tierra de 2.3 m del UMD cumple un rol fundamental: actúa como un filtro cinemático que elimina los muones sub-GeV que han sufrido atenuaciones extremas como también a la componente EM, permitiendo una medición más limpia de la asimetría intrínseca de los muones que logran penetrar el suelo. Cabe aclarar que el umbral $E_\mu \gtrsim 1 \text{ GeV}/\cos \theta$ está definido estrictamente en términos del ángulo cenital global θ de la lluvia; en rigor, el espesor de suelo efectivamente atravesado depende del ángulo de incidencia *local* en cada módulo, θ_{loc} , que difiere sistemáticamente entre la región temprana y la tardía por la misma razón geométrica discutida en la Sección 3.2.2. Este umbral, por lo tanto, introduce en principio una modulación azimutal puramente instrumental, no atribuible a la atenuación atmosférica en sí, cuya magnitud no ha sido cuantificada en este trabajo.

3.2.2. Efectos geométricos

El segundo grupo de mecanismos es de naturaleza puramente geométrica y cinemática, y en realidad comprende dos efectos físicamente distintos que conviene separar desde el principio: (i) la proyección geométrica de un flujo de partículas ya colimado en torno al eje sobre un plano de suelo inclinado, formalizada por Bertou y Billoir [5]; y (ii) la divergencia cinemática propiamente dicha, asociada a la distancia *finita* entre el punto de producción de los muones y el suelo, formalizada por Cazón *et al.* [4]. Ambos efectos actúan simultáneamente, pero, como se muestra a continuación, poseen comportamientos de signo cualitativamente distintos, y no distinguirlos con cuidado ha sido, en las etapas iniciales de este trabajo, fuente de confusión.

Proyección geométrica del flujo (Bertou & Billoir). Como advirtió Billoir, un evento puramente simétrico en el sistema de referencia de la lluvia resulta en un efecto asimétrico al proyectarse en el plano del suelo. Para cuantificar esta excentricidad remanente, Bertou y Billoir desarrollaron una derivación analítica evaluando los momentos de las partículas [5]. La modulación espuria aparente introducida por el mapeo espacial fue cuantificada mediante el término asimétrico $\mathcal{A}_{geo}$, que es lo que llamamos efecto de proyección geométrica:

$$\mathcal{A}_{geo}(r, \Phi) = \left\langle \frac{p_r(r)}{-p_z(r)} \right\rangle \tan \theta \cos \Phi \quad (3.1)$$

donde p_r es la componente radial del momento y p_z la longitudinal, con la convención de que $p_z < 0$ para partículas descendentes (de modo que $-p_z > 0$). Dado que $p_r > 0$, $-p_z > 0$

y $\tan \theta > 0$, el cociente $\langle p_r / -p_z \rangle$ es **estrictamente positivo**: $\mathcal{A}_{geo}$ posee necesariamente el **mismo** signo que la atenuación atmosférica, con un máximo en la región temprana ($\phi = 0^\circ$). Conviene remarcar este punto explícitamente porque es fácil malinterpretarlo: la proyección geométrica de Billoir actúa de manera *aditiva* con la atenuación, nunca en su contra, y por sí sola jamás puede generar un exceso de densidad en la región tardía. Como $\langle p_r / -p_z \rangle \approx \tan \alpha$, esta asimetría además *crece* (se vuelve más positiva, no negativa) cuanto mayor es la divergencia angular α de la población de muones considerada.

Sin embargo, tal como fue reportado empíricamente por Bradfield [3] y modelado cuantitativamente por Luce *et al.* [6], la señal del SD exhibe a grandes distancias del núcleo una inversión de signo de A_1 —un exceso de densidad en la región *tardía*— que $\mathcal{A}_{geo}$, siendo estrictamente positiva, no puede explicar por construcción. Esto exige un tercer mecanismo, de naturaleza física distinta a la proyección geométrica local: la divergencia cinemática de la emisión de muones.

3.2.3. Divergencia cinemática de la emisión de muones

A diferencia de $\mathcal{A}_{geo}$, que describe cómo un flujo de partículas ya colimado en torno al eje se proyecta sobre un plano de suelo inclinado, este efecto surge de comparar, para una **misma** distancia radial r en el plano de la lluvia, la distancia *física* d que un muón debe recorrer desde su punto de producción hasta alcanzar la región temprana o la tardía.

Para comprender este efecto es necesario analizar primero la cinemática de producción de muones. En la cascada hadrónica, los muones nacen a una distancia D sobre el eje de la lluvia, producto del decaimiento de piones y kaones. En este proceso heredan un momento longitudinal p_z y un momento transversal p_t , que provoca que el muón salga disparado con un ángulo de apertura polar α respecto al eje, dado por $\sin \alpha \simeq c p_t / E$ [4].

Al propagar el haz de partículas hacia el suelo, la densidad de muones S que registrará un detector depende de dos factores que compiten entre sí. Por un lado, la densidad espacial cae con el cuadrado de la distancia geométrica recorrida ($1/d^2$), dado que el área transversal interceptada crece esféricamente como $dA = d^2 d\Omega$. Por otro lado, la cantidad de partículas emitidas en una dirección dada, $dN/d\Omega(\alpha)$, decae a medida que se exigen ángulos α más extremos, porque el espectro del momento transversal está acotado por la cinemática de las interacciones hadrónicas, $dN/dp_t \propto p_t \exp(-p_t/Q)$ [4]. Combinando ambos factores, la densidad en el suelo se expresa como:

$$S(d, \alpha) \propto \frac{1}{d^2} \frac{dN}{d\Omega}(\alpha), \quad (3.2)$$

y, sustituyendo la relación cinemática $\sin \alpha \simeq c p_t / E$ en dN/dp_t , la distribución angular de emisión resulta:

$$\frac{dN}{d\Omega}(\alpha) \propto \cos \alpha \exp\left(-\frac{E \sin \alpha}{cQ}\right), \quad (3.3)$$

En una lluvia inclinada, alcanzar una misma distancia radial r en el plano de la lluvia exige que la región tardía se encuentre físicamente más lejos del punto de producción que la región temprana ($d_{tardio} > d_{temprano}$), y por lo tanto que el ángulo de emisión requerido sea estrictamente menor ($\alpha_{tardio} < \alpha_{temprano}$): como la región temprana impacta contra el suelo

primero, el muón recorre poca distancia y necesita un ángulo α grande para alcanzar el radio r ; la región tardía, al impactar más lejos, requiere un ángulo significativamente menor. Este esquema se ilustra en la Figura 3.2.




Figura 3.2: Esquema geométrico de la dispersión de las partículas. Debido a la inclinación, para alcanzar un mismo radio r en el plano de la lluvia, la región tardía requiere un ángulo de emisión α (en la imagen δ_d) mucho menor que la región temprana (en la imagen δ_u). Obtenido de [6]

Combinando la Ec. 3.3 con la dilución espacial $S \propto d^{-2} dN/d\Omega$ de la Ec. 3.2, el cociente de densidades entre ambas regiones resulta:

$$\frac{S_{tardio}}{S_{temprano}} \approx \underbrace{\left(\frac{d_{temprano}}{d_{tardio}} \right)^2}_{\text{espacial, siempre } < 1} \cdot \underbrace{\left(\frac{\cos \alpha_{tardio}}{\cos \alpha_{temprano}} \right)}_{\text{espacio de fases, siempre } > 1} \cdot \underbrace{\exp \left(\frac{(\sin \alpha_{temprano} - \sin \alpha_{tardio}) E}{cQ} \right)}_{\text{ganancia cinemática, siempre } > 1}. \quad (3.4)$$

El primer factor es puramente geométrico —la dilución del flujo por la distancia finita al punto de producción, un efecto emparentado con pero distinto de $\mathcal{A}_{geo}$ — y favorece siempre a la región temprana. El tercer factor es el *único* de los tres que depende de la energía del muón, y es el candidato natural para explicar un eventual exceso tardío. Su comportamiento con E es central para esta tesis: la derivada de este término respecto de E ,

$$\frac{d}{dE} \exp \left(\frac{(\sin \alpha_{temprano} - \sin \alpha_{tardio}) E}{cQ} \right) = \frac{\sin \alpha_{temprano} - \sin \alpha_{tardio}}{cQ} \cdot (\dots) > 0 \quad (\text{pues } \alpha_{temprano} > \alpha_{tardio}) \quad (3.5)$$

es **estrictamente positiva**: la ganancia cinemática es una función *monótonamente creciente* de la energía del muón. Es próxima a la unidad (sin efecto neto) cerca de $E \rightarrow 0$ y sólo se vuelve apreciable una vez que E es suficientemente alta. Existe, por lo tanto, una energía de cruce E^* —dependiente de (r, θ, D, Q) — por debajo de la cual la Ec. 3.4 favorece a la región temprana (domina el término espacial) y por encima de la cual favorece a la región tardía (domina el término exponencial).

Esto obliga a revisar con cuidado la asignación fenomenológica de las poblaciones muónicas introducidas más arriba:

- **Población A (Alta Energía):** muones con $p_z \gg p_t$ y ángulo de divergencia α pequeño. Al ser E suficientemente alta, es esta población —no la de baja energía— la que puede en principio activar la ganancia cinemática exponencial y favorecer a la región tardía.
- **Población B (Baja Energía):** muones con $p_z \sim p_t$ y divergencia α grande. Al ser E pequeña, la ganancia exponencial de la Ec. 3.4 es despreciable (≈ 1) y el término espacial —siempre favorable a la región temprana— domina el cociente: esta población, lejos de generar por sí sola el exceso tardío, contribuye con el mismo signo que la atenuación atmosférica y que $\mathcal{A}_{geo}$.

Determinar en qué régimen de (E, D, r, θ) se satisface efectivamente $E > E^*$ para la población de muones dominante en cada detector no es una consecuencia automática de la Ec. 3.3: requiere una evaluación cuantitativa explícita, dado que E^* resulta comparable al propio umbral de detección del UMD para las distancias de producción típicas citadas en la literatura ($D \sim 5\text{--}10$ km [4, 5]). Este mecanismo compite entonces, de manera no trivial, tanto con la atenuación atmosférica como con $\mathcal{A}_{geo}$: sólo si la población dominante en un detector se encuentra por encima de E^* puede llegar a revertir el signo de la asimetría total.

La existencia de este mecanismo sugiere, a primera vista, una oportunidad experimental vinculada a los umbrales de detección: si la ganancia cinemática exponencial es la responsable del exceso tardío, un instrumento con un corte de energía estricto —como el blindaje de 2,3 m de tierra del UMD, que impone $E_\mu \gtrsim 1$ GeV/cos θ — actuaría como un filtro que la suprime, preservando la asimetría positiva de atenuación. Conviene, sin embargo, evaluar esta expectativa de manera cuantitativa antes de adoptarla, y el resultado no la respalda.

Para ello es necesario promediar la Ec. 3.4 sobre el espectro energético real de muones, lo cual requiere dos precauciones. Primero, la magnitud físicamente relevante no es el promedio del cociente $\langle S_{tardio}/S_{temprano} \rangle$, sino el cociente de los flujos integrados en cada región: la región temprana exige el ángulo *mayor* y por lo tanto está exponencialmente más suprimida a *toda* energía, de modo que pesar ambas regiones con el mismo espectro de producción $N(E) \propto E^{-\gamma}$ elimina precisamente el efecto de selección que se quiere medir. Segundo, la distribución angular de la Ec. 3.3, correctamente normalizada a partir de $dN/dp_t \propto p_t \exp(-p_t/Q)$, incorpora un prefactor $k^2 \equiv (E/cQ)^2$: éste se cancela en el cociente tardío/temprano a energía *fija*, pero no bajo una integral espectral, ya que expresa que un muón energético concentra su emisión en un ángulo sólido $\sim 1/k^2$ y contribuye por lo tanto con una densidad mayor en la dirección en que efectivamente se emite.

Evaluando el cociente de flujos integrados con ambas correcciones, en el punto de referencia $r = 1200$ m y $\theta = 35^\circ$ (con $D = 7,5$ km, $Q = 0,2$ GeV y $\gamma = 2,6$), se obtiene un resultado contrario a la expectativa del filtro cinemático: la amplitud predicha *disminuye* al elevar el umbral, pasando de $A_1 \approx +0,16$ para un umbral tipo SD ($E_{th} = 0,155$ GeV, el mínimo de la simulación)

a $A_1 \simeq +0,02$ para el umbral efectivo del UMD ($\simeq 1,22$ GeV a este ángulo), y cruzando a valores negativos para umbrales superiores a ~ 2 GeV. Es decir: el mecanismo cinemático, evaluado consistentemente, predice que el UMD debería exhibir una asimetría *menos* positiva que el SD, cuando lo que se mide en las simulaciones es exactamente lo contrario (Capítulos 5 y 6). La divergencia cinemática es, por lo tanto, un mecanismo real y correctamente derivado, pero no constituye por sí sola la explicación del contraste observado entre ambos detectores, y la imagen del umbral del UMD como “filtro” que elimina una población responsable del exceso tardío no sobrevive a una evaluación cuantitativa. El origen físico de dicho contraste se retoma en el Capítulo 6.

3.2.4. Efectos por el campo geomagnético terrestre

Finalmente, la simetría se ve alterada por la acción de la fuerza de Lorentz sobre la componente cargada de la lluvia. El campo geomagnético terrestre ($\vec{B}$) induce una deflexión en la trayectoria de los muones según la relación $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$, separando lateralmente a los muones de cargas opuestas (μ^+ y μ^-).

Esta deflexión introduce una distorsión sistemática que se superpone a la asimetría temprano-tardía. Dado que el Observatorio Pierre Auger recibe lluvias con una distribución uniforme en el ángulo azimutal de incidencia (ϕ_{shower}), el vector de la fuerza de Lorentz varía su orientación relativa respecto al plano de la lluvia en cada evento. Sin un filtrado o corrección por dirección de arribo, este fenómeno actúa como una fuente de ruido coherente que dispersa los valores de densidad medidos. En el marco de un ajuste armónico global, esta dispersión se manifiesta como una reducción espuria en la amplitud del parámetro A_1 , subestimando la asimetría real inducida por la atenuación y la geometría. Para el rango de energías y ángulos cenitales aquí abordados, este efecto se considera de segundo orden.

Sin embargo, en el régimen de lluvias extremadamente inclinadas ($\theta > 80^\circ$), el largo camino atmosférico permite separaciones espaciales masivas entre muones positivos y negativos, convirtiendo a la deflexión magnética en el mecanismo dominante de asimetría. Estudios recientes presentados en la Reunión de la Colaboración Pierre Auger por M. Scornavacche [7] y otros [8], demuestran que esta deformación de los mapas muónicos es una herramienta potente para la discriminación de masa primaria en eventos horizontales, lo que resalta la importancia de caracterizar correctamente todas las fuentes de asimetría para complementar el análisis en lluvias de inclinación intermedia presentado en este trabajo.

3.3. Parametrización armónica de primer orden

Para cuantificar esta ruptura de simetría en la Función de Distribución Lateral (LDF), Billoir et al. [9] propusieron la inclusión de una parametrización de modulación cosinusoidal. Siguiendo este formalismo, la densidad de partículas (o la señal del detector) en el plano de la lluvia se modela como una función armónica de primer orden:

$$S(r, \phi) = \langle S(r) \rangle (1 + A_1(r, \theta) \cos \phi) \quad (3.6)$$

donde $\langle S(r) \rangle$ es la densidad promedio a la distancia r para una lluvia completamente simétrica, A_1 representa la amplitud de la asimetría temprano-tardía, y ϕ es el ángulo azimutal de las estaciones en el plano de la lluvia. Un valor de $A_1 > 0$ indica dominancia de la atenuación

atmosférica (pico en la región temprano), mientras que un $A_1 < 0$ señala la dominancia de efectos geométricos (pico en la región tardía).

Un objetivo central de este trabajo es también caracterizar la sensibilidad del parámetro A_1 respecto a la naturaleza del primario y la energía de la lluvia. Esta exploración es fundamental, ya que la amplitud de la asimetría está intrínsecamente vinculada al estado de desarrollo de la cascada y, por ende, constituye un estimador independiente de la composición de masa. Es importante destacar que esta parametrización asume que el mecanismo dominante en el rango de detección del UMD es la atenuación atmosférica, lo que se traduce en valores de A_1 positivos. Bajo esta premisa, y en concordancia con la metodología empleada para los detectores de superficie WCD y SSD [3], se optó por fijar la fase de la modulación en $\phi_0 = 0$. Esta restricción impone que el eje de simetría de la asimetría coincida con la línea temprano-tardía, maximizando la sensibilidad del ajuste al desarrollo longitudinal de la lluvia.

Históricamente, el estudio de asimetrías azimutales en el Observatorio Pierre Auger se ha centrado en las señales medidas por el Detector de Superficie (SD) por ser el detector inicial del Observatorio. Los primeros estudios fenomenológicos como los de Pryke [2] y Billoir et al. [9] identificaron los patrones de asimetría en estaciones Cherenkov. Recientemente, con la actualización AugerPrime, Bradfield [3] realizó análisis sistemáticos utilizando los detectores de superficie centelladores (SSD) combinados con los WCD, corroborando la utilidad de estas asimetrías para estudios de composición de masa.

Sin embargo, debido a que la señal del SD está invariablemente dominada por la componente electromagnética a los ángulos cenitales considerados, la magnitud intrínseca y la fenomenología de la asimetría temprano-tardía para una señal pura de muones duros ha permanecido inexplorada y no necesariamente esperamos que se comporte de manera estrictamente análoga. Abordar este vacío utilizando las capacidades del UMD como detector específicamente de muones, es el propósito central de los siguientes capítulos.

5. Caracterización de la Asimetría en el Anillo Denso

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis de la asimetría azimutal en la densidad de muones utilizando la configuración de *Anillo Denso*. Este marco permite estudiar la respuesta del detector y la física de la cascada en condiciones controladas, minimizando las incertidumbres vinculadas a la caída radial de la densidad de partículas. Además, este estudio permite mitigar las fluctuaciones estadísticas que podrían presentarse debido a la distribución física irregular de las estaciones en el terreno, garantizando una alta estadística por bin azimutal. Se analizan la estabilidad del parámetro A_1 , los efectos sistemáticos de la reconstrucción y, finalmente, la capacidad de este observable para la discriminación de la masa del rayo cósmico primario.

5.1. El Anillo Denso como entorno de control

La configuración de Anillo Denso representa el escenario ideal para caracterizar la modulación azimutal. Al situar 12 estaciones virtuales a una distancia radial fija de $r = 450$ m en el plano de la lluvia, se garantiza que cualquier variación en la señal detectada sea independiente de la Función de Distribución Lateral (LDF).

En este contexto, la densidad de partículas S se modela mediante un ajuste armónico de primer orden:

$$S(\phi) = \langle S \rangle (1 + A_1 \cos \phi) \quad (5.1)$$

donde ϕ es el ángulo azimutal de la estación en el plano de la lluvia, $\langle S \rangle$ es la densidad media en el anillo y A_1 es la amplitud de la asimetría. Como se discutió en el Capítulo 3, un valor de $A_1 > 0$ indica una dominancia del efecto de atenuación atmosférica (exceso en la zona temprana, $\phi = 0^\circ$), mientras que un $A_1 < 0$ reflejaría la dominancia de efectos geométricos y de divergencia radial (exceso en la zona tardía, $\phi = \pm 180^\circ$).

Dado que a $r = 450$ m el sistema se encuentra fuera de la región de dominancia geométrica pura ($r < 200$ m), se espera que la contribución de los efectos de atenuación atmosférica prevalezca frente a los efectos de divergencia, permitiendo una medición estable y positiva de A_1 .

En la Figura 5.1 se presenta un ejemplo del ajuste realizado para una muestra de protones (modelo hadrónico Sibyll 2.3e) en el bin de mayor inclinación ($59,3^\circ < \theta_{\text{shower}} < 65^\circ$). Los datos corresponden a la cantidad de muones reconstruida por el UMD (N_μ^{REC}). Se observan las doce estaciones virtuales equiespaciadas, donde las barras de error representan la desviación estándar estadística de la media. Se aprecia una modulación clara donde la diferencia de señal entre el máximo (región temprana) y el mínimo (región tardía) es de aproximadamente un 14 % (± 7 % respecto a la media), confirmando una ruptura de simetría significativa para la componente muónica.

Este análisis se extendió usando también los datos de tanto la cantidad de muones inyectados por CORSIKA (N_μ^{MC}) como la señal total registrada por los detectores de superficie (SD), permitiendo una comparación directa con estudios previos [3]. Para todos los datos se usaron las posiciones de las estaciones obtenidas a partir de la reconstrucción.




Figura 5.1: Ejemplo del ajuste armónico aplicado a la densidad de muones en el Anillo Denso para eventos de protón (Sibyll 2.3e). Los puntos representan las 12 estaciones virtuales y la curva sólida el ajuste del parámetro A_1 según la Ec. 5.1.

Es importante distinguir la naturaleza de los observables: mientras que el UMD cuantifica puramente la cantidad de muones, el SD registra la energía depositada total en unidades VEM (*Vertical Equivalent Muon*) [10]. Esta es una unidad de energía normalizada propia del detector que considera la energía depositada de todas las partículas que atraviesan el SD, ya sean pertenecientes a la componente muónica como electromagnética de la lluvia. La evolución de A_1 para todos los bins cenitales se resume en la Figura 5.2.

Al comparar las curvas, se observa que el SD presenta valores de asimetría significativamente mayores en bins de baja inclinación cenital, pero sufre un decaimiento abrupto a partir de $\theta_{\text{shower}} \gtrsim 50^\circ$.

Este comportamiento es consistente con la fenomenología de la cascada: en lluvias más verticales, la señal del SD está dominada por la componente electromagnética (electrones y fotones), que es órdenes de magnitud más numerosa que la muónica. La discrepancia en la magnitud de la asimetría entre el SD y el UMD se fundamenta en la naturaleza de los procesos de pérdida de energía de estas partículas secundarias. La componente electromagnética está gobernada por procesos de *bremsstrahlung* y creación de pares. Estos procesos están caracterizados por una longitud de radiación muy corta en la atmósfera, lo que provoca una atenuación exponencial rápida tras superar el máximo de la cascada. En contraste, los muones poseen una sección eficaz para la radiación de frenado mucho menor, dado que esta es inversamente proporcional al cuadrado de la masa. En consecuencia, pierden energía principalmente mediante ionización continua a una tasa mucho más baja y estable [11]. Esta diferencia en el poder de penetración explica por qué la amplitud A_1 es significativamente mayor en el SD (dominado por la atenuación abrupta de la componente EM) que en el UMD (que detecta puramente la componente muónica altamente penetrante).




Figura 5.2: Evolución de la amplitud A_1 con su error en función de θ para el UMD (REC en azul, MC en verde) y el SD (rojo). Se observa la inversión de dominancia entre el SD y el UMD a altas inclinaciones.

Sin embargo, a medida que aumenta la inclinación, el espesor atmosférico recorrido crece de forma no lineal, provocando que la componente EM sea casi totalmente absorbida antes de alcanzar el nivel del suelo. En este régimen de alta inclinación, la señal del SD pasa a estar dominada exclusivamente por muones, lo que explica la caída de la asimetría medida a niveles comparables o inferiores a los del UMD. El hecho de que el A_1 del SD caiga incluso por debajo de los valores del UMD se atribuye a la presencia de muones de baja energía. Tal como se demuestra en el modelo de transporte cinemático [4], estos muones de baja energía dominan a grandes distancias del núcleo y a mayores ángulos cenitales, sufriendo mayores deflexiones y retrasos geométricos. Como consecuencia, estas partículas de baja energía tienden a poblar de manera asimétrica la región tardía, lavando la asimetría de atenuación atmosférica positiva que sí logran preservar los muones más energéticos filtrados por el blindaje del UMD.

Finalmente, se observa una discrepancia sistemática entre los valores de asimetría A_1 obtenidos para los muones reconstruidos (N_{μ}^{REC}) y los muones inyectados (N_{μ}^{MC}) en el UMD. Esta diferencia, que indica un lavado o subestimación de la asimetría introducido por el framework de reconstrucción *Offline*, será analizada en detalle en la sección 5.2.

5.2. Efectos Sistemáticos: Discrepancias MC vs. REC

Como se evidenció en la Figura 5.2, existe una diferencia sistemática persistente entre la amplitud de asimetría A_1 obtenida a partir de muones inyectados (N_{μ}^{MC}) y muones reconstruidos (N_{μ}^{REC}). Dado que este análisis se realiza utilizando la geometría controlada del Anillo Denso, se descartan errores de paralaje o de reconstrucción del núcleo como fuente de la discrepancia.

Por lo tanto, el origen del sesgo debe buscarse en la respuesta del algoritmo de reconstrucción del UMD o en la validez de los ajustes.

En primera instancia, se evaluó la convergencia y estabilidad de los ajustes armónicos mediante la métrica de bondad de ajuste χ^2_ν . Los resultados para todos los bins cenitales se presentan en la Figura 5.3.

Para los datos del UMD, tanto en el nivel de simulación como de reconstrucción, se obtuvieron valores de $\chi^2_\nu \approx 1$. Esto confirma que el modelo armónico de primer orden describe adecuadamente la modulación muónica y que los ajustes son estadísticamente robustos. Esto permite descartar una inestabilidad del ajuste como la fuente de la diferencia ente los valores de asimetría del UMD.




Figura 5.3: Bondad de ajuste χ^2_ν para los bins cenitales. Se observa que los ajustes del UMD (REC y MC) se mantienen cercanos a la unidad, mientras que el SD presenta valores elevados debido a la alta precisión estadística de la muestra.

Por el contrario, los ajustes del SD presentan valores de χ^2/ndf significativamente mayores (alcanzando un máximo de ~ 10). Este comportamiento no implica un fallo del modelo, sino que es consecuencia de la elevada estadística de la muestra (dado que la cantidad de partículas que llegan a los detectores es mucho mayor). Al ser el error de la media extremadamente pequeño, el test de χ^2 se vuelve sensible a desviaciones de segundo orden o pequeñas asimetrías físicas que el modelo armónico simple no pretende capturar. La inspección visual del ajuste en el SD (ver Figura externa en el Anexo externa) confirma que la curva describe la tendencia general de los datos con precisión, pero la rigurosidad estadística del χ^2 penaliza los residuos mínimos que resultan significativos ante tan baja incertidumbre.

Para investigar la discrepancia en A_1 dentro del UMD, se analizó el rendimiento del algoritmo de reconstrucción de muones a nivel de estación. Se definió el Residuo Relativo de Muones como:

$$\text{Residuo Relativo} = \frac{N_{\mu}^{\text{REC}} - N_{\mu}^{\text{MC}}}{N_{\mu}^{\text{MC}}} \quad (5.2)$$

Esta métrica permite cuantificar el sesgo en el conteo de partículas de manera normalizada. La distribución de este residuo para la muestra de protones (Sibyll 2.3e) se muestra en la Figura 5.4.

Si bien la distribución está centrada cerca del cero con una resolución aceptable, presenta una asimetría marcada respecto del cero. Mientras que el error por sub-reconstrucción está limitado físicamente (el residuo no puede ser menor a -1), el algoritmo presenta una cola de sobre-reconstrucción donde el número de muones detectados puede superar ampliamente al inyectado. Este fenómeno de 'sobreconteo' es intrínseco a los algoritmos de reconstrucción.




Figura 5.4: Distribución del residuo relativo en la reconstrucción de muones. Aunque la media es cercana a cero, se observa una asimetría intrínseca con una cola extendida hacia la sobre-reconstrucción de partículas.

Se intentó ver si esta asimetría de la distribución respecto del cero podía explicar las diferencias de la amplitud de asimetría A_1 entre los datos REC y los datos MC. Para esto se construyó un modelo que implementase la distribución encontrada en la Figura 5.4 en los datos. Sin embargo, este procedimiento solo inyectó ruido estadístico en los ajustes, sin lograr desplazar los valores de A_1^{MC} hacia los niveles de A_1^{REC} . Este resultado negativo sugiere que el sesgo de reconstrucción no es uniforme, sino que posee una dependencia funcional con, por ejemplo, la posición de la estación o la densidad local de partículas.

5.2.1. Bias Direccional en la Reconstrucción

Se planteó la hipótesis de que el error de conteo del UMD no es uniforme, sino que presenta una dependencia con la región azimutal de la lluvia. Si el sobreconteo es proporcionalmente mayor en las zonas de baja densidad ($\phi \approx \pm 180^\circ$) que en las de alta densidad ($\phi \approx 0^\circ$), el efecto resultante sería un aumento artificial del 'piso' de la señal tardía. Esto reduciría la modulación relativa entre ambas regiones, resultando en una degradación sistemática de la amplitud A_1 reconstruida.

Para verificar esta premisa, se estudió la evolución del valor medio del residuo relativo para lluvias inclinadas ($40^\circ \leq \theta_{\text{shower}} \leq 65^\circ$) particionando la muestra en 12 bins azimutales equiespaciados en el plano de la lluvia. Los resultados se presentan en la Figura 5.5.




Figura 5.5: Distribución de la media del residuo relativo de reconstrucción en función del ángulo azimutal de la estación en el plano de la lluvia. Se evidencia un desempeño degradado en las regiones tardías ($\pm 180^\circ$), donde el sesgo de sobreconteo es máximamente superior al de la región temprana (0°).

Como se observa, el algoritmo de reconstrucción presenta un sesgo positivo significativamente mayor en las regiones tardías. Físicamente, esto se debe a que en las zonas de menor densidad, cualquier fluctuación estadística o error en la deconvolución de trazas tiene un impacto relativo mucho mayor sobre el valor medio, elevando artificialmente la densidad de muones allí donde la atenuación atmosférica debería ser máxima. Este efecto actúa como un ruido coherente que 'lava' la asimetría física intrínseca de la cascada.

5.2.2. Modelado del Bias: Implementación del *Toy Model* empírico

Para caracterizar el impacto del error de reconstrucción en la amplitud medida y verificar si el sesgo direccional es suficiente para explicar la discrepancia observada entre los datos ideales y los reconstruidos, se implementó un *Toy Model* de perturbación. Este modelo utiliza un enfoque de remuestreo empírico computacional, conocido como *Bootstrap* [12].

El algoritmo toma las densidades muónicas ideales (N_μ^{MC}) en cada bin azimutal y les inyecta un factor de error extraído aleatoriamente de la distribución real de residuos relativos evaluada en la Figura 5.5 segmentados por ϕ . Esta metodología garantiza dos condiciones físicas fundamentales: respeta estrictamente el límite de sub-reconstrucción (dado que el detector no puede reconstruir cantidades negativas de muones, el residuo empírico extraído siempre está acotado en un mínimo de -1), y captura con total fidelidad la cola asimétrica de sobreconteo característica del algoritmo del UMD.

De esta manera, se evalúa la degradación resultante en A_1 considerando exclusivamente el efecto del ruido de conteo direccional, aislándola de otras fuentes de incertidumbre como la reconstrucción del núcleo, permitiendo su comparación directa con la asimetría reconstruida (A_1^{REC}). Los resultados de este modelo se observan en la Figura 5.6.




Figura 5.6: Comparación de la amplitud de asimetría A_1 para muones inyectados (verde), reconstruidos (azul) y el resultado del *Toy Model* direccional (rojo). Se aprecian dos regímenes diferenciados de degradación de señal según la inclinación de la cascada.

El análisis de estos resultados demuestra que el *Toy Model* logra reproducir el comportamiento de los datos reconstruidos, diferenciándose en dos grandes regímenes cinmáticos:

- **Régimen cuasi-vertical ($\theta \lesssim 35^\circ$):** La amplitud de asimetría generada por el *Toy Model* direccional se superpone casi con exactitud sobre la curva de la reconstrucción del detector (A_1^{REC}). Esto constituye una evidencia robusta de que, en bins de baja inclinación, la

totalidad de la pérdida de asimetría se origina en el sesgo de sobreconteo direccional del algoritmo de reconstrucción.

- **Régimen de media y alta inclinación ($\theta \gtrsim 35^\circ$):** Si bien el sesgo direccional introducido logra explicar más del 50 % de la degradación observada frente a los datos ideales, la curva del *Toy Model* no alcanza a replicar la totalidad de la caída en A_1^{REC} . Esta divergencia remanente en el régimen más inclinado indica la presencia de efectos topológicos o cinemáticos de segundo orden, tales como el *lavado* azimutal introducido por la incertidumbre en la posición del núcleo o el *clipping-corner*, que un modelo estadístico puramente basado en conteo unidimensional no logra capturar.

Esta divergencia remanente señala el límite de un modelo puramente basado en la densidad de partículas. Para reproducir íntegramente la degradación de A_1^{REC} a altas inclinaciones, el modelo empírico debería incorporar también la incertidumbre geométrica de la reconstrucción. Como se adelantó conceptualmente en la Sección externa, la incerteza al ubicar la posición del impacto del núcleo reconstruido introduce un error en el cálculo del ángulo azimutal ϕ de cada detector en el plano de la lluvia. Considerando que la resolución típica del arreglo para la determinación del núcleo es del orden de los 20 m, a grandes inclinaciones, debido a los efectos de compresión espacial por la proyección del frente de cascada sobre el terreno, estas variaciones generan incertezas grandes en el ángulo ϕ asignado a las estaciones. Este *lavado* azimutal provoca que la modulación armónica se aplane aún más al mezclar cruzadamente la señal de zonas tempranas y tardías. La inyección de un ruido espacial a las coordenadas del núcleo en el *Toy Model* constituiría la extensión natural para unificar y replicar los efectos instrumentales de conteo y geometría.

5.2.3. Bias Geométrico: Absorción de la Asimetría por la LDF

Tal como se evidenció, el sesgo de sobreconteo direccional no logra explicar la totalidad del lavado de asimetría para lluvias de alta inclinación ($\theta \gtrsim 35^\circ$) en el entorno del Anillo Denso. Esto sugiere la presencia de una segunda fuente de error sistemático. Si bien las estaciones virtuales del Anillo Denso se sitúan a un radio fijo ideal ($r = 450$ m) respecto al núcleo reconstruido, la posición absoluta de este núcleo es determinada por el algoritmo utilizando los detectores reales del arreglo (*Infill*). Cualquier error sistemático en la posición de dicho núcleo afectará el cálculo angular de las estaciones virtuales que lo orbitan.

Para investigar la precisión geométrica de esta reconstrucción, se analizó el error en la determinación de la coordenada radial utilizando datos de las estaciones reales del *Infill*. En la Figura 5.7 se presenta el error radial ($\Delta r = r_{MC} - r_{REC}$) en función del azimutal verdadero de la estación (ϕ_{MC}) en el plano de la lluvia. Se grafican solo las estaciones que se encuentra entre $r_{REC} \in [0, 1400]m$ del eje de la lluvia.

Este gráfico revela una modulación geométrica sistemática dependiente de la región de la lluvia. En la región temprana ($\phi \approx 0^\circ$), el error es negativo ($\Delta r < 0 \implies r_{REC} > r_{MC}$), indicando que el algoritmo de reconstrucción sitúa a las estaciones artificialmente más lejos del núcleo de lo que realmente están. Inversamente, en la región tardía ($\phi \approx \pm 180^\circ$), el error es positivo, donde la reconstrucción las sitúa a las estaciones más cerca del núcleo de lo que debería. Esta deformación armónica constituye la evidencia directa de que el algoritmo de reconstrucción desplaza sistemáticamente el núcleo desde su verdadera posición hacia la región tardía de la lluvia.




Figura 5.7: Distorsión de la coordenada radial de las estaciones del *Infill* en función del ángulo azimuthal. La modulación armónica demuestra que el núcleo reconstruido no sufre un esparsamiento aleatorio, sino un corrimiento sistemático a lo largo del eje temprano-tardío.

Una justificación física propuesta para explicar este comportamiento radica en la transición fenomenológica de la cascada y su conflicto intrínseco con la parametrización simétrica de la Función de Distribución Lateral (LDF). En el algoritmo de reconstrucción estándar la LDF, que se parametriza exclusivamente usando el SD, es asumida dependiente de la distancia radial pero estrictamente simétrica respecto del ángulo azimuthal en el plano de la lluvia. A bajas inclinaciones, la fuerte atenuación de la abundante componente electromagnética genera asimetrías que son manejables dentro de los errores de resolución. Sin embargo, a medida que aumenta la inclinación cenital ($\theta \gtrsim 40^\circ$), la señal medida en superficie pasa a estar dominada por muones. Como se desarrollado, los muones de baja energía aumentan y se acumulan preferencialmente en la región tardía de la lluvia [4]. Esto genera una asimetría física real donde la zona tardía presenta un exceso espurio de densidad respecto a la zona temprana.

Es precisamente en este punto donde la imposición matemática del modelo simétrico falla sistemáticamente. Al intentar ajustar la posición del núcleo minimizando la función de costo, el algoritmo encuentra estaciones en la región tardía con un exceso anómalo de señal que su modelo simétrico no puede explicar si el núcleo estuviera en su posición verdadera. Dado que la LDF no contempla modulación azimuthal, la única manera que tiene el ajustador para compensar esta discrepancia y lograr la convergencia es alterar la variable espacial: interpreta el exceso de señal como proximidad al eje de la cascada y la falta de señal como lejanía. Como consecuencia directa, el minimizador arrastra el núcleo reconstruido desde su posición real hacia la región tardía.

Este mecanismo explica la degradación de A_1^{REC} a altas inclinaciones que el *Toy Model* de conteo no pudo replicar. El algoritmo *Offline* impone un modelo simétrico sobre un fenómeno físicamente asimétrico (que se acentúa con el ángulo cenital de la lluvia), logrando la convergencia al costo de absorber la asimetría de señal a través de un error de posición de las estaciones.

Al evaluar la modulación armónica azimutal desde este núcleo reconstruido y desplazado, las estaciones tempranas quedan artificialmente más lejos de su posición relativa y las tardías artificialmente más cerca. La asimetría física es matemáticamente absorbida por el desplazamiento del núcleo, lavando la modulación azimutal y reduciendo de manera sistemática la amplitud A_1 observada en el UMD.

Este desplazamiento del núcleo impacta de manera crítica incluso a los datos del Anillo Denso, explicando la caída remanente del parámetro A_1^{REC} que el *Toy Model* no pudo capturar. Aunque las estaciones del anillo virtual se sitúan a un radio de 450 m respecto al núcleo reconstruido, al estar dicho núcleo desplazado, el anillo resulta excéntrico respecto a la cascada real (MC). Esto introduce dos efectos acoplados que degradan la señal:

1. **Lavado Azimutal:** Al calcular el ángulo en el plano de la lluvia desde un centro falso, el azimut asignado a cada estación difiere de su azimut físico real, mezclando de manera cruzada las señales de zonas de alta y baja densidad en el ajuste armónico.
2. **Retroalimentación en el Conteo de Muones:** Los algoritmos del UMD que convierten las trazas de deposición de energía a número de muones reconstruidos dependen fuertemente de la geometría de incidencia de la partícula. Al suministrarse parámetros geométricos erróneos (distancias y ángulos falsos derivados del núcleo desplazado), la reconstrucción del UMD impone sesgos no lineales. Sistemáticamente se subsamplean muones en la región temprana y se sobreestiman en la tardía para forzar la compatibilidad con el modelo de LDF asimétrico, consolidando la degradación de la asimetría de atenuación original.

En síntesis, la imposición de una LDF simétrica sobre lluvias físicamente asimétricas induce un corrimiento del núcleo que corrompe tanto la posición angular como la reconstrucción local de la señal. Esto demuestra que la asimetría física observada a nivel Monte Carlo es suprimida algorítmicamente durante la reconstrucción *Offline*, lo que explica la caída de amplitud reportada a niveles de altas inclinaciones.

5.3. Estudios de Robustez

Se estudio también el comportamiento del detector y el parámetro de asimetría, al enfrentarse a situaciones en las que, al ser circunstancia donde la física es la misma especialmente considerando los efectos de la atenuación atmosférica, no se espera ver cambios en su performance.

5.3.1. Invariancia azimutal de incidencia (ϕ_{shower})

Para asegurar que la asimetría medida sea una propiedad intrínseca de la cascada y no un artefacto de la orientación del arreglo, se evaluó la estabilidad de A_1 en función del ángulo azimutal de entrada de la lluvia (ϕ_{shower}). Para esto se separaron los datos del anillo denso en 6 bins equiespaciados en función del angulo de incidencia de la lluvia y se repitió el análisis explicando en la sección 5.1 para cada uno de ellos.




Figura 5.8: Amplitud A_1 en función del ángulo azimutal de la lluvia. Se observa la independencia del observable respecto a la dirección de arribo.

En la Figura 5.8 se analizó el dataset de protones con el modelo Sibyll 2.3e para lluvias inclinadas ($40^\circ < \theta < 60^\circ$). Se ve que el valor ajustado del parámetro de asimetría A_1 no depende del ángulo de incidencia de la lluvia, como era esperado. Esto es una buena prueba de estrés para los fundamentos del trabajo y que garantiza que se puede avanzar en el análisis en pos de hacer discriminación de masa. Nuevamente aparece la discrepancia entre los valores absolutos de asimetría usando los muones inyectados y los reconstruidos.

5.3.2. Independencia del modelo hadrónico

Análogamente, se evaluó la robustez de la asimetría A_1 frente al uso de diferentes modelos de interacciones hadrónicas en las simulaciones. Para ello, se comparó la evolución del parámetro A_1 para un mismo primario (Helio) y rango de energía utilizando diferentes librerías fenomenológicas. Dada la disponibilidad de datos detallada en el Capítulo 4, se contrastaron las cascadas simuladas con los modelos SIBYLL 2.3e y QGSJet-III.01.

Aunque no existe garantía teórica de que ambos modelos predigan densidades totales de muones idénticas (debido a las diferencias en el déficit muónico intrínseco de cada parametrización), la modulación relativa A_1 debería presentar una consistencia cualitativa. Confirmar esta independencia es fundamental para validar el uso de la asimetría en la discriminación de masa y justificar la potencial combinación de conjuntos de datos para incrementar la estadística.

Para llevar a cabo esta validación, se replicó el análisis angular realizando ajustes indepen-

dientes por bin cenital, tal como se detalló en la sección 5.1. A su vez, se calculó la diferencia relativa porcentual entre los valores de amplitud obtenidos por ambos modelos, propagando las incertezas estadísticas correspondientes. La comparación de estas distribuciones se presenta en la Figura 5.9.




Figura 5.9: Comparación de la amplitud A_1 para lluvias de Helio simuladas con diferentes modelos hadrónicos. El panel inferior muestra que la diferencia relativa se mantiene mayoritariamente dentro de una banda de tolerancia aceptable, indicando una tendencia común independiente del modelo.

Como se observa en el panel superior, la evolución de la asimetría presenta una consistencia morfológica excelente entre ambos modelos a lo largo de todo el rango angular. El panel inferior cuantifica esta concordancia: la diferencia relativa se mantiene predominantemente dentro de una banda de tolerancia del $\pm 10\%$, con desviaciones estadísticas puntuales que no superan el 15% . Este resultado confirma empíricamente que la amplitud de la asimetría azimutal A_1 es un observable robusto. Su forma funcional y magnitud relativa están dominadas por la cinemática macroscópica de la cascada y la atenuación atmosférica, manteniéndose esencialmente invariantes frente a los detalles microscópicos del modelo de interacción hadrónica empleado por el generador de Monte Carlo.

5.4. Dependencia de la amplitud A_1 con la energía del primario

Para evaluar la estabilidad del observable frente a variaciones cinemáticas, se analizó la evolución del parámetro de asimetría A_1 en función de la energía del rayo cósmico primario dentro de la banda de interés, $\log_{10}(E/\text{eV}) \in [17,5, 18,0]$. Utilizando el conjunto de simulaciones de protones (SIBYLL 2.3e) restringido al rango angular de mayor desarrollo de asimetría ($40^\circ \leq \theta \leq 60^\circ$), los datos se particionaron en 5 bins de energía reconstruida. Los resultados de los ajustes armónicos para cada intervalo se presentan en la Figura 5.10.




Figura 5.10: Evolución de la amplitud de asimetría A_1 en función de la energía reconstruida para cascadas de protón simuladas con SIBYLL 2.3e. Se observa un leve incremento lineal en la asimetría a mayores energías, presente tanto a nivel Monte Carlo como en la reconstrucción.

A priori, al tratarse de un rango energético relativamente estrecho (media década logarítmica), no se esperaba observar una fuerte dependencia funcional. Sin embargo, los resultados revelan un leve pero sistemático incremento lineal de la amplitud A_1 a medida que aumenta la energía, comportamiento que es capturado consistentemente tanto por los datos ideales (MC) como por los reconstruidos (REC).

La hipótesis de trabajo propuesta para explicar este comportamiento físico radica en el corrimiento de la profundidad del máximo de desarrollo de la cascada (X_{max}). Teóricamente, un aumento en la energía del primario implica que la lluvia penetra más profundamente en la atmósfera antes de alcanzar su número máximo de partículas, acercando el X_{max} al nivel del suelo y, por lo tanto, reduciendo la distancia efectiva de producción D entre el origen de los muones

y los detectores. Es importante notar que este no es el mismo mecanismo que domina en el SD: la asimetría de la componente electromagnética, gobernada por la atenuación, en realidad se *reduce* al acercarse al máximo de desarrollo, ya que depende del gradiente longitudinal local de la cascada (Sección 5.6.1). La asimetría puramente muónica que domina en el UMD, en cambio, está regida por el mecanismo cinemático de divergencia del flujo, $A_\mu \approx 2r \sin \theta / D$ (Ec. 5.6), que *crece* al disminuir D —de signo opuesto al de la componente EM frente a la misma variación de X_{max} . Esta distinción se desarrolla y se verifica cuantitativamente, contrastando la predicción de la Ec. 5.6 contra la tasa de elongación estándar de X_{max} , en la Sección 5.6.1, donde se obtiene un acuerdo de orden de magnitud con el incremento aquí reportado.

Desde el punto de vista metodológico, el hallazgo más relevante de este escrutinio es la escala de la variación. Si bien la dependencia con la energía existe, la variación absoluta del parámetro a lo largo de toda la década es marginal ($\Delta A_1 \approx 0,015$). Esta estabilidad garantiza que la integración de todos los eventos del rango $\log_{10}(E/\text{eV}) \in [17,5, 18,0]$ no inducirá un lavado ni ensanchará significativamente las distribuciones de manera crítica. Por consiguiente, queda plenamente justificado realizar el estudio de discriminación de masa primaria utilizando el *dataset* completo de forma integrada, lo cual resulta imperativo para maximizar el poder estadístico sin comprometer la sensibilidad del observable.

5.5. Discriminación de Masa Primaria: Protón vs. Hierro

Habiendo caracterizado los efectos sistemáticos y validado la estabilidad de la reconstrucción en el entorno del Anillo Denso, el objetivo culminante de este análisis es evaluar la capacidad del observable A_1 para discriminar la naturaleza química del rayo cósmico primario. Para ello, se compararon las distribuciones de amplitud de asimetría para las poblaciones extremas de masa: primarios livianos (protones) y primarios pesados (hierro, conformados por 56 protones).

Al evaluar el parámetro A_1 para ambos conjuntos de datos con energías $\log_{10}(E/\text{eV}) \in [17,5, 18,0]$ usando el modelo hadrónico Sibyll 2.3e, se observó una separación sistemática entre las curvas. La población de protones desarrolla amplitudes de asimetría consistentemente mayores a las correspondientes a la población de hierro a lo largo del rango angular evaluado para la mayoría de los bins.

5.5.1. El Factor de Mérito (MF) y el *Sweet Spot* de discriminación

Para cuantificar rigurosamente el poder separador del observable, es necesario evaluar no solo la distancia entre los valores medios de ambas poblaciones, sino también su dispersión estadística. Con este fin, se utilizó como métrica de evaluación el Factor de Mérito (MF) como:

$$MF = \frac{|\langle A_1^P \rangle - \langle A_1^{\text{Fe}} \rangle|}{\sqrt{(\sigma_{A_1^P})^2 + (\sigma_{A_1^{\text{Fe}}})^2}} \quad (5.3)$$

Donde $\langle A_1 \rangle$ y σ_{A_1} representan el valor medio y la desviación estándar de la amplitud de asimetría ajustada para cada primario. Un valor de $MF > 1$ indica un régimen donde la separación entre las distribuciones supera a sus anchos característicos, permitiendo una discriminación estadística robusta. En la Figura 5.11 se presenta la evolución del Factor de Mérito en función del ángulo cenital de la cascada.

El análisis de esta figura revela un comportamiento fuertemente dependiente de la inclinación. Se identifica de manera clara una región óptima, o *Sweet Spot* de discriminación, en el rango angular $40^\circ \leq \theta \leq 55^\circ$. En esta ventana, el MF alcanza valores máximos del orden de $\approx 2,5$, garantizando la excelente capacidad de la amplitud de asimetría para hacer separación de masas.




Figura 5.11: Evolución del Factor de Mérito (MF) en función del ángulo cenital. Se identifica un *Sweet Spot* de máxima separación entre bins de 40° y 55° , donde el poder de discriminación alcanza su máximo antes de degradarse por efectos instrumentales.

Fuera de este rango, el poder de discriminación decae abruptamente o se vuelve inestable debido a dos regímenes limitantes de carácter completamente distinto:

1. **Régimen de baja inclinación ($\theta < 35^\circ$):** En cascadas cuasi-verticales, la diferencia de camino atravesado por las partículas entre la región temprana y tardía es mínima. Por lo tanto, la asimetría de atenuación física es en modulo tan pequeña que la diferencia absoluta entre protón y hierro resulta imperceptible, quedando enmascarada por las fluctuaciones estadísticas propias de la lluvia.
2. **Régimen de alta inclinación ($\theta > 60^\circ$):** Aunque a estos ángulos la asimetría física debería ser máxima, entra en juego el colapso de la reconstrucción instrumental. Tal como se demostró exhaustivamente en la Sección 5.2, a grandes inclinaciones el ajustador *Offline* induce un corrimiento sistemático del núcleo, entre otros problemas. Este sesgo geométrico genera un lavado azimutal y un sobreconteo direccional de muones que distorsiona la asimetría. Este efecto no solo achata artificialmente las medias de A_1 , reduciendo el numerador del MF , sino que introduce un ruido correlacionado masivo que dispara el tamaño de las desviaciones estándar (σ), destruyendo por completo la capacidad discriminatoria del detector en este régimen.

5.6. Interpretación Física: dependencia con el X_{max}

La existencia de una separación sistemática donde $\langle A_1^P \rangle > \langle A_1^{Fe} \rangle$ no es un resultado estadístico aislado, sino la manifestación en superficie de la evolución longitudinal intrínseca de la cascada atmosférica. La hipótesis de trabajo que actúa como justificación física de este fenómeno radica en la dependencia de la asimetría azimutal con la profundidad atmosférica del máximo desarrollo de la lluvia (X_{max}), de manera análoga al análisis realizado en la Sección 5.4 respecto a la energía del primario.

Este comportamiento encuentra su marco teórico en el Modelo de Superposición y el modelo de Heitler-Matthews para cascadas hadrónicas [13]. Según este esquema, una cascada iniciada por un núcleo **pesado** de masa A y energía total E_0 se comporta estadísticamente como la superposición de A sub-cascadas nucleónicas independientes, cada una portando una fracción de energía E_0/A . Dado que la sección eficaz de interacción crece con el tamaño del núcleo, y la energía por nucleón es sustancialmente menor, las cascadas de hierro ($A = 56$) interactúan mucho más alto en la atmósfera que las de protón ($A = 1$). Como resultado directo, agotan su desarrollo longitudinal prematuramente, situando el X_{max} de una lluvia de hierro a una profundidad atmosférica significativamente menor (mayor altitud geográfica) comparado con las lluvias de protones.

Esta separación en la profundidad de máximo desarrollo entre especies primarias es un fenómeno empíricamente robusto, medido de forma extensiva por los telescopios de fluorescencia del Observatorio Pierre Auger [14]. En la Figura 5.12 se ilustra esta dependencia, evidenciando cómo el X_{max} se ubica más profundo a mayores energías y cómo los primarios livianos penetran sistemáticamente más que los pesados.




Figura 5.12: Evolución del valor medio de X_{max} (izquierda) y sus fluctuaciones (derecha) en función de la energía primaria, medido por el Observatorio Pierre Auger. Se observan las curvas teóricas de los modelos hadrónicos acotando el comportamiento entre protón (líneas rojas superiores) y hierro (líneas azules inferiores). Se ve también la dependencia lineal que hay entre el X_{max} y el logaritmo de la energía del primario. Extraído de [14].

Para comprender por qué esta diferencia en la profundidad del máximo impacta directamente sobre la amplitud de asimetría A_1 medida en superficie, es necesario analizar la dinámica del

desarrollo longitudinal y su proyección topológica sobre el arreglo.




Figura 5.13: El gráfico corresponde al evento de mayor energía detectado por el experimento Fly's Eye ($E \approx 3,2 \times 10^{20}$ eV) extraído de [15]. Se observa claramente la fase de multiplicación hasta alcanzar la profundidad del máximo, seguida de la atenuación de la cascada. La distancia recorrida de atmósfera hasta llegar al máximo es lo que se denomina X_{max} .

Como se ve en la Figura 5.13 a medida que la lluvia penetra en la atmósfera, experimenta una fase de multiplicación en avalancha hasta alcanzar la profundidad del máximo, X_{max} . Superado este umbral, la energía media de las partículas secundarias cae por debajo de la energía crítica para seguir alimentando la creación de nuevas partículas, momento en el cual los procesos de pérdida por ionización y el decaimiento dominan sobre la sección eficaz de interacción, forzando a la cascada a entrar en su fase de atenuación.

Dado que el UMD es un detector subterráneo, ciego a la componente electromagnética, la asimetría registrada debe depender estrictamente del historial de producción y transporte de la componente muónica. Los muones se originan principalmente a partir del decaimiento de mesones cargados (piones y kaones, ej. $\pi^\pm \rightarrow \mu^\pm + \nu_\mu$). La tasa de producción de estas partículas sigue de cerca el perfil longitudinal del cascada hadrónica y alcanza su propio máximo, denominado X_{max}^μ , a una profundidad muy similar al X_{max} [4].

La modulación azimutal remanente en esta componente muónica está gobernada fundamentalmente por un efecto de proyección geométrica acoplado a la divergencia angular de las partículas. Sea D la distancia que recorren las partículas, medida a lo largo del eje de la lluvia, desde la región de máxima producción muónica (X_{max}^μ) hasta el centro del arreglo de detectores en el suelo. Al incidir una cascada inclinada con ángulo cenital θ , la porción del frente de

partículas que impacta en la región tardía debe recorrer una distancia geométrica adicional Δd respecto a las partículas que impactan en la región temprana, para un mismo radio r en el plano de la lluvia.

Dado que la densidad de partículas provenientes de un haz colimado decae radialmente como la divergencia espacial $\propto 1/d^2$ [4], la magnitud de la asimetría temprano-tardía producida por este efecto depende fuertemente del cociente entre la diferencia de camino y la distancia total de propagación $\Delta d/D$.

Cuando una lluvia inducida por un núcleo de Hierro impacta contra el arreglo, el observador percibe una cascada en un estado longitudinal maduro. Debido a que su X_{max} se encuentra a bajas profundidades atmosféricas (altas altitudes geográficas), la distancia geométrica D desde el punto de producción hasta el suelo es inmensa. En consecuencia, el camino extra Δd requerido para alcanzar la región tardía representa una fracción marginal del trayecto total ($\Delta d/D \ll 1$). Además tras recorrer decenas de kilómetros, la dispersión cinemática intrínseca y la deflexión geomagnética homogenizan las trayectorias de los muones, mitigando las diferencias bruscas y resultando en una distribución azimutalmente uniforme, lo que se traduce en un valor de A_1 comparativamente bajo.

En contraste, los primarios livianos (Protones) penetran profundamente en la atmósfera, situando su X_{max} mucho más próximo a la superficie topográfica. Esta proximidad reduce severamente la distancia D , incrementando significativamente el peso relativo de la dispersión espacial ($\Delta d/D$). Para frentes de cascada ubicados cerca del punto de observación, la atenuación longitudinal castigan asimétricamente a la región tardía frente a la región temprana generando un valor de asimetría mayor.

En conclusión, la profundidad de penetración del primario modula la agudeza topológica de la cascada medida en tierra. Las lluvias con un X_{max} profundo (protones o lluvias de mayor energía) exponen al UMD a frentes de partículas más concentrados espacialmente, donde cualquier diferencia de proyección geométrica induce fluctuaciones grandes en las densidades relativas de muones. Este mecanismo fenomenológico consolida a la amplitud de asimetría A_1 no solo como un descriptor morfológico de la LDF, sino como un trazador valioso de la evolución longitudinal y, en última instancia, como un instrumento extra para realizar discriminación de la masa A del rayo cósmico primario.

5.6.1. Contraste fenomenológico con el Detector de Superficie

El comportamiento de la asimetría azimutal ha sido desarrollado en detalle en el trabajo de Bradfield [3] aplicado a las señales del Detector de Superficie (SD). Es pertinente contextualizar los resultados obtenidos con el UMD frente a dichos estudios para evidenciar la naturaleza divergente de las componentes de la cascada.

Al analizar la dependencia de la asimetría con la evolución longitudinal de la cascada, surge una discrepancia física fundamental. En los análisis realizados sobre el SD, se reporta que la magnitud de la asimetría experimenta un decrecimiento a medida que aumenta la profundidad del máximo (X_{max}). Este comportamiento es directamente opuesto a la dinámica observada empíricamente en el UMD en las simulaciones, donde frentes de cascada más profundos (primarios livianos o de mayor energía) inducen una mayor amplitud A_1 .

Esta aparente contradicción se puede explicar al considerar los regímenes físicos fundamentalmente distintos que dominan la propagación de cada componente atmosférica. La asimetría

medida por el SD está gobernada de manera abrumadora por la componente electromagnética ($e^\pm, \gamma$). Como fue formalizado por Dova *et al.* [16], la asimetría de esta componente surge de la variación azimutal en el espesor atmosférico atravesado. Al propagarse en un régimen de rápida atenuación, la amplitud de la asimetría resulta proporcional al gradiente local de la curva de desarrollo longitudinal de la cascada:

$$A_{EM} \propto \frac{1}{\rho_{EM}} \frac{\partial \rho_{EM}}{\partial X} \Delta X \quad (5.4)$$

Para las cascadas típicas observadas en Auger, el nivel del suelo se encuentra a una profundidad mayor que X_{max} , situando a los detectores en la fase de decaimiento de la curva de desarrollo. A medida que X_{max} aumenta y la lluvia penetra más en la atmósfera, el punto de observación se aproxima al máximo de la cascada. En esta región de la curva de Gaisser-Hillas, la pendiente de atenuación es significativamente más suave (el gradiente $\partial \rho_{EM} / \partial X$ tiende a cero). Al desvanecerse este gradiente, la diferencia neta de densidad entre las regiones temprana y tardía inducida por el ΔX se suprime, lo que provoca el colapso sistemático de la asimetría observada en el SD reportado en [3].

En estricto contraste, el UMD registra de manera pura la componente muónica. Tal como fue establecido inicialmente por Billoir [5] y expandido en los modelos de Ave *et al.* [17], los muones de alta energía poseen una propagación cuasi-rectilínea y su distribución responde a la distancia geométrica al punto de producción en lugar del espesor atmosférico. Consecuentemente, su modulación azimutal es un efecto cinemático derivado de la divergencia del flujo de partículas, donde la densidad en el suelo decae con la inversa del cuadrado de la distancia ($\rho_\mu \propto 1/d^2$).

Para una lluvia cuyo centro se produce a una distancia D sobre el eje, un detector ubicado a un radio r en el suelo se encuentra a una distancia efectiva $d \approx D - r \sin \theta \cos \phi$ respecto a la fuente, debido a la inclinación del frente. Aplicando una expansión de Taylor de primer orden (válida para $r \ll D$), la densidad angular resulta:

$$\rho(\phi) \propto \frac{1}{(D - r \sin \theta \cos \phi)^2} \approx \frac{1}{D^2} \left(1 + 2 \frac{r \sin \theta}{D} \cos \phi \right) \quad (5.5)$$

Comparando esta expresión con la parametrización armónica estándar $\rho(\phi) = \rho_0(1 + A_1 \cos \phi)$, se deriva directamente que la asimetría muónica depende de la inversa de la distancia de producción:

$$A_\mu \approx 2 \frac{r \sin \theta}{D} \quad (5.6)$$

Un evento con un X_{max} profundo implica que el rayo cósmico ha penetrado más en la atmósfera, situando el punto de producción muónica significativamente más cerca de los detectores. Esta proximidad reduce drásticamente el denominador D en la Ec. 5.6. Al achicarse la distancia total de propagación, las diferencias espaciales relativas se magnifican, justificando el marcado incremento de la amplitud A_1 medido en el UMD para lluvias más penetrantes.

Esta hipótesis admite una verificación cuantitativa directa, más allá del argumento cualitativo anterior, combinándola con la tasa de elongación estándar de X_{max} , $dX_{max}/d \log_{10} E \approx 55\text{--}60 \text{ g/cm}^2$ por década [14]. Utilizando un modelo de atmósfera isotérmica estándar para convertir esta variación de X_{max} en un corrimiento de la distancia de producción D (evaluado en $\theta = 50^\circ$, punto medio de la banda angular $[40^\circ, 60^\circ]$ analizada en la Sección 5.4, con

$D_{\text{ref}} = 7,5$ km, valor central citado tanto por Cazón [4] como por Bertou y Billoir [5]), la media década en $\log_{10}(E/\text{eV})$ de la Figura 5.10 corresponde a $\Delta X_{\text{max}} \approx 28\text{--}30$ g/cm², es decir $\Delta D \approx -460$ a -500 m. Sustituyendo en la Ec. 5.6 se predice un incremento $\Delta A_1 \approx +0,006$ a $+0,007$ (o $\Delta A_1 \approx +0,009$ a $+0,010$ si se evalúa el cociente exacto $(d_{\text{temprano}}/d_{\text{tardío}})^2$ en lugar de la aproximación de Taylor de primer orden), frente al $\Delta A_1 \approx 0,015$ efectivamente medido en la Sección 5.4. El mecanismo propuesto reproduce correctamente tanto el **signo** como el **orden de magnitud** del efecto, con un factor residual de $\sim 1,5\text{--}2,5$ sin explicar. Este remanente podría originarse en que la tasa de elongación específica de la profundidad de producción *muónica* difiera de la utilizada aquí (calculada para el máximo del desarrollo electromagnético), en una contribución adicional de $\mathcal{A}_{\text{geo}}$ (Sección 3.2.2, que también depende de D a través del ángulo local de incidencia y se suma al mecanismo puramente cinemático aquí evaluado), o en las fluctuaciones evento a evento de X_{max} dentro de cada bin de energía reconstruida, no consideradas en esta estimación puntual. Este acuerdo, aunque parcial, es suficiente para elevar la interpretación de la Sección 5.4 de una hipótesis puramente cualitativa a un mecanismo cuantitativamente respaldado, sin que esto implique que se trate de la única contribución en juego.

Finalmente, es crucial rediscutir la interpretación fenomenológica respecto a la composición primaria propuesta para el SD. Bradfield atribuye la menor asimetría del hierro respecto al protón, a igualdad de X_{max} , a su 'contenido adicional de muones'. Físicamente, la normalización absoluta de la componente muónica no altera la modulación relativa de su propia distribución. El origen de este corrimiento reside en el principio de superposición que ya se discutió en la sección 5.6. El SD mide una señal promediada ponderada por fracciones ($A^{SD} \approx f_{EM}A_{EM} + f_{\mu}A_{\mu}$). Como las lluvias inducidas por primarios pesados poseen una fracción de señal muónica (f_{μ}) intrínsecamente mayor, el promedio del SD otorga más peso estadístico al término menos asimétrico (A_{μ}), diluyendo la asimetría global observada.

Esta caracterización cinemática demuestra que el SD constituye un observable de difícil interpretación para estudios de composición a través de la asimetría, debido a la supresión de su gradiente longitudinal cerca del máximo. En contrapartida, el UMD aísla un mecanismo estrictamente proyectivo regido por $1/D$, consolidándose como un instrumento robusto y físicamente transparente para estudiar el desarrollo de la lluvia.

6. Dinámica Radial del Arreglo *Infill* en Simulaciones

Habiendo validado la fenomenología de la asimetría azimutal en el entorno geoméricamente controlado del Anillo Denso, se extendió el análisis a la topología real del arreglo de detectores pero aun utilizando simulaciones. A diferencia del Anillo Denso, el arreglo *Infill* o arreglo regular de 750 m, permite hacer un estudio sobre las estaciones de superficie y módulos enterrados reales, analizando el comportamiento de la asimetría en un espectro continuo de distancias al eje de la lluvia. Cabe destacar que, para mantener la coherencia con los estudios previos, la mayor parte del análisis desarrollado en esta sección utiliza exclusivamente la biblioteca de simulaciones de lluvias primarias de protones en el rango de energía de $\log_{10}(E/\text{eV}) \in [17,5, 18,0]$.

Un objetivo central de esta etapa consistió en caracterizar el impacto de la reconstrucción instrumental sobre la preservación del observable A_1 . Dado que en el entorno de simulaciones se tiene acceso simultáneo a la geometría verdadera de la lluvia (núcleo y ángulos Monte Carlo) y a su contraparte reconstruida, es posible evaluar el comportamiento del frente de partículas aislando la física subyacente de la degradación topográfica asociada a los errores sistematicos conocidos propios de la reconstrucción. En este capítulo se aborda cómo la dinámica de la cascada y la resolución del arreglo modulan la asimetría, marcando la transición desde un régimen de dominancia cinemática hacia uno de atenuación longitudinal.

6.1. Arreglo *Infill* usando el núcleo y ángulos Monte Carlo

Para comprender la evolución intrínseca de la modulación azimutal, el análisis inicial se ejecutó forzando al *pipeline* de procesamiento a utilizar las coordenadas del núcleo y la dirección de arribo extraídas directamente del nivel Monte Carlo. Esto permite estudiar la respuesta pura de los detectores sin el sesgo del difuminado espacial.

La fuerte dependencia radial y angular de los mecanismos que modulan la densidad de partículas exige una selección topográfica rigurosa. Por un lado, en la región radialmente cercana al centro de impacto ($r < 150$ m), la divergencia cinemática extrema descrita en la Sección 3.2.2 y el fuerte gradiente de la Función de Distribución Lateral (LDF) inducen fluctuaciones severas en la densidad. Promediar esta región junto con zonas más lejanas resulta contraproducente, ya que superpone regímenes fenomenológicos contradictorios. Por este motivo, se adoptó un binned radial dinámico de $\Delta r = 150$ m, aplicando un corte fiducial que excluye dicho *near-core*.

Simultáneamente, para evitar la mezcla de zonas tempranas y tardías del frente de partículas que diluiría el valor medio de la señal, se particionó la fase azimutal en 12 intervalos ($\Delta\phi = 30^\circ$). Esta necesidad de mantener una alta pureza fenomenológica garantizando al mismo tiempo la robustez estadística en cada bin, definió también la segmentación del ángulo cenital en ventanas de $\Delta\theta = 10^\circ$ (con un intervalo final ampliado para lluvias muy inclinadas, $50^\circ \leq \theta < 65^\circ$). Las grillas completas con los datos junto a los ajustes armónicos y sus respectivos valores de χ^2/ndf en este espacio de fases se reportan en el Anexo externa.

Al ajustar la densidad de muones registrada por el UMD a la función armónica como se describió en 5.1, se utilizó el estadístico de bondad de ajuste ($\chi^2/\text{ndf} \approx 1$) como métrica fundamental para validar las regiones con asimetría cuantificable. Esta convergencia estadística permite demostrar de manera contundente que, aislando correctamente las coronas radiales y angulares, la modulación azimutal muónica se describe a la perfección mediante un armónico de primer orden en ciertas regiones bien definidas, descartando la presencia de términos de orden

superior.

En la Figura 6.1 se sintetizan los resultados de este barrido global, presentando la evolución de la amplitud de asimetría A_1 extraída para el UMD en función de la distancia al eje r para las distintas inclinaciones.




Figura 6.1: Evolución de la amplitud de asimetría A_1 en función de la distancia al núcleo para distintos rangos de inclinación cenital. El análisis utiliza la geometría verdadera (Monte Carlo) y un bineado radial dinámico ajustado a la viabilidad estadística de cada régimen.

El comportamiento observado confirma las predicciones del modelo de competencia cinemática-atenuación y revela los límites de viabilidad estadística del arreglo:

- **Régimen Vertical** ($0^\circ \leq \theta < 10^\circ$): Como es esperable por simetría geométrica, las lluvias cuasi-verticales no exhiben una dirección temprana o tardía privilegiada frente a la atenuación atmosférica. La modulación azimutal es nula ($A_1 \approx 0$) a lo largo de todo el arreglo.
- **Régimen Intermedio** ($10^\circ \leq \theta < 40^\circ$): A medida que la lluvia se inclina, la diferencia de recorrido geométrico y la atenuación atmosférica transversal comienzan a romper la simetría. Para inclinaciones moderadas ($10^\circ - 30^\circ$), el observable A_1 adquiere valores positivos con un crecimiento de tendencia casi lineal. Sin embargo, a distancias del orden de ~ 1100 m, la densidad muónica decae drásticamente lo que se interpreta como causado por fluctuaciones de Poisson severas que parecen resolverse en el siguiente bin radial. Por su parte, en el siguiente bin angular cenital ($30^\circ - 40^\circ$), aparenta manifestarse un fenómeno de saturación o plateau: la asimetría crece rápidamente pero se estabiliza formando una meseta a partir de los 800 m.

- **Régimen Inclinado** ($40^\circ \leq \theta < 65^\circ$): Para ángulos cenitales grandes, la cantidad de atmósfera atravesada por la cascada se incrementa drásticamente siguiendo la dependencia geométrica de la secante ($X \propto 1/\cos \theta$). El gradiente longitudinal se vuelve el mecanismo dominante absoluto de la cascada. A diferencia de los regímenes anteriores, el crecimiento de la amplitud A_1 es monótono y significativamente mayor, sin presentar saturación. En estas condiciones extremas, la enorme diferencia entre la densidad de partículas entre las regiones tempranas y tardías garantiza que la coherencia de la asimetría sea tan robusta que el ajuste sobreviva con alta fidelidad incluso en la periferia más lejana del arreglo *Infill* (1350 – 1500 m).

Estos resultados demuestran que, en ausencia de incertezas geométricas instrumentales, la asimetría muónica es un observable altamente sensible a la evolución longitudinal de la cascada, estableciendo una cota teórica superior para lo que el UMD puede aspirar a medir en condiciones experimentales. Cabe destacar que el dominio radial evaluado no es uniforme, sino que ha sido adaptado a la cinemática de cada franja cenital. La extensión de las curvas fue delimitada aplicando un criterio de selección riguroso: el análisis se restringe exclusivamente a aquellas regiones donde la métrica de bondad de ajuste (χ^2/ndf) y la inspección fenomenológica visual garantizan la robustez y fidelidad estadística del observable.

Es pertinente destacar que, al replicar este mismo análisis sustituyendo la cantidad de muones inyectada (N_μ^{MC}) por la cantidad reconstruida por el algoritmo del UMD (N_μ^{REC}), pero manteniendo el núcleo y los ángulos Monte Carlo, la fenomenología global se conserva de forma idéntica. Como se ilustra en la Figura 6.2 para el rango cenital de referencia de $40^\circ \leq \theta < 50^\circ$, la principal consecuencia de introducir la respuesta de la reconstrucción de la cantidad de muones es una atenuación en la magnitud absoluta de la asimetría, sin alterar su forma fundamental ni las transiciones radiales discutidas, igual que sucedía en la sección 5.2. Se estima que la causa de esta diferencia es la misma que discutida en la sección previa y deviene del funcionamiento de los algoritmos de reconstrucción y su sesgo direccional.




Figura 6.2: Comparación de la amplitud de asimetría A_1 obtenida a partir del número de muones inyectado (N_{μ}^{MC}) frente al número de muones reconstruido (N_{μ}^{REC}) para el rango cenital de referencia de $40^{\circ} \leq \theta < 50^{\circ}$. Ambas se realizan fijando las coordenadas a nivel Monte Carlo. Se observa que la respuesta instrumental del detector introduce una atenuación sistemática en la magnitud de la asimetría, preservando la evolución radial.

6.1.1. Competencia de observables: UMD frente al SD Total

Con la fenomenología muónica del UMD caracterizada, el siguiente paso analítico consistió en contrastar este comportamiento frente a la señal total registrada por los tanques Cherenkov en superficie. Resulta importante realizar una distinción fundamental respecto a las variables físicas analizadas: mientras que el detector subterráneo proporciona un conteo directo del número de partículas muónicas incidentes reconstruidas, el SD registra la energía depositada en el volumen de agua, calibrada en unidades VEM, también a partir de la reconstrucción. Para garantizar la validez fenomenológica de este contraste, se mantuvo estrictamente la geometría Monte Carlo, asegurando que cualquier divergencia observada se deba puramente a la naturaleza de la señal detectada a nivel del suelo.

Si analizamos para el bin radial que incluye ~ 450 m se puede ver que, análogamente como sucedía para el Anillo Denso, la asimetría detectada por el SD es significativamente mayor a la del UMD. Además ambas asimetrías calculadas tienen magnitudes comparables a las encontradas en la sección del Anillo Denso. Esto permite ver que los análisis realizados en ambos marcos son comparables y consistentes.

Al extraer la amplitud de asimetría sobre la señal del SD, la curva resultante $A_1(r, \theta)$ expone un comportamiento espacial sistemáticamente distinto al del detector subterráneo. Como se evidencia en la Figura 6.3 para un rango cenital de referencia de $30^{\circ} \leq \theta < 40^{\circ}$, mientras que el

UMD exhibe un crecimiento suave hacia una asimetría positiva a grandes distancias (aun en este rango cenital donde se ve un amecetamiento), el observable del SD presenta una pronunciada inversión fenomenológica. En el régimen donde el gradiente atmosférico debería garantizar una marcada asimetría positiva, la amplitud del SD alcanza un máximo local, comienza a suprimirse y finalmente se invierte, adoptando valores de asimetría fuertemente negativos en la periferia del centro de la lluvia.




Figura 6.3: Comparación de la evolución radial de la amplitud de asimetría A_1 entre la componente muónica pura del UMD y la señal total registrada por los tanques del SD en superficie, evaluada para el rango cenital de referencia de $30^\circ \leq \theta < 40^\circ$. Ambas curvas fueron extraídas fijando la geometría real de Monte Carlo. Se evidencia el comportamiento divergente de los observables: mientras que el UMD presenta un incremento monótono condicionado por la atenuación, la señal del SD Total exhibe una severa disminución de la asimetría que culmina en una inversión (asimetría negativa) en el *far-core*.

Esta inversión geométrica no es un artefacto de reconstrucción, sino una propiedad física intrínseca de la cascada registrada a nivel del suelo, sugiriendo que el tanque Cherenkov integra poblaciones de partículas con asimetrías diametralmente opuestas.

6.1.2. Desglose de señales: La inversión de la asimetría muónica

Para entender el origen físico del comportamiento anómalo del Detector de Superficie al compararse con el Subterráneo, se aprovechó la trazabilidad de las simulaciones para desglosar la señal VEM total en sus dos componentes formativas: la componente electromagnética (electrones y fotones) y la componente muónica medida a nivel del suelo.

Cabe destacar que existe una diferencia sustancial en el tipo de señales que se están contrastando. La señal declarada como SD Total es la combinación energética de ambas componentes, pero es obtenida a través de la reconstrucción instrumental. Esta señal se calibra a partir de las trazas registradas en los fotomultiplicadores utilizando como referencia la medición del Muón Equivalente Vertical (VEM). En cambio, las componentes por separado que se analizan en esta sección representan la cantidad pura de partículas incidentes a nivel del suelo (nivel Monte Carlo).

Al evaluar la asimetría de manera independiente para cada población, se descubre una competencia radial masiva, ilustrada en la Figura 6.4. Por un lado, la componente electromagnética del SD exhibe una asimetría fuertemente positiva en todo el espectro radial. Dado que estas partículas se regeneran y absorben continuamente, su densidad está acoplada casi instantáneamente al perfil de desarrollo longitudinal de la cascada, convirtiéndolas en un trazador puro de la atenuación atmosférica. Se observa también un comportamiento singular: una estabilización (meseta) de la asimetría para todos los bins radiales por encima de los ~ 600 m. Si bien este fenómeno ocurre en diversas franjas cenitales, los estadísticos de bondad de ajuste en esta región profunda decrecen, lo que sugiere que la estabilización podría estar ligada a fluctuaciones estadísticas debido a la atenuación de la componente electromagnética a grandes distancias.

Por otro lado, la asimetría de los muones registrados por el SD exhibe un comportamiento transicional. Es aquí donde radica el mayor hallazgo analítico de esta comparación dado que el SD registra muones superficiales que, en los primeros bins radiales, se comportan de manera análoga al UMD (con una asimetría positiva creciente). Sin embargo, al acercarse a bins de mayor radio (~ 600 m), la fenomenología cambia drásticamente y la magnitud de asimetría comienza a decrecer, invirtiendo su polaridad hacia valores fuertemente negativos en el *far-core*. Este fenómeno condiciona por completo a la señal total del SD, evidenciando que, a grandes distancias del eje, la asimetría del tanque Cherenkov está dominada por la población muónica de superficie. Este fenómeno ya había sido descrito con anterioridad por la Colaboración.

Establecida la robustez empírica del fenómeno, corresponde discutir su origen físico. Conviene hacerlo de manera ordenada, porque de los mecanismos presentados en la Sección 3.2.2 sólo uno puede en principio producir un exceso tardío, y su evaluación cuantitativa no resulta favorable.

En primer lugar, ni la atenuación atmosférica ni la proyección geométrica de Bertou y Billoir pueden generar esta inversión: ambas son estrictamente positivas por construcción. En particular $\mathcal{A}_{geo} = \langle p_r / -p_z \rangle \tan \theta$ (Ec. 3.1) tiene $p_r > 0$ y $-p_z > 0$ para toda partícula descendente, de modo que *crece* —se vuelve más positiva, no negativa— cuanto mayor es la divergencia angular de la población considerada. Una población blanda y muy divergente aumenta el exceso *temprano* vía este término, no el tardío.

El único candidato con el signo correcto es la divergencia cinemática de la Ec. 3.4, cuya ganancia exponencial favorece a la región tardía. Sin embargo, como se mostró en el Capítulo 3, dicha ganancia es una función monótonamente *creciente* de la energía del muón: es despreciable para la Población B y sólo supera al término espacial $1/d^2$ por encima de una energía de cruce $E^* \simeq 2,5$ GeV para las distancias de producción típicas ($D \sim 5\text{--}10$ km). Promediando el mecanismo completo sobre el espectro muónico real —pesando cada energía por el flujo que efectivamente arriba a cada región, e incluyendo la normalización de la distribución angular— se obtiene en el punto de referencia ($r = 1200$ m, $\theta = 35^\circ$) una amplitud $A_1 \simeq +0,16$: positiva, dominada por la dilución $1/d^2$, y por lo tanto incapaz de reproducir el $A_1 \simeq -0,10$ medido para los muones del SD.

A esto se agrega una consideración instrumental que conviene explicitar. En la simulación *Offline*, $N_{\mu, \text{sup}}^{\text{MC}}$ es el conteo de partículas incidentes sobre la frontera *volumétrica* tridimensional del tanque Cherenkov, y no sobre un plano de suelo ideal. La apertura proyectada del tanque (tapa superior más pared lateral) introduce por lo tanto un sesgo geométrico propio, ausente en el UMD; evaluado con las dimensiones reales del WCD, dicho sesgo resulta pequeño y *temprano*-favorable ($A_1 \simeq +0,03$), de modo que tampoco explica la inversión sino que compite contra ella. Cabe notar además que, para una señal pesada por energía depositada (VEM), la ganancia de recorrido de las trayectorias rasantes cancela exactamente la pérdida de apertura proyectada —el recorrido total a través de un cuerpo convexo, integrado sobre un haz paralelo, es independiente del ángulo de incidencia—, por lo que el volumen del tanque no puede por sí mismo invertir el signo de la asimetría.

En síntesis: la inversión de la asimetría muónica del SD es un resultado empírico sólido, reproducido en ambas topologías (Anillo Denso e *Infill*) y con ambas geometrías (MC y REC), pero **ninguno de los mecanismos analíticos disponibles en la literatura citada la reproduce en la dirección ni en la magnitud observadas**. Su origen físico debe considerarse, en el marco de este trabajo, una cuestión abierta; en la Sección 6.1.3 se discute qué haría falta para cerrarla.




Figura 6.4: Desglose de la asimetría azimutal para las componentes inyectadas a nivel del suelo frente a la respuesta del detector subterráneo ($30^\circ \leq \theta < 40^\circ$). La asimetría electromagnética del SD (naranja) exhibe un comportamiento marcadamente positivo acoplado a la evolución longitudinal. En contraste, los muones superficiales del SD (verde) presentan una asimetría negativa a grandes distancias, fenómeno ya reportado previamente para la señal del SD [6, 3] y cuyo origen físico se discute en el texto.

La comparación con el UMD resulta particularmente instructiva, aunque no en el sentido que sugeriría una lectura ingenua del filtro cinemático. Es tentador atribuir el buen comportamiento

del detector subterráneo a que su blindaje de 2,3 m de tierra ($E_\mu \gtrsim 1 \text{ GeV}/\cos\theta$) suprime la población blanda responsable del exceso tardío, dejando pasar sólo trayectorias colimadas. Esta imagen, sin embargo, no sobrevive a una evaluación cuantitativa: dado que la ganancia cinemática *crece* con la energía, elevar el umbral de detección *enriquece* la población favorable a la región tardía en lugar de eliminarla. Evaluando el mecanismo completo a distintos umbrales en el punto de referencia se obtiene $A_1 \simeq +0,16$ para un umbral tipo SD (0,155 GeV) frente a $A_1 \simeq +0,02$ para el umbral efectivo del UMD (1,22 GeV a 35°), con cruce por cero para umbrales superiores a $\sim 2 \text{ GeV}$. Es decir, este mecanismo predice que el UMD debería mostrar una asimetría *menos* positiva que el SD, exactamente al revés de lo que se mide.

Lo que sí puede afirmarse con respaldo cuantitativo es lo siguiente. La amplitud medida en el UMD es compatible con la suma de dos contribuciones que no dependen de la incógnita anterior: la divergencia cinemática evaluada por encima de su propio umbral, y la proyección geométrica de flujo sobre un plano horizontal enterrado, que el UMD conserva íntegramente por tratarse de un detector plano de conteo puro ($\mathcal{A}_{geo} \simeq +0,11$ en el punto de referencia). Combinadas, ambas predicen $A_1 \simeq +0,13$, frente al $+0,11$ efectivamente medido. El mismo cálculo aplicado al SD —divergencia cinemática sin umbral relevante, más el sesgo de apertura del tanque— predice $A_1 \simeq +0,19$ contra el $-0,10$ observado.

Esta asimetría entre ambos detectores en la capacidad predictiva del modelo es, en sí misma, el resultado más informativo de este desglose: el marco fenomenológico disponible **reproduce satisfactoriamente al UMD y falla únicamente sobre el SD**. Ello sugiere que la física no explicada no reside en el flujo muónico como tal —que el UMD muestrea sin dificultad— sino en algo específico del detector de superficie o de la definición del observable muónico en superficie. Sin perjuicio de que el origen de la inversión permanezca abierto, la conclusión práctica del capítulo se mantiene: el UMD entrega un observable de asimetría estable, positivo y monótono, mientras que la señal del SD resulta de difícil interpretación en el *far-core*, lo que lo posiciona como el instrumento preferible para el estudio de asimetrías azimutales de la componente muónica.

6.1.3. Propuesta de Modelado del Filtro Cinemático

El análisis de las simulaciones procesadas con el *framework Offline* establece de manera contundente el hecho empírico —la degradación e inversión de la asimetría azimutal en el Detector de Superficie frente a su preservación en el Detector Subterráneo de Muones— pero, como se discutió en la sección anterior, no lo explica: los mecanismos analíticos disponibles predicen para el SD una asimetría positiva de magnitud comparable a la del UMD, y no la inversión medida. Cerrar esa brecha requiere un abordaje desde primeros principios.

La limitación intrínseca de este estudio radica en que las simulaciones utilizadas entregan la huella final de la lluvia a nivel del suelo, careciendo de la granularidad necesaria para rastrear la cinemática de producción individual (p_z , p_t y profundidad de producción X) de cada partícula antes de su propagación. Es precisamente esa información la que haría falta: los modelos analíticos empleados aquí asumen un único punto de producción efectivo y propagación balística en línea recta, y ambas simplificaciones son candidatas naturales a explicar por qué fallan. Se deja planteado, por lo tanto, como perspectiva a futuro y excediendo los alcances del presente trabajo, el desarrollo de un *Toy Model* fenomenológico (un propagador *Fast-Monte Carlo*) que permita levantarlas. Corresponde señalar que la motivación de esta línea no es ya confirmar un mecanismo ya identificado, sino identificarlo: los candidatos analíticos han sido evaluados y descartados, de modo que el modelo se propone como herramienta exploratoria y

no confirmatoria.

La hoja de ruta propuesta para implementar este modelo en futuras investigaciones, el cual acoplaría la producción hadrónica con el transporte analítico de los muones, se estructuraría en las siguientes etapas:

1. **Extracción de las distribuciones de producción:** Generar un lote de simulaciones dedicadas en CORSIKA con el único fin de extraer la función de distribución tridimensional en el punto de decaimiento del hadrón progenitor: $F(X, E_i, p_t)$. De esta forma, se obtiene el espectro de energía inicial y momento transversal real en función de la profundidad atmosférica X .
2. **Propagación analítica y supervivencia:** A partir de $F(X, E_i, p_t)$, aplicar técnicas de remuestreo (*Bootstrap* o Monte Carlo) para inyectar muones y propagarlos analíticamente hacia el suelo. Esta etapa utilizará el modelo de transporte cinemático de L. Cazón *et al.* [4], aplicando la isoterma atmosférica para calcular las pérdidas continuas de energía por ionización (dE/dX) y evaluar la probabilidad de supervivencia frente al decaimiento en vuelo.
3. **Proyección geométrica e impacto:** Intersecar las trayectorias resultantes con el plano inclinado del arreglo de superficie. Este paso introducirá de forma natural la excentricidad geométrica, permitiendo evaluar cómo la divergencia radial de cada partícula afecta su fase azimutal de impacto.
4. **El filtro instrumental:** Al obtener la energía final residual a nivel del suelo (E_f), se aplicarán funciones escalón para emular los diferentes umbrales instrumentales. Se evaluará la densidad total (emulando la respuesta muónica del SD) y se contrastará contra la distribución aplicando un umbral cinemático estricto de $E_f \gtrsim 1,0$ GeV (emulando el blindaje pasivo del UMD).

Una vez concretado en trabajos posteriores, este marco permitiría contrastar directamente, y sin recurrir a un punto de producción único, si la correlación real entre energía del muón y profundidad de producción [4] modifica de manera apreciable la competencia entre la dilución espacial y la ganancia cinemática, y si la dispersión múltiple de Coulomb acumulada en vuelo —despreciada por todos los modelos balísticos empleados aquí, pese a que la región tardía atraviesa del orden de un 25 % más de espesor atmosférico— aporta una contribución tardía no contemplada. A ello conviene sumar una verificación de naturaleza distinta, sugerida por el hecho de que el marco analítico reproduce al UMD y falla sólo sobre el SD: comprobar si el observable $N_{\mu, \text{sup}}^{\text{MC}}$, definido sobre la frontera volumétrica del tanque, incorpora alguna selección instrumental adicional que los modelos de plano ideal no representan. Una comparación entre el conteo de muones y una señal muónica pesada por energía depositada permitiría discriminar esa posibilidad, dado que ambas responden de manera distinta a la geometría del tanque.

6.2. Arreglo *Infill* usando la geometría reconstruida

Habiendo caracterizado la fenomenología pura de la cascada utilizando el escenario ideal (núcleo y ángulos Monte Carlo), el análisis se traslada en el contexto de simulaciones al entorno experimental más realista posible. En esta sección, el cálculo de las coordenadas y fases azimutales en el plano de la lluvia se realiza utilizando la posición del centro de impacto y

los ángulos de arribo reportados por el algoritmo de reconstrucción del Observatorio (geometría *REC*).

Al igual que en el estudio con geometría ideal, la transición de utilizar la cantidad de muones inyectados (N_{μ}^{MC}) a la de muones reconstruidos por la electrónica del UMD (N_{μ}^{REC}) conserva la forma de la evolución de la asimetría, solo afectando débilmente su magnitud debido a los sesgos direccionales del algoritmo. Sin embargo, al introducir la incertidumbre espacial de la **geometría reconstruida**, el panorama fenomenológico cambia drásticamente para todos los detectores: la modulación azimutal se ve severamente comprometida, perdiéndose la capacidad de detectar asimetría en diversas regiones radiales.

El análisis sistemático de los ajustes armónicos sobre los datos reconstruidos permite mapear de manera transparente los límites resolutivos y estadísticos del arreglo *Infill* al menos en el marco de simulaciones:

- **Régimen cuasi-vertical** ($0^{\circ} \leq \theta < 20^{\circ}$): La asimetría es físicamente marginal y la reconstrucción apenas logra identificar modulaciones débiles en un rango acotado ($450 \leq r \leq 1050$ m). Fuera de esta ventana, las fluctuaciones dominan sobre el gradiente direccional.
- **Régimen de transición** ($20^{\circ} \leq \theta < 40^{\circ}$): Se establece una clara ventana de máxima fidelidad fenomenológica entre los 650 m y los 1200 m. Los ajustes armónicos convergen con valores de χ^2/ndf estables y barras de error acotadas pero la magnitud de la asimetría es baja y no sigue el comportamiento esperado de aumentar a medida que el bin radial aumenta. Para distancias superiores ($r > 1200$ m), la densidad muónica decae drásticamente.
- **Régimen de alta inclinación** ($50^{\circ} \leq \theta < 65^{\circ}$): Debido a la inmensa proyección del disco muónico sobre el suelo para lluvias rasantes, la estadística de conteo se mantiene elevada a grandes distancias. Esto permite que el ajuste armónico sobreviva con notable estabilidad y magnitud desde los 600 m hasta la periferia más lejana del arreglo (1500 m), consolidando a este rango como el escenario óptimo para el estudio de asimetrías de atenuación en el *far-core*.

Este fenómeno de degradación responde a una difusión o *smearing* angular. La incertidumbre espacial intrínseca en la determinación del núcleo del arreglo *Infill* ($\sigma_{\text{core}} \approx 20 - 40$ m) propaga un error continuo en el cálculo del azimut asignado a cada estación ($\Delta\phi$). Estadísticamente, esto implica que estaciones que físicamente pertenecen a la región temprana pura ($\phi \approx 0^{\circ}$) son erróneamente catalogadas con fases laterales, y viceversa. Esta mezcla espuria de poblaciones modera los máximos y mínimos de la distribución de densidad, actuando como un filtro pasabajos espacial que "plancha" la modulación cosenoidal. El efecto es especialmente destructivo cerca del núcleo ($r \lesssim 400$ m), donde un leve corrimiento del centro de impacto invierte por completo el vector de posición, justificando la necesidad estricta del corte fiducial aplicado.

6.2.1. Resiliencia de la componente electromagnética en la reconstrucción

Al repetir el análisis de competencia entre el UMD y el SD, pero ahora sujetos a la degradación geométrica de la reconstrucción, emerge una conclusión inesperada al desglosar la señal del tanque Cherenkov.

A pesar de que el *smearing* angular destruye gran parte de la modulación en la componente muónica del UMD y del SD, el ajuste armónico sobre la componente electromagnética (SD EM)

revela que esta preserva una asimetría fuertemente positiva y altamente significativa a lo largo de todos los bins radiales evaluados. Aún bajo los efectos de la incertidumbre topográfica, la señal EM se ajusta con barras de error estadístico notablemente pequeñas.

Esta excepcional resiliencia no implica que los fotones y electrones sean inmunes al error de reconstrucción, sino que es una consecuencia directa de su abrumadora abundancia estadística. La componente electromagnética es órdenes de magnitud más numerosa que la muónica y experimenta un gradiente de atenuación longitudinal sumamente pronunciado. La asimetría física generada por este vaciamiento atmosférico es tan profunda y estadísticamente rica que logra sobreponerse a la "borrosidad" espacial introducida por el desplazamiento del núcleo.

6.2.2. La supervivencia de la asimetría geométrica muónica

Por el contrario, la inversión de la asimetría del observable total del SD hacia valores negativos en el *far-core* se sigue manifestando con total contundencia en los datos reconstruidos. Esta inversión encuentra su justificación en la naturaleza de la parte muónica del SD.

Como se discutió en la sección analítica, el origen físico de esta asimetría negativa no queda explicado por los mecanismos evaluados en este trabajo. Lo relevante en este contexto es un hecho distinto y de carácter puramente empírico: la inversión es lo suficientemente pronunciada como para sobrevivir al difuminado introducido por la reconstrucción angular. De esta forma, un frente electromagnético positivo (resistente por su altísima estadística) compite contra un fondo muónico superficial fuertemente negativo, y el resultado de esta convolución es la caída y posterior inversión del SD Total. Esto confirma que el fenómeno no es un artefacto del nivel Monte Carlo ni de la definición de la geometría verdadera, sino un obstáculo experimental que persistirá en el análisis de datos reales, con independencia de cuál resulte ser finalmente su causa.

6.3. Comparación de performance: UMD Monte Carlo vs. UMD Reconstruido

Habiendo justificado el comportamiento del SD, el foco recae finalmente sobre la performance del Detector Subterráneo de Muones frente a las incertezas de la reconstrucción. Al comparar directamente los ajustes obtenidos para el UMD utilizando la geometría Monte Carlo contra aquellos obtenidos con la geometría Reconstruida, se consolida una métrica del poder resolutivo del instrumento.

La comparativa evidencia que, si bien el UMD entrega una asimetría positiva estable y bien definida en el mundo ideal, la introducción de los errores de reconstrucción del arreglo de superficie (Core REC) impone una cota experimental a la amplitud observable. La difusión angular "achata" las curvas de A_1 , indicando que las asimetrías medidas experimentalmente representarán sistemáticamente un límite inferior (*lower bound*) de la verdadera polaridad de la cascada. Maximizar la precisión algorítmica en la ubicación del núcleo resulta, por lo tanto, tan determinante para medir la atenuación como lo es el propio blindaje del detector.

DESPUES PASAMOS A HABLAR DE LO MISMO PERO USANDO CORE Y ANGULOS REC

ACA SE PUEDE MEZCLAR UN POCO LO DE DIVIDIR EN SUBSUB CAPTIRULOS PERO, DECIR Q NUEVAMENTE LA RECONSTRUCCION DE LA CANTIDAD DE MUONES NO AFECTA LA FENOMENOLOGIA DE COMO CAMBIA LA ASIMETRIA (TAL VEZ SOLO UN POCO EN MAGINTUD IGUAL Q ANTES), PERO QUE PARA AMBOS DEJAMOS DE VER ASIMETRIA (HABLAR BIEN DE CUANDO)

DECIR QUE SE REPITE LO MISMO CUANDO SE COMAPRA UMD CON SD PERO QUE AHORA SE LLEGO A UNA CONCLUSION QUE SORPENDIO EN EL DESLGOSE DEL SD. QUE AUN EN LA RE4CONSTRUCCION SE VE SIEMPRE SUPER SIGNIFICATIVO QUE PARA EL SD EM SE VE LA ASIMETRIA RE FUERTTE Y CON MUY POCO ERROR PARA TODOS LOS BINES RADIALES

Y RECIEN DESPUES DE TODO ESTO PASARIA A HABLAR DE LA COMPARACION DE LA PREFORMANCE DEL REC VS MC EN CORE Y ANGULOS, PPALMENTE HABLANDO DEL UMD. ACA NO ME QUEDA CLARO COMO HARIA ESTA COMPARACION TODAVIA

Y HABRIA QUE VER SI SE PUEDE METER ALGO DE LA JUSTIFICAICON DE LA INVERSION DE ASIMETRIA EN EL SD CAUSADDA POR LA INVERSION DE ASIMETRIA DE LA PARTE MUONICA DEL SD QUE SE VE EN TANTO REC COMO MC. UNA EXPLCAICON, UN TOY MODEL O ALGO ASI

IDEAS:

VER SI PUEDO AGREGAR A $A_1(R, \theta)$ UNA DEPENDENCIA CON PRIMARIO Y ENERGIA. PARA ESTO TENGO QUE VER PRIMERO:

1. SI PIERDO MUCHA ESTADTSITCA HACIENDO UN BINEADO EN ENERGIA EN 5 BINES COMO EN LA SECCION DEL UMD

2. PROBAR QUE PASA SI HAGO EL MSMO ESTUDIO CON LOS DATOS DE HIERRO

TODO ESTO LO HARIA EN UNA SESCCION APARTE Y LAS SUBSECCION SERIAN VER QUE PASA CON LA PARTE USANDO COSAS MC Y CON LA REC

PODRIA VER QUE ONDA TAMBIEN LO DEL ANGULO DE INCIDENCIA O MERA-MENTE DECLARARLO, PORQUE PARA MOSTRAR UN PLOT CHATO NO VALE NADA, Y ADEMAS TENGO POCA SENSIBILIDAD ENTONCES PUEDE SER QU ED EMEDIO RARO

Referencias

- [1] H. Dembinski, T. Hebbeker y M. Leuthold. *A comparison of Monte-Carlo generated Muon Maps with near horizontal SD showers*. Internal Note GAP-2007-124. Pierre Auger Observatory, 2007.
- [2] C. Pryke. *Asymmetry of Air Showers at Ground Level*. Internal Note GAP-1998-034. Pierre Auger Observatory, 1998.
- [3] Fraser Bradfield. «Extensive air shower asymmetry and cosmic ray mass composition with the upgraded Pierre Auger Observatory». GAP-2022-023. Tesis doct. The University of Adelaide, 2022.
- [4] L. Cazón et al. «A model for the transport of muons in extensive air showers». En: *Astroparticle Physics* 36.1 (2012), págs. 211-223. doi: 10.1016/j.astropartphys.2012.05.017.
- [5] X. Bertou y P. Billoir. *On the origin of the asymmetry of ground densities in inclined showers*. Internal Note GAP-2000-017. Pierre Auger Observatory, 2000.
- [6] Quentin Luce et al. «On the need for unbiasing azimuthal asymmetry in signals measured by surface detector arrays». En: *Proceedings of the 37th International Cosmic Ray Conference (ICRC 2021)*. Vol. 395. 2021, pág. 435. URL: <https://pos.sissa.it/395/435/pdf>.
- [7] M. Scornavacche. «Current work and plans for the inclined air showers reconstruction». Presentation at the Pierre Auger Collaboration Meeting, UMD Foundations. 2026.
- [8] The Pierre Auger collaboration. «Reconstruction of inclined air showers detected with the Pierre Auger Observatory». En: *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics* 2014.08 (ago. de 2014), págs. 019-019. doi: 10.1088/1475-7516/2014/08/019.
- [9] P. Billoir y P. Da Silva. *Towards a Parametrization of the Lateral Distribution Function and its Asymmetries in the Surface Detector*. Internal Note GAP-2002-073. Pierre Auger Observatory, 2002.
- [10] Pierre Auger Collaboration. «The Pierre Auger Cosmic Ray Observatory». En: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A* 798 (2015), págs. 172-213. doi: 10.1016/j.nima.2015.06.058.
- [11] T. K. Gaisser, R. Engel y E. Resconi. *Cosmic Rays and Particle Physics*. 2nd. Cambridge University Press, 2016. doi: 10.1017/CB09781139192194.
- [12] Bradley Efron. «Bootstrap methods: another look at the jackknife». En: *The Annals of Statistics* 7.1 (1979), págs. 1-26.
- [13] James Matthews. «A Heitler model of extensive air showers». En: *Astroparticle Physics* 22.5-6 (2005), págs. 387-397.
- [14] Alexey Yushkov et al. «Mass composition of cosmic rays with energies above $10^{17.2}$ eV from the hybrid data of the Pierre Auger Observatory». En: *36th International Cosmic Ray Conference (ICRC2019)*. Vol. 358. SISSA Medialab, 2019, pág. 482. doi: 10.22323/1.358.0482.
- [15] D. J. Bird et al. «Detection of a Cosmic Ray with Measured Energy Well Beyond the Expected Spectral Cuto Due to Cosmic Microwave Radiation». En: (1994). doi: <https://doi.org/10.48550/arXiv.astro-ph/9410067>.

- [16] M. T. Dova, L. N. Epele y A. G. Mariazzi. «The effect of atmospheric attenuation on inclined cosmic ray air showers». En: *Astroparticle Physics* 18.4 (2003), págs. 351-365. DOI: 10.1016/S0927-6505(02)00150-0.
- [17] M. Ave et al. «A generalized description of the signal size in extensive air shower detectors and its applications». En: *Astroparticle Physics* 87 (2017), págs. 23-39. DOI: 10.1016/j.astropartphys.2016.11.008.