

## Capitolul 2

### Șiruri și serii de funcții

Termenii generali ai șirurilor și seriilor numerice sunt numere reale constante care, eventual, depind de anumiți parametri, dar acestor parametri li se atribuie de fiecare dată valori constante, adică termenii generali nu sunt priviți ca funcții.

Șirurile și seriile de funcții sunt generalizări naturale ale șirurilor și seriilor numerice, termenii generali depinzând de anumite variabile, deci limita unui astfel de șir de funcții, precum și suma seriei asociate vor fi considerate funcții (în caz de convergență). În această situație, ne va interesa natura funcțională a termenului general, dar și proprietățile funcționale ale funcției limită (în cazul șirurilor de funcții) sau a celei sumă (pentru seriile de funcții).

#### 2.1 Șiruri de funcții

##### 2.1.1 Breviar teoretic

Fie  $D \subset \mathbb{R}$  o mulțime nevidă. Pentru fiecare număr natural  $n \in \mathbb{N}$  considerăm o funcție  $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$ , deci pentru orice  $x \in D$ ,  $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$  este un șir de numere reale. Astfel, putem defini o funcție  $f : \mathbb{N} \times D \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(n, x) = f_n(x)$  pe care o vom nota în continuare cu  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sau  $(f_n)_{n \geq 0}$  și care se numește *șir de funcții* (pe mulțimea  $D$ ).

La fel ca în cazul șirurilor numerice, termenul general  $f_n$  al unui șir de funcții poate să fie definit doar pentru  $n \geq n_0$ , unde  $n_0$  este un număr natural fixat, caz în care șirul de funcții corespunzător se notează cu  $(f_n)_{n \geq n_0}$ . Pentru a nu complica notațiile, un șir de funcții va fi notat, în anumite situații, cu  $(f_n)$ , de exemplu, dacă  $n_0 \in \mathbb{N}$  poate fi dedus din context sau dacă alegerea sa nu are relevanță din punct de vedere teoretic.




Figura 2.1: Graficele funcțiilor  $f_1$  (verde),  $f_5$  (albastru),  $f_{10}$  (negru), respectiv  $f(x) = x^2$  (roșu) din Exemplul 2.1.1 pe intervalul  $[-10, 10]$ .

Există situații în care șirul  $(f_n(x))$  nu este convergent pentru fiecare  $x \in D$ . De exemplu, funcția

$$f_n(x) = x^n, \quad n \in \mathbb{N}^*,$$

se poate defini pentru orice  $x \in \mathbb{R}$ , dar șirul  $(f_n(x))$  este convergent doar pe intervalul  $(-1, 1]$ .

Pentru a nu complica prezentarea rezultatelor teoretice, vom presupune că șirul numeric  $(f_n(x))$  este convergent pentru fiecare  $x \in D$  (altfel, rolul mulțimii  $D$  va fi luat de orice submulțime nevidă  $D_0$  a sa cu proprietatea că șirul  $(f_n(x))$  este convergent pentru orice  $x \in D_0$ ), caz în care se poate defini o funcție

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x).$$

În această situație, spunem că șirul de funcții  $(f_n)$  *converge simplu* sau *punctual* la funcția  $f$  pe mulțimea  $D$  și notăm  $f_n \xrightarrow[s]{D} f$ .

**Exemplul 2.1.1** Fie  $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f_n(x) = \frac{nx^2}{n + x^2}$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ . Avem

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nx^2}{n + x^2} = x^2, \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

deci  $f_n \xrightarrow[\mathbb{R}]{s} f$ , unde  $f(x) = x^2$ . De aici deducem că, pentru  $n$  suficient de mare, graficul funcției  $f_n$  se apropie de graficul funcției  $f$  (vezi Fig. 2.1).

◇

Folosind definiția convergenței unui șir numeric, se obține:

$$f_n \xrightarrow[D]{s} f \iff \text{pentru orice } x \in D \text{ și pentru orice } \varepsilon > 0 \text{ există un rang } n_0 = n_0(x, \varepsilon) \in \mathbb{N} \text{ (} n_0 \text{ depinde de } x \text{ și } \varepsilon \text{) astfel încât}$$

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon, \text{ pentru orice } n \geq n_0.$$

Ne punem următoarea întrebare:

Dacă  $f_n \xrightarrow[D]{s} f$  și fiecare termen al șirului de funcții  $(f_n)$  verifică o anumită proprietate funcțională (mărginire, existența a limitei într-un punct de acumulare al lui  $D$ , continuitate, derivabilitate, primitivabilitate, integrabilitate), rezultă atunci că și funcția limită  $f$  verifică această proprietate funcțională?

De exemplu, dacă  $(f_n)$  este un șir de funcții continue pe  $D$  și  $f_n \xrightarrow[D]{s} f$ , atunci nu rezultă neapărat că și funcția  $f$  este continuă pe  $D$ , după cum rezultă din exemplul următor:

**Exemplul 2.1.2** Fie  $f_n(x) = x^n$ ,  $x \in [0, 1]$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ . Este evident că

$$f_n(x) \rightarrow f(x) = \begin{cases} 0, & \text{dacă } x \in [0, 1), \\ 1, & \text{dacă } x = 1. \end{cases}$$

Fiecare funcție  $f_n$  este continuă pe  $[0, 1]$ , dar funcția limită  $f$  nu este continuă în punctul  $x_0 = 1$ .

◇

Exemplul precedent ne arată că este nevoie de un concept de convergență mai tare decât convergența punctuală, concept care să transfere, eventual în anumite condiții, unele proprietăți funcționale ale termenilor unui șir de funcții la limita sa. Astfel, se definește conceptul de **convergență uniformă**:

**Definiția 2.1.1** Spunem că un șir de funcții  $(f_n)$  converge uniform la o funcție  $f$  pe  $D$  și notăm  $f_n \xrightarrow[D]{u} f$ , dacă pentru orice  $\varepsilon > 0$  există un rang  $n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N}$  astfel încât

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon, \text{ pentru orice } n \geq n_0 \text{ și orice } x \in D. \quad (2.1)$$




Figura 2.2: Interpretarea geometrică a convergenței uniforme.

**Interpretarea geometrică a convergenței uniforme:** pentru orice  $\varepsilon > 0$  există un rang  $n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N}$  astfel încât pentru orice  $n \geq n_0$  graficul funcției  $f_n$  este cuprins între graficele funcțiilor  $f - \varepsilon$  și  $f + \varepsilon$  (vezi Fig. 2.2).

Diferența dintre convergența simplă (punctuală) și convergența uniformă este aceea că numărul  $n_0$  dat de definiția convergenței uniforme depinde **doar** de  $\varepsilon$ , nu și de  $x$ , ceea ce este permis în cazul convergenței punctuale. Cu alte cuvinte, în cazul convergenței punctuale, viteza de convergență a șirului  $(f_n(x))$  depinde de  $x$ , iar în cazul convergenței uniforme este practic aceeași pentru orice  $x \in D$ .

**Remarca 2.1.1** Folosind notația

$$\|g\|_D = \sup_{x \in D} |g(x)|, \quad (2.2)$$

unde  $g : D \rightarrow \mathbb{R}$  este o funcție oarecare definită pe  $D$ , relația (2.1) este echivalentă cu

$$\|f_n - f\|_D = \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon, \text{ pentru orice } n \geq n_0.$$

**Remarca 2.1.2** Se observă că o funcție  $g : D \rightarrow \mathbb{R}$  este mărginită pe  $D$  dacă și numai dacă  $\|g\|_D < \infty$ . Mai mult, se poate arăta că relația (2.2) definește o normă pe spațiul vectorial  $\mathcal{M}(D)$  al funcțiilor mărginite  $g : D \rightarrow \mathbb{R}$ , numită *norma supremum* sau *norma uniformă*.

În continuare vom stabili care este legătura dintre convergența punctuală (simplă) și convergența uniformă.

**Propoziția 2.1.1** Dacă  $f_n \xrightarrow{u}_D f$ , atunci  $f_n \xrightarrow{s}_D f$ .

Rezultatul precedent ne arată, de fapt, că în practică este suficient să studiem convergența uniformă a unui șir de funcții  $(f_n)$  doar pe submulțimi nevide ale mulțimii punctelor  $x \in D$  pentru care șirul numeric  $(f_n(x))$  este convergent, pe orice altă submulțime a lui  $D$  șirul de funcții nefiind uniform convergent. Cu toate acestea, anumite criterii studiază direct convergența uniformă, fără a mai fi nevoie să determinăm, în prealabil, mulțimea punctelor de convergență punctuală.

Reciproca Propoziției 2.1.1 este, în general falsă, după cum deducem din exemplul următor:

**Exemplul 2.1.3** Fie

$$f_n(x) = \frac{nx}{1 + n^2x^2}, \quad x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}.$$

Șirul de funcții  $(f_n)$  converge simplu la funcția  $f(x) = 0$ ,  $x \in \mathbb{R}$ , adică  $f_n \xrightarrow{s}_{\mathbb{R}} 0$ , dar  $f_n \not\xrightarrow{u}_{\mathbb{R}} 0$ .

**Soluție.** Într-adevăr, dacă  $x \neq 0$ , atunci

$$|f_n(x) - 0| = \frac{n|x|}{1 + n^2x^2} \leq \frac{n|x|}{n^2x^2} = \frac{1}{n|x|} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

deci  $f_n(x) \rightarrow 0$ , pentru orice  $x \neq 0$ . Pe de altă parte,  $f_n(0) = 0$ . Rezultă astfel că  $f_n \xrightarrow{s}_{\mathbb{R}} f$ , unde  $f(x) = 0$ , pentru orice  $x \in \mathbb{R}$ .

Arătăm acum că  $f_n \not\xrightarrow{u}_{\mathbb{R}} f$ . Negând Definiția 2.1.1, trebuie să demonstrăm că există  $\varepsilon_0 > 0$  astfel încât pentru orice  $n \in \mathbb{N}$  există  $m = m(n) \geq n$  și  $x_n \in \mathbb{R}$  care verifică relația

$$|f_m(x_n) - f(x_n)| \geq \varepsilon_0.$$

Fie  $\varepsilon_0 \in (0, \frac{1}{2}]$ . Pentru  $n \in \mathbb{N}$ , considerând  $m = n + 1$  și  $x_n = \frac{1}{n+1}$ , avem

$$|f_m(x_n) - 0| = \frac{1}{2} \geq \varepsilon_0,$$

adică ceea ce trebuia să arătăm. □

Există situații când cele două concepte de convergență coincid, după cum rezultă din teorema următoare:

**Teorema 2.1.1 (Teorema lui Dini)** Fie  $D \subset \mathbb{R}$  o mulțime compactă, adică o mulțime mărginită și închisă, și  $f_n, f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .

Dacă:

- $f_n \xrightarrow[D]{s} f$ ,
- $(f_n)$  este un șir de funcții monoton, adică

$$f_n(x) \leq f_{n+1}(x), \forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in D \text{ sau } f_n(x) \geq f_{n+1}(x), \forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in D,$$

- fiecare funcție  $f_n$  este continuă pe  $D$ ,

atunci  $f_n \xrightarrow[D]{u} f$ .

În continuare prezentăm câteva criterii care se pot utiliza simplu în studiul convergenței uniforme a unui șir de funcții.

Folosind Remarca 2.1.1 și definiția limitei unui șir numeric, se obține că

$$f_n \xrightarrow[D]{u} f \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_D = 0.$$

În practică acest rezultat se folosește sub următoarea formă:

**Propoziția 2.1.2** Dacă  $f_n \xrightarrow[D]{s} f$ , atunci

$$f_n \xrightarrow[D]{u} f \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_D = 0.$$

**Exemplul 2.1.4** Fie  $f_n : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f_n(x) = \frac{nx}{nx+1}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Cum  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 1$ , pentru orice  $x > 0$ , rezultă că  $(f_n)$  este simplu convergent la funcția constantă  $f(x) = 1$  pe mulțimea  $D = (0, \infty)$  și, în particular, pe orice

submulțime nevidă a sa. Folosind propoziția de mai sus, arătăm în continuare că  $(f_n)$  este uniform convergent la  $f$  pe mulțimea  $D_1 = [1, \infty)$ , dar nu converge uniform la  $f$  pe  $D_2 = (0, 1)$ . Avem

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| \frac{nx}{nx+1} - 1 \right| = \frac{1}{nx+1},$$

deci

$$\|f_n - f\|_{D_1} = \sup_{x \geq 1} \frac{1}{nx+1} = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0 \text{ și } \|f_n - f\|_{D_2} = \sup_{x \in (0,1)} \frac{1}{nx+1} = 1 \not\rightarrow 0.$$

Din Propoziția 2.1.2 rezultă că  $f_n \xrightarrow{D_1} f$ , respectiv  $f_n \not\xrightarrow{D_2} f$ .

◇

**Propoziția 2.1.3** Dacă  $f_n \xrightarrow{D} f$ , atunci

$$f_n \xrightarrow{D} f \iff \forall (x_n) \subset D : \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x_n) - f(x_n)| = 0.$$

Din propoziția precedentă deducem un criteriu simplu care se poate utiliza pentru a arăta că un anumit șir de funcții ce converge punctual la  $f$  pe  $D$ , nu converge și uniform la  $f$  pe  $D$ :

**Propoziția 2.1.4 (Criteriul de convergență neuniformă)**

Dacă  $f_n \xrightarrow{D} f$ , atunci  $f_n \not\xrightarrow{D} f$  dacă și numai dacă există un șir  $(x_n) \subset D$  astfel încât

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x_n) - f(x_n)| \neq 0.$$

**Exemplul 2.1.5** Fie  $f_n : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f_n(x) = \frac{nx}{n+x}, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

Cum  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = x$ , pentru orice  $x \geq 0$ , rezultă că  $f_n \xrightarrow{[0, \infty)} f$ , unde  $f(x) = x$ , pentru  $x \geq 0$ . O să arătăm că  $f_n \not\xrightarrow{[0, \infty)} f$ . Calculăm

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| \frac{nx}{n+x} - x \right| = \frac{x^2}{n+x}.$$

Astfel, considerând  $x_n = n \in \mathbb{N}^* \subset [0, \infty)$ , se obține

$$|f_n(x_n) - f(x_n)| = \frac{n}{2} \rightarrow +\infty \neq 0.$$

Din criteriul de convergență neuniformă deducem că  $f_n \xrightarrow[0, \infty) \text{u}} f$ .

◇

**Propoziția 2.1.5 (Criteriul majorării)** Fie  $(f_n)$  un șir de funcții pe  $D$ . Dacă există o funcție  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  și un șir de numere reale nenegative  $(\alpha_n)_{n \geq n_0} \subset \mathbb{R}_+$  cu  $\alpha_n \rightarrow 0$  astfel încât are loc inegalitatea

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \alpha_n, \text{ pentru orice } n \geq n_0 \text{ și orice } x \in D,$$

atunci  $f_n \xrightarrow[D]{\text{u}} f$ .

**Remarca 2.1.3** Funcția  $f$ , dată de enunțul criteriului majorării este, de fapt, limita punctuală a șirului de funcții  $(f_n)$ , adică

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x), \quad x \in D.$$

**Exemplul 2.1.6** Fie  $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f_n(x) = \frac{x}{1 + n^2 x^2}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Pentru orice  $n \in \mathbb{N}^*$  are loc

$$|f_n(x) - 0| = \frac{|x|}{1 + n^2 x^2} \leq \frac{|x|}{2n|x|} = \frac{1}{2n} = \alpha_n, \quad x \in \mathbb{R}^*.$$

Pentru a obține inegalitatea de mai sus am folosit relația

$$a^2 + b^2 \geq 2|a||b|, \text{ pentru orice } a, b \in \mathbb{R}.$$

De asemenea, pentru  $x = 0$  avem  $|f_n(0) - 0| = 0 \leq \alpha_n$ . Cum  $\alpha_n \rightarrow 0$ , din criteriul majorării deducem că  $f_n \xrightarrow[\mathbb{R}]{\text{u}} 0$ .

◇



**Teorema 2.1.2 (Criteriul lui Cauchy)** Șirul de funcții  $(f_n)$  converge uniform pe  $D$ , adică există o funcție  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  astfel încât  $f_n \xrightarrow[D]{u} f$ , dacă și numai dacă pentru orice  $\varepsilon > 0$  există  $n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N}$  astfel încât

$$|f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon, \forall n \geq n_0, p \in \mathbb{N}^*, x \in D,$$

sau, echivalent, pentru orice  $\varepsilon > 0$  există  $n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N}$  astfel încât

$$\|f_{n+p} - f_n\|_D < \varepsilon, \forall n \geq n_0, p \in \mathbb{N}^*.$$

Se poate observa că pentru a studia convergența uniformă a unui șir de funcții  $(f_n)$  pe o mulțime  $D$  folosind criteriul lui Cauchy, nu este nevoie să determinăm în prealabil expresia analitică a funcției  $f$  la care  $(f_n)$  converge punctual pe  $D$ . Deci, criteriul lui Cauchy se utilizează, în general, atunci când funcția  $f$  nu poate fi determinată prin metode elementare.

### Proprietăți ale șirurilor de funcții uniform convergente

Importanța convergenței uniforme este dată, în special, de faptul că principalele proprietăți funcționale ale termenilor unui șir de funcții se transmit și funcției limită.

#### Teorema 2.1.3 (Transfer de mărginire)

Fie  $(f_n)_{n \geq n_0}$  un șir de funcții pe  $D$ . Dacă fiecare funcție  $f_n$  este mărginită pe  $D$ , adică pentru orice  $n \geq n_0$  există  $M_n > 0$  astfel încât

$$|f_n(x)| \leq M_n, \text{ pentru orice } x \in D,$$

și  $f_n \xrightarrow[D]{u} f$ , atunci funcția limită  $f$  este mărginită pe  $D$ . Mai mult, are loc inegalitatea:

$$\sup_{x \in D} |f(x)| \leq \sup_{n \geq n_0} \left( \sup_{x \in D} |f_n(x)| \right).$$

Reamintim că  $x_0 \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$  este un **punct de acumulare** al unei mulțimi  $D \subset \mathbb{R}$  dacă orice vecinătate a lui  $x_0$  conține cel puțin un element din  $D$  diferit de  $x_0$ , adică pentru orice vecinătate  $V$  a lui  $x_0$ ,  $V \cap (D \setminus \{x_0\}) \neq \emptyset$ . Mulțimea

punctelor de acumulare ale unei mulțimi  $D$  se notează cu  $D'$  și se numește *derivata* mulțimii  $D$ .

Dacă  $x_0$  este un punct de acumulare al lui  $D$ , nu rezultă neapărat că  $x_0$  aparține lui  $D$ , de exemplu, mulțimea punctelor de acumulare ale intervalului deschis  $(a, b)$  este intervalul închis  $[a, b]$ , adică  $(a, b)' = [a, b]$ .

**Teorema 2.1.4 (Transfer de trecere la limită)**

Fie  $(f_n)$  un șir de funcții pe  $D$  și  $x_0 \in D'$  un punct de acumulare al lui  $D$ . Dacă  $f_n \xrightarrow[D]{u} f$  și există  $\lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = l_n \in \mathbb{R}$ , atunci șirul  $(l_n)$  este convergent, există  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  și  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} l_n$ , adică

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left( \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) \right).$$

**Teorema 2.1.5 (Transfer de continuitate)**

Fie  $(f_n)$  un șir de funcții pe  $D$ . Dacă  $f_n \xrightarrow[D]{u} f$  și fiecare funcție  $f_n$  este continuă pe  $D$ , atunci  $f$  este o funcție continuă pe  $D$ .

**Teorema 2.1.6 (Transfer de derivabilitate)**

Fie  $I$  un interval și  $(f_n)$  un șir de funcții derivabile pe  $I$ . Dacă există două funcții  $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$  astfel încât:

- $f_n \xrightarrow[I]{u} f$ ,
- $f_n' \xrightarrow[I]{u} g$ ,

atunci  $f$  este derivabilă pe  $I$  și  $f' = g$ , adică

$$\left( \lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right)' = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n'.$$

În cazul particular în care  $I$  este un **interval mărginit**, ipoteza  $f_n \xrightarrow[I]{u} f$  din teorema precedentă poate fi înlocuită cu convergența punctuală a șirului  $(f_n)$  într-un singur punct. Se obține astfel următorul rezultat:

**Teorema 2.1.7 (Transfer de derivabilitate pe intervale mărginite)**

Fie  $I$  un interval mărginit și  $(f_n)$  un șir de funcții derivabile pe  $I$ .

Dacă:

- există  $x_0 \in I$  astfel încât șirul  $(f_n(x_0))$  este convergent,
- există  $g : I \rightarrow \mathbb{R}$  astfel încât  $f_n' \xrightarrow[I]{u} g$ ,

atunci există o funcție derivabilă  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  astfel încât  $f_n \xrightarrow[I]{u} f$  și  $f' = g$ , ceea ce este echivalent cu

$$\left( \lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right)' = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n'.$$

**Teorema 2.1.8 (Transfer de existență a primitivelor)**

Fie  $I$  un interval mărginit și  $(f_n)$  un șir de funcții primitivabile pe  $I$ . Dacă  $f_n \xrightarrow[I]{u} f$ , atunci  $f$  este o funcție primitivabilă pe  $I$ .

**Teorema 2.1.9 (Transfer de integrabilitate)**

Dacă  $(f_n)$  este un șir de funcții integrabile pe  $[a, b]$  și  $f_n \xrightarrow[a, b]{u} f$ , atunci  $f$  este o funcție integrabilă pe  $[a, b]$ . Mai mult, are loc relația:

$$\int_a^b \left( \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx.$$

În continuare vom prezenta două rezultate importante în aproximarea unor funcții continue prin intermediul unor polinoame:

**Teorema 2.1.10 (Teorema lui Bernstein)** Dacă  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  este o funcție continuă și  $(B_n)_{n \geq 1}$  este un șir de funcții polinomiale definite prin

$$B_n(x) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) C_n^k x^k (1-x)^{n-k}, \quad x \in [0, 1],$$

atunci  $(B_n)_{n \geq 1}$  converge uniform la  $f$  pe  $[0, 1]$ .

**Teorema 2.1.11 (Teorema de aproximare a lui Weierstrass)**

Pentru orice funcție continuă  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  există un șir de funcții polinomiale cu coeficienți reali care converge uniform la  $f$  pe intervalul  $[a, b]$ .

### 2.1.2 Probleme rezolvate

**Exercițiul 1** Să se studieze convergența uniformă pe mulțimea  $D$  a șirului de funcții  $(f_n)_{n \geq 0}$ , unde:

- a)  $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n^2 + 1}$ ,  $D = \mathbb{R}$ ;
- b)  $f_n(x) = \frac{nx^2}{nx + 1}$ ,  $D = [0, \infty)$ ;
- c)  $f_n(x) = \frac{n}{nx + 1}$ ,  $D = (0, 1)$ ;
- d)  $f_n(x) = (1 + x^n)^n$ ,  $D = (0, 1)$ .

**Soluție.** a) Avem  $|f_n(x) - 0| = \frac{|\sin(nx)|}{n^2 + 1} \leq \frac{1}{n^2 + 1} \rightarrow 0$ . Din criteriul majorării rezultă că  $f_n \xrightarrow[\mathbb{R}]{u} 0$ .

b) Fie  $f(x) = x$ , pentru  $x \geq 0$ . Cum

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| \frac{nx^2}{nx + 1} - x \right| = \frac{x}{nx + 1} \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0,$$

din criteriul majorării rezultă că  $f_n \xrightarrow[0, \infty]{u} f$ .

c) Se observă că  $f_n(x) \rightarrow f(x) = \frac{1}{x}$ , pentru orice  $x \in D$ , deci  $f_n \xrightarrow[D]{s} f$ . Calculăm

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| \frac{n}{nx + 1} - \frac{1}{x} \right| = \frac{1}{x(nx + 1)}.$$

Considerând  $x_n = \frac{1}{n} \in D$  pentru  $n \geq 2$ , se obține

$$|f_n(x_n) - f(x_n)| = \frac{n}{2} \rightarrow +\infty \neq 0.$$

Din criteriul de convergență neuniformă rezultă că  $f_n \not\xrightarrow[D]{u} f$ .

Convergența neuniformă a șirului de funcții  $(f_n)$  pe intervalul  $(0, 1)$  se mai poate demonstra utilizând Teorema 2.1.3. Într-adevăr, se observă că funcția  $f$  nu este mărginită pe intervalul  $(0, 1)$ , dar pentru fiecare număr natural  $n$  fixat,  $f_n$  este o funcție mărginită pe  $(0, 1)$ , căci

$$|f_n(x)| = \frac{n}{nx+1} \leq n < \infty.$$

Dacă presupunem că  $f_n \xrightarrow[(0,1)]{u} f$ , atunci rezultă că funcția  $f$  este mărginită pe intervalul  $(0, 1)$ , ceea ce este fals.

d) Pentru orice  $x \in (0, 1)$  are loc

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} (1+x^n)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ (1+x^n)^{\frac{1}{x^n}} \right]^{n x^n} = 1,$$

căci  $\lim_{n \rightarrow \infty} n x^n = 0$ , pentru  $x \in (0, 1)$ . Într-adevăr, notând  $a_n = n x^n$ , avem

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)x^{n+1}}{n x^n} = \frac{(n+1)x}{n} \rightarrow x \in (0, 1),$$

iar din criteriul raportului pentru șiruri rezultă că  $a_n \rightarrow 0$ . Din cele de mai sus se obține că  $f_n \xrightarrow[(0,1)]{s} f$ , unde  $f(x) = 1$ ,  $x \in (0, 1)$ . Folosind criteriul de convergență

neuniformă, vom arăta că  $f_n \not\xrightarrow[(0,1)]{u} f$ . Considerăm șirul

$$x_n = \frac{n}{n+1} \in (0, 1), \text{ pentru } n \in \mathbb{N}^*.$$

Cum  $(1 + \frac{1}{n})^n < e$  pentru orice  $n \in \mathbb{N}^*$ , se obține

$$|f_n(x_n) - f(x_n)| = (1+x_n^n)^n - 1 = \left[ 1 + \frac{1}{(1+\frac{1}{n})^n} \right]^n - 1 \geq \left( 1 + \frac{1}{e} \right)^n - 1 \rightarrow +\infty,$$

deci  $\lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x_n) - f(x_n)| = +\infty \neq 0$ . De aici rezultă că  $f_n \not\xrightarrow[(0,1)]{u} f$ .

□

**Exercițiul 2** Fie

$$f_n(x) = \frac{1 - x^{2n}}{1 + x^{2n}}, \quad x \in [-1, 1], \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

Să se arate că șirul de funcții  $(f_n)$  converge simplu și neuniform pe mulțimea  $D = [-1, 1]$ , respectiv converge uniform pe mulțimea  $A = [-a, a]$ ,  $\forall a \in (0, 1)$ .

**Soluție.** Dacă  $x \in (-1, 1)$ , atunci  $f_n(x) \rightarrow 1$ , iar dacă  $x = \pm 1$ , atunci  $f_n(x) = 0$ , deci  $f_n \xrightarrow[D]{s} f$ , unde

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in (-1, 1), \\ 0, & x = \pm 1. \end{cases}$$

Cum  $(f_n)$  este un șir de funcții continue pe  $D$  și  $f$  nu este continuă pe  $D$  (nu este continuă în punctele  $\pm 1$ ), din Teorema 2.1.5 rezultă că  $f_n \not\xrightarrow[D]{u} f$ .

Fie  $a \in (0, 1)$ . Pentru orice  $x \in [-a, a]$ ,  $x \neq 0$ , avem

$$|f_n(x) - 1| = \left| \frac{1 - x^{2n}}{1 + x^{2n}} - 1 \right| = \frac{2x^{2n}}{1 + x^{2n}} \leq \frac{2x^{2n}}{2|x|^n} = |x|^n \leq a^n = \alpha_n,$$

iar pentru  $x = 0$  se obține  $|f_n(0) - 1| = 0 \leq \alpha_n$ . Cum  $\alpha_n \rightarrow 0$ , din criteriul majorării rezultă că  $f_n \xrightarrow[A]{u} f$ .

□

**Exercițiul 3** Folosind criteriul lui Cauchy, să se arate că șirul de funcții  $(f_n)_{n \geq 1}$  converge uniform pe  $D = [0, \infty)$ , unde

$$f_n(x) = x \operatorname{arctg} nx.$$

**Soluție.** Fie  $n, p \in \mathbb{N}^*$  și  $x > 0$ . Avem

$$\begin{aligned} |f_{n+p}(x) - f_n(x)| &= |x \operatorname{arctg}(n+p)x - x \operatorname{arctg} nx| \\ &= x \operatorname{arctg} \frac{px}{1 + n(n+p)x^2} \leq x \operatorname{arctg} \frac{px}{n(n+p)x^2} \\ &\leq x \frac{px}{n(n+p)x^2} = \frac{p}{n(n+p)} \leq \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

Cum  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ , rezultă că pentru orice  $\varepsilon > 0$  există  $n_0 \in \mathbb{N}^*$  astfel încât

$$|f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon, \quad \forall n \geq n_0, \quad p \in \mathbb{N}^*, \quad x \geq 0.$$

Din criteriul lui Cauchy deducem că  $(f_n)$  converge uniform pe  $D$ .

□

### 2.1.3 Probleme propuse

**Exercițiul 1** Să se studieze convergența uniformă pe mulțimea  $D$  a șirurilor de funcții  $(f_n)$ , unde:

- a)  $f_n(x) = \frac{1}{n+x^2}$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $D = \mathbb{R}$ ;
- b)  $f_n(x) = \frac{1}{nx+1}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $D = (0, \infty)$ ;
- c)  $f_n(x) = \frac{x\sqrt{n}}{\sqrt{nx^2+1}}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $D = \mathbb{R}$ ;
- d)  $f_n(x) = \frac{x}{nx^2+1}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $D = \mathbb{R}$ ;
- e)  $f_n(x) = \frac{nx^2+1}{nx}$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $D = [1, 2]$ ;
- f)  $f_n(x) = \sin^n x + \cos^n x$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $D = [0, \frac{\pi}{2}]$ .

**Exercițiul 2** Să se studieze convergența uniformă pe  $\mathbb{R}$  a șirurilor de funcții  $(f_n)_{n \geq 1}$  și  $(f_n')_{n \geq 1}$ , unde

$$f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}.$$

**Exercițiul 3** Se consideră șirul de funcții  $f_n : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f_n(x) = ne^{-nx^2}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ . Să se arate că  $f_n \xrightarrow[(0, \infty)]{s} 0$ , dar  $f_n \not\xrightarrow[(0, \infty)]{u} 0$ .

**Exercițiul 4** Se consideră șirul de funcții  $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f_n(x) = x^n(1 - x^n)$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ . Să se arate că  $f_n \xrightarrow[[0, 1]]{s} 0$ , dar  $f_n \not\xrightarrow[[0, 1]]{u} 0$ .

**Exercițiul 5** Fie  $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f_n(x) = \sqrt[3]{n}xe^{-nx^2}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ . Să se arate că  $f_n \xrightarrow[\mathbb{R}]{u} 0$ .

**Exercițiul 6** Fie  $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f_n(x) = \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}}$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ . Să se arate că  $f_n \xrightarrow[\mathbb{R}]{u} f$ , unde  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = |x|$ .

## 2.2 Serii de funcții

### 2.2.1 Breviar teoretic

Fie  $(f_n)_{n \geq n_0}$  un șir de funcții pe  $D$ . Seria

$$\sum_{n \geq n_0} f_n(x), \quad x \in D, \quad (2.3)$$

se numește *serie de funcții* cu termenul general  $f_n$  și se notează  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  sau, mai simplu,  $\sum_n f_n$ .

Dacă seria numerică  $\sum_n f_n(x_0)$  este convergentă, atunci  $x_0$  se numește *punct de convergență* al seriei de funcții (2.3), iar mulțimea  $C \subset D$  a tuturor punctelor de convergență se numește *mulțimea de convergență* a acestei serii.

Dacă  $C$  este nevidă, se spune că seria de funcții  $\sum_n f_n$  *converge simplu* sau *punctul* pe  $C$  și, în particular, pe orice submulțime nevidă a sa.

Funcția  $S_n : D \rightarrow \mathbb{R}$ , definită prin

$$S_n(x) = f_{n_0}(x) + f_{n_0+1}(x) + \cdots + f_n(x), \quad n \in \mathbb{N}, \quad n \geq n_0,$$

se numește *suma parțială* (de ordin  $n$ ) asociată seriei de funcții  $\sum_{n \geq n_0} f_n$ .

Dacă presupunem că mulțimea de convergență  $C$  a seriei de funcții  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  este nevidă, are sens să definim funcția

$$S(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x), \quad x \in C,$$

care se numește *suma* acestei serii de funcții. Pentru a face diferența dintre o serie de funcții și suma sa, aceasta din urmă va fi notată  $\sum_{n=n_0}^{\infty} f_n$ .

**Definiția 2.2.1** Fie  $(f_n)_{n \geq n_0}$  un șir de funcții pe  $D$ . Spunem că seria de funcții  $\sum_n f_n$  este *uniform convergentă* pe o submulțime nevidă  $A$  a lui  $D$ , dacă șirul sumelor parțiale  $(S_n)$  este uniform convergent pe  $A$ .

Remarcăm faptul că orice serie de funcții uniform convergentă pe o mulțime  $A \subset D$  este simplu convergentă pe  $A$ , adică  $A \subset C$ , deci este suficient să studiem convergența uniformă a unei serii de funcții pe submulțimi nevide ale mulțimii



sale de convergență. În anumite situații, vom studia însă convergența uniformă a unor serii de funcții pe submulțimi nevide ale lui  $D$  fără a determina, în prealabil, mulțimea lor de convergență.

La fel ca în cazul seriilor numerice, se obține următorul criteriu necesar de convergență uniformă a unei serii de funcții:

**Propoziția 2.2.1** *Dacă seria de funcții  $\sum_n f_n$  este uniform convergentă pe  $C$ , atunci  $f_n \xrightarrow[C]{u} 0$ .*

Folosind rezultatul de mai sus și Propoziția 2.1.2, se obține următorul criteriu suficient de convergență neuniformă a unei serii de funcții:

**Propoziția 2.2.2** Dacă

$$\|f_n\|_C = \sup_{x \in C} |f_n(x)| \not\rightarrow 0,$$

atunci seria de funcții  $\sum_n f_n$  nu este uniform convergentă pe  $C$ .

**Teorema 2.2.1 (Criteriul lui Cauchy)** *Fie  $(f_n)$  un șir de funcții pe  $D$ . Seria de funcții  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  este uniform convergentă pe  $D$  dacă și numai dacă pentru orice  $\varepsilon > 0$  există un număr natural  $N = N(\varepsilon) \geq n_0$  astfel încât*

$$|f_{n+1}(x) + \cdots + f_{n+p}(x)| < \varepsilon, \text{ pentru orice } n \geq N, p \in \mathbb{N}^* \text{ și } x \in D. \quad (2.4)$$

**Remarca 2.2.1** Relația (2.4) este echivalentă cu

$$\|f_{n+1} + \cdots + f_{n+p}\|_D < \varepsilon, \text{ pentru orice } n \geq N, p \in \mathbb{N}^*.$$

**Propoziția 2.2.3** Fie  $(f_n)$  un șir de funcții pe  $D$ . Dacă există  $\varepsilon_0 > 0$  și există șirurile  $(p_n) \subset \mathbb{N}^*$ , respectiv  $(x_n) \subset D$  astfel încât

$$|f_{n+1}(x_n) + \cdots + f_{n+p_n}(x_n)| \geq \varepsilon_0,$$

atunci seria de funcții  $\sum_n f_n$  nu este uniform convergentă pe  $D$ .

Următorul rezultat ne dă un criteriu simplu, dar eficient în demonstrarea convergenței uniforme a unei serii de funcții:

**Teorema 2.2.2 (Criteriul lui Weierstrass)** Fie  $(f_n)$  un șir de funcții pe  $D$ . Dacă există un șir numeric  $(a_n)_{n \geq n_0} \subset \mathbb{R}_+$  astfel încât

$$|f_n(x)| \leq a_n, \text{ pentru orice } n \geq n_0 \text{ și } x \in D,$$

și, în plus, seria numerică  $\sum_{n \geq n_0} a_n$  este convergentă, atunci seria de funcții  $\sum_n f_n$  este uniform convergentă pe  $D$ .

La fel ca în cazul seriilor numerice au loc următoarele criterii de convergență uniformă corespunzătoare seriilor de funcții:

**Teorema 2.2.3 (Criteriul lui Dirichlet)** Dacă  $(f_n)_{n \geq n_0}, (g_n)_{n \geq n_0}$  sunt două șiruri de funcții pe  $D$  care verifică următoarele proprietăți:

- $(f_n)$  este un șir de funcții monoton descrescător, adică

$$f_{n+1}(x) \leq f_n(x), \text{ pentru orice } n \geq n_0 \text{ și } x \in D,$$

- $f_n \xrightarrow[D]{u} 0$ ,
- șirul sumelor parțiale

$$G_n(x) = \sum_{n=n_0}^n g_n(x), \quad x \in D, \quad n \geq n_0,$$

este uniform mărginit, adică există un număr real pozitiv  $M > 0$  astfel încât

$$|G_n(x)| \leq M, \text{ pentru orice } n \geq n_0 \text{ și } x \in D,$$

atunci seria de funcții  $\sum_{n \geq n_0} f_n g_n$  este uniform convergentă pe  $D$ .

**Teorema 2.2.4 (Criteriul lui Abel)** Dacă  $(f_n)_{n \geq n_0}$  și  $(g_n)_{n \geq n_0}$  sunt șiruri de funcții pe  $D$  care verifică următoarele proprietăți:

- șirul numeric  $(f_n(x))_{n \geq n_0}$  este monoton pentru orice  $x \in D$ ,
- $(f_n)_{n \geq n_0}$  este uniform mărginit,
- seria de funcții  $\sum_{n \geq n_0} g_n$  este uniform convergentă pe  $D$ ,

atunci  $\sum_{n \geq n_0} f_n g_n$  este uniform convergentă pe  $D$ .

**Teorema 2.2.5 (Criteriul lui Leibniz)** Fie  $(f_n)_{n \geq n_0}$  un șir de funcții pe  $D$ . Dacă:

- $f_{n+1}(x) \leq f_n(x)$ , pentru orice  $n \geq n_0$  și  $x \in D$ ,
- $f_n \xrightarrow{u}_D 0$ ,

atunci  $\sum_{n \geq n_0} (-1)^n f_n$  este uniform convergentă pe  $D$ .

### Proprietăți ale seriilor de funcții uniform convergente

Teoremele de transfer ale proprietăților analitice ale termenilor unei serii de funcții la suma seriei sunt consecințe imediate ale rezultatelor corespunzătoare șirurilor de funcții, acestea aplicându-se șirului sumelor parțiale asociat seriei de funcții.

#### Teorema 2.2.6 (Transfer de mărginire)

Fie  $(f_n)_{n \geq n_0}$  un șir de funcții pe  $D$ . Dacă fiecare funcție  $f_n$  este mărginită pe  $D$  și seria de funcții  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  este uniform convergentă pe  $D$  având suma  $f$ , adică

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} f_n(x) = f(x), \quad x \in D,$$

atunci  $f$  este mărginită pe  $D$ .

**Teorema 2.2.7 (Transfer de trecere la limită)**

Fie  $(f_n)_{n \geq n_0}$  un șir de funcții pe  $D$  și  $x_0 \in D'$  un punct de acumulare al lui  $D$ . Dacă există  $\lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) \in \mathbb{R}$  pentru orice  $n \geq n_0$  și seria de funcții

$\sum_{n \geq n_0} f_n$  este uniform convergentă pe  $D$  având suma  $f$ , atunci seria numerică

$\sum_{n \geq n_0} \left( \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) \right)$  este convergentă și are suma  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ , adică are loc relația

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left( \sum_{n=n_0}^{\infty} f_n(x) \right) = \sum_{n=n_0}^{\infty} \left( \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) \right).$$

**Teorema 2.2.8 (Transfer de continuitate)**

Fie  $(f_n)_{n \geq n_0}$  un șir de funcții pe  $D$ . Dacă fiecare funcție  $f_n$  este continuă pe  $D$  și seria de funcții  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  este uniform convergentă pe  $D$  având suma  $f$ , atunci  $f$  este continuă pe  $D$ .

**Teorema 2.2.9 (Transfer de derivabilitate)**

Fie  $I$  un interval și  $(f_n)_{n \geq n_0}$  un șir de funcții derivabile pe  $I$ .

Dacă:

- seria  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  este uniform convergentă pe  $I$  având suma  $f$ ,
- seria  $\sum_{n \geq n_0} f_n'$  este uniform convergentă pe  $I$  având suma  $g$ ,

atunci funcția  $f$  este derivabilă pe  $I$  și  $f' = g$ , adică are loc relația

$$\left( \sum_{n=n_0}^{\infty} f_n \right)' = \sum_{n=n_0}^{\infty} f_n'.$$

În cazul particular în care  $I$  este un interval mărginit se poate demonstra că este suficient să presupunem că seria  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  este convergentă într-un singur punct  $x_0 \in I$ , adică are loc:

**Teorema 2.2.10** Fie  $I \subset \mathbb{R}$  un interval mărginit și  $(f_n)_{n \geq n_0}$  un șir de funcții derivabile pe  $I$ . Dacă:

- există  $x_0 \in I$  astfel încât seria numerică  $\sum_{n \geq n_0} f_n(x_0)$  este convergentă,
- seria  $\sum_{n \geq n_0} f_n'$  este uniform convergentă pe  $I$  având suma  $g$ ,

atunci există o funcție  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  derivabilă astfel încât  $f' = g$ , iar seria de funcții  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  este uniform convergentă pe  $I$ , având suma  $f$ .

**Teorema 2.2.11 (Transfer de existență a primitivelor)**

Fie  $I$  un interval mărginit și  $(f_n)_{n \geq n_0}$  un șir de funcții primitivabile pe  $I$ . Dacă seria de funcții  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  este uniform convergentă pe  $I$  având suma  $f$ , atunci  $f$  este o funcție primitivabilă pe  $I$ .

**Teorema 2.2.12 (Transfer de integrabilitate)**

Fie  $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  un șir de funcții integrabile pe intervalul  $[a, b]$ . Dacă seria de funcții  $\sum_{n \geq n_0} f_n$  este uniform convergentă pe  $[a, b]$  având suma  $f$ , atunci  $f$  este o funcție integrabilă pe  $[a, b]$ . În plus, are loc relația

$$\int_a^b \left( \sum_{n=n_0}^{\infty} f_n(x) \right) dx = \sum_{n=n_0}^{\infty} \left( \int_a^b f_n(x) dx \right).$$

### 2.2.2 Probleme rezolvate

**Exercițiul 1** Să se arate că seria de funcții

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\cos(nx)}{n(n+1)}$$

este uniform convergentă pe  $\mathbb{R}$ .

**Soluție.** Considerând  $f_n(x) = \frac{\cos(nx)}{n(n+1)}$ ,  $x \in \mathbb{R}$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ , se obține

$$|f_n(x)| = \left| \frac{\cos(nx)}{n(n+1)} \right| \leq \frac{1}{n(n+1)} \leq \frac{1}{n^2} = a_n, \text{ pentru orice } n \in \mathbb{N}^*, x \in \mathbb{R}.$$

Cum seria numerică  $\sum_{n \geq 1} a_n$  este convergentă (este seria armonică generalizată cu  $p = 2 > 1$ ), din criteriul lui Weierstrass rezultă că seria de funcții  $\sum_{n \geq 1} f_n$  este uniform convergentă pe  $\mathbb{R}$ . □

**Exercițiul 2** Să se arate că seria de funcții

$$\sum_{n \geq 1} \frac{nx}{1+n^4x^2}$$

este convergentă punctual, dar nu este convergentă uniform pe  $D = (0, \infty)$ .

**Soluție.** Fie  $f_n(x) = \frac{nx}{1+n^4x^2}$ ,  $x > 0$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ . Pentru orice  $x > 0$  avem

$$\frac{f_n(x)}{\frac{1}{n^3}} = \frac{n^4x}{1+n^4x^2} \rightarrow \frac{1}{x} \in (0, \infty).$$

Cum  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^3}$  este o serie convergentă, căci este seria armonică generalizată cu  $p = 3 > 1$ , din criteriul comparației: forma la limită rezultă că seria  $\sum_{n \geq 1} f_n(x)$  este convergentă pentru orice  $x > 0$ , deci seria de funcții  $\sum_{n \geq 1} f_n$  este punctual convergentă pe  $D = (0, \infty)$ .

Folosind Propoziția 2.2.3, o să arătăm că  $\sum_{n \geq 1} f_n$  nu este uniform convergentă pe  $D$ . Într-adevăr, fie  $\varepsilon_0 = \frac{1}{17}$ ,  $p_n = n \in \mathbb{N}^*$  și  $x_n = \frac{1}{n^2} \in D$ , pentru  $n \in \mathbb{N}^*$ . Se obține

$$|f_{n+1}(x_n) + \cdots + f_{n+p_n}(x_n)| = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{\frac{k}{n^2}}{1 + \frac{k^4}{n^4}} \geq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{\frac{n}{n^2}}{1 + \frac{(2n)^4}{n^4}} = \frac{1}{17} = \varepsilon_0,$$

deci seria de funcții  $\sum_{n \geq 1} f_n$  nu este uniform convergentă pe  $D = (0, \infty)$ .

□

**Exercițiul 3** Să se studieze dacă seria de funcții  $\sum_n f_n$  este uniform convergentă pe  $D = (0, \infty)$ , unde:

$$\text{a) } f_n(x) = \frac{(-1)^n}{x^n + n + 1}, \quad n \geq 0 \quad \text{b) } f_n(x) = \frac{(-1)^n}{n^x}, \quad n \geq 2.$$

**Soluție.** a) Vom folosi criteriul lui Leibniz pentru a arăta că seria dată este uniform convergentă pe  $D = (0, \infty)$ . Pentru orice  $n \in \mathbb{N}$  considerăm

$$g_n(x) = \frac{1}{x^n + n + 1}, \quad x > 0.$$

O să arătăm că șirul de funcții  $(g_n)$  satisface condițiile din criteriul lui Leibniz pentru convergența uniformă a unei serii de funcții. Cum

$$|g_n(x) - 0| = \frac{1}{x^n + n + 1} \leq \frac{1}{n + 1} \rightarrow 0,$$

din criteriul lui Weierstrass rezultă că  $g_n \xrightarrow{u}_D 0$ . Rămâne să arătăm că

$$g_{n+1}(x) \leq g_n(x), \quad \text{pentru orice } n \in \mathbb{N} \text{ și } x > 0.$$

Dacă  $x \in (0, 1)$ , atunci

$$g_n(x) - g_{n+1}(x) = \frac{x^{n+1} + 1 - x^n}{(x^n + n + 1)(x^{n+1} + n + 2)} \geq 0, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Pe de altă parte, dacă  $x \geq 1$ , are loc

$$g_{n+1}(x) = \frac{1}{x^{n+1} + n + 2} \leq \frac{1}{x^{n+1} + n + 1} \leq \frac{1}{x^n + n + 1} = g_n(x), \quad n \in \mathbb{N}.$$

Din cele de mai sus și din criteriul lui Leibniz deducem că seria de funcții  $\sum_{n \geq 0} (-1)^n g_n$  este uniform convergentă pe  $(0, \infty)$ .

b) Pentru orice  $x > 0$  considerăm șirul  $g_n(x) = \frac{1}{n^x}$ ,  $n \geq 2$ . Cum  $g_n(x) \rightarrow 0$  și

$$g_{n+1}(x) \leq g_n(x), \quad n \geq 2,$$

pentru orice  $x > 0$ , din criteriul lui Leibniz pentru serii numerice rezultă că seria  $\sum_{n \geq 2} (-1)^n g_n(x)$  este convergentă pentru orice  $x > 0$ , deci  $\sum_{n \geq 2} f_n$  este punctual convergentă pe  $D = (0, \infty)$ . O să arătăm că această serie de funcții nu este uniform convergentă pe  $D$ . Într-adevăr, cum

$$\|f_n\|_D = \sup_{x > 0} |f_n(x)| = \sup_{x > 0} \frac{1}{n^x} = 1 \not\rightarrow 0,$$

din Propoziția 2.2.2 rezultă că  $\sum_{n \geq 2} f_n$  nu este uniform convergentă pe  $D = (0, \infty)$ . □

### 2.2.3 Probleme propuse

**Exercițiul 1** Folosind *criteriul lui Weierstrass*, să se arate că seriile de funcții

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \sum_{n \geq 0} \frac{\sin(nx)}{n^3 + 1} & \text{b)} \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^4 + x^2} \\ \text{c)} \sum_{n \geq 1} \ln \left( 1 + \frac{x^2}{n^2(x^2 + 1)} \right) & \text{d)} \sum_{n \geq 1} \operatorname{arctg} \frac{2x}{x^2 + n^4} \end{array}$$

sunt uniform convergente pe  $\mathbb{R}$ .

**Exercițiul 2** Să se arate că următoarele serii de funcții sunt uniform convergente pe  $D$ :

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n^2}, \quad D = [-1, 1] & \text{b)} \sum_{n \geq 2} \frac{1}{2^n n^x}, \quad D = (0, \infty) \\ \text{c)} \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{x^2 + n}, \quad D = \mathbb{R} & \text{d)} \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n x^n}{1 + x + \dots + x^{n-1}}, \quad D = (0, 1). \end{array}$$



**Exercițiul 3** Folosind *criteriul lui Dirichlet*, să se arate că seria de funcții

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\sin n}{\sqrt{n+x^2}}$$

este uniform convergentă pe  $\mathbb{R}$ .

**Exercițiul 4** Pentru orice parametru  $\alpha \in \mathbb{R}$  se consideră seria de funcții

$$\sum_{n \geq 1} \frac{x}{1+n^\alpha x^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

- a) Să se determine mulțimea valorilor parametrului  $\alpha$  astfel încât seria să fie convergentă punctual pe  $\mathbb{R}$ .
- b) Să se arate că această serie de funcții este uniform convergentă pe  $\mathbb{R}$  pentru orice  $\alpha > 2$ .
- c) Să se arate că pentru  $\alpha = 2$  seria de funcții este uniform convergentă pe mulțimea  $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$ , dar nu este uniform convergentă pe  $(-1, 1)$ .

**Exercițiul 5** Să se determine mulțimea de convergență a seriei de funcții

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{1+x^n}, \quad x \geq 0,$$

și apoi să se studieze convergența uniformă a acestei serii pe mulțimea sa de convergență. Să se arate că seria este uniform convergentă pe orice interval de forma  $[a, \infty)$ , unde  $a$  este un parametru real cu  $a > 1$ .

**Exercițiul 6** Să se arate că seria de funcții

$$\sum_{n \geq 0} a^n \cos(b^n \pi x), \quad \text{unde } a \in (0, 1) \text{ și } b \in \mathbb{R}^*,$$

este uniform convergentă pe  $\mathbb{R}$  având suma continuă.

**Remarca 2.2.2** Funcția

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n \pi x), \quad x \in \mathbb{R},$$

unde  $a \in (0, 1)$  și  $b$  este un număr natural impar care verifică inegalitatea

$$ab > 1 + \frac{3\pi}{2},$$

este exemplul dat de Weierstras pentru o funcție continuă care nu este derivabilă în nici un punct.