

分類一：白內障基礎知識 (Basic Knowledge)

1. 問：什麼是白內障？

答：白內障就是眼睛裡面的水晶體因為老化或其他原因變得混濁，導致視力模糊。就像照相機的鏡頭霧掉一樣，光線進不去，照片就拍不清楚了。

2. 問：白內障和近視有什麼不同？

答：近視是眼球的形狀或角膜弧度問題，讓遠的影像對不到焦；白內障是水晶體混濁，不管看遠看近都可能模糊，還會伴隨畏光、顏色變暗。

3. 問：白內障會有哪些症狀？

答：最常見的症狀是視力慢慢模糊、畏光（尤其是大太陽下）、晚上視力變差、看顏色變黃變暗、度數突然一直加深。

4. 問：我最近眼鏡度數一直換，是白內障嗎？

答：有可能。白內障早期會讓水晶體的折射改變，造成近視度數突然加深。建議您到眼科做散瞳檢查，由醫師幫您確認。

5. 問：白內障為什麼會讓人怕光？

答：因為混濁的水晶體會讓光線散射，尤其在強光下更明顯，就會產生刺眼、眩光的感覺，這就是畏光的原因。

6. 問：白內障會造成完全失明嗎？

答：如果不治療，嚴重的白內障可能引發青光眼或發炎，最終影響視力。但只要及時手術，絕大多數都能恢復良好，不會走到失明。

7. 問：白內障是兩眼都會發生嗎？

答：通常是雙眼都會有，但兩眼的嚴重程度和進展速度可能不一樣。醫師會根據每隻眼睛的狀況分別評估手術時機。

8. 問：白內障是不是只有老年人才會得？

答：老化是最常見的原因，所以中老年人最普遍。但年輕人如果有高度近視、糖尿病、外傷或長期使用類固醇，也可能得到白內障。

9. 問：幾度以上的近視比較容易得白內障？

答：一般來說，600度以上的高度近視就是白內障的危險因子，度數越高，水晶體提早老化的風險就越大。

10. 問：糖尿病跟白內障有關係嗎？

答：有。長期血糖控制不好，會加速水晶體蛋白質變性，讓白內障提早發生、進展更快，平均比一般人早10年左右。

11. 問：長期點類固醇眼藥水會造成白內障嗎？

答：會的。長期使用類固醇眼藥水或口服、注射類固醇，會增加「後囊下白內障」的風險，需要定期追蹤。

12. 問：曬太陽會造成白內障嗎？

答：長期曝曬在紫外線下確實會增加白內障的風險。建議戶外活動時佩戴能過濾紫外線 (UV400) 的太陽眼鏡。

13. 問：眼睛受過傷會比較容易得白內障嗎？

答：會的。撞擊、穿刺等外傷可能直接損傷水晶體，造成「外傷性白內障」，有時候年輕就會發生，手術難度也較高。

14. 問：白內障可以預防嗎？

答：老化引起的無法完全預防，但可以降低風險：戒菸、控制血糖、戶外戴抗UV眼鏡、避免長期不必要的類固醇、均衡飲食。

15. 問：白內障和青光眼一樣嗎？

答：不一樣。白內障是水晶體混濁，可以手術治療；青光眼是視神經損傷，一旦受損就不可逆。兩者可能同時存在。

16. 問：白內障和黃斑部病變有什麼差別？

答：白內障是眼睛前段水晶體的問題；黃斑部病變是後段視網膜中央的問題。兩者都會影響視力，但成因和治療完全不同。

17. 問：我看東西有重影，是白內障造成的嗎？

答：有可能。白內障會造成單眼重影或影像不清晰。但也可能來自角膜問題或斜視，需要讓醫師檢查確認。

18.問：白內障初期還不嚴重，需要馬上治療嗎？

答：輕微的白內障可以先觀察追蹤。但如果已經影響到日常生活、工作或開車安全，就可以評估手術，不用等到「很嚴重」。

19.問：白內障一定要開刀嗎？有沒有其他方法？

答：目前醫學上唯一能真正治療白內障的方法就是手術。眼藥水或藥物只能稍微延緩進展，無法讓混濁的水晶體變透明。

20.問：聽說白內障要等「熟透」才能開刀，是這樣嗎？

答：這是舊觀念。現在技術進步，只要影響生活就可以開刀。過熟的白內障反而手術難度更高、風險更大。

21.問：點眼藥水可以治好白內障嗎？

答：目前沒有任何眼藥水被證實可以治好白內障。手術才是唯一有效的方法，不要因為點藥水而錯過最佳時機。

22.問：我看東西顏色變黃了，是白內障嗎？

答：是的。白內障會讓水晶體呈現黃褐色，看東西的色調會偏黃偏暖，尤其是藍色和紫色會變得難以分辨。

23.問：白內障手術後會復發嗎？

答：真正的白內障不會復發。但少數人術後幾個月到幾年可能出現「後發性白內障」，那是後囊袋混濁，可以用雷射處理。

24.問：白內障嚴重程度怎麼分？

答：大致分為輕度（輕微影響）、中度（明顯畏光眩光）、成熟（視力明顯下降）、過熟（水晶體液化，手術難度高）。

25.問：白內障會痛嗎？

答：白內障本身通常不會痛。如果您感覺眼睛疼痛，可能是其他問題（如急性青光眼），要趕快就醫。

26.問：白內障進展速度很快嗎？

答：因人而異。老化型通常進展慢，可能好幾年；糖尿病、外傷或類固醇引起的可能進展較快。

27.問：白內障可以只靠換眼鏡解決嗎？

答：早期或許可以暫時改善，但隨著白內障加重，光線散射的問題無法靠眼鏡矯正，最終還是需要手術。

28.問：家人開刀後視力很好，我也能一樣嗎？

答：大多數人術後視力都有顯著改善。但如果合併青光眼、黃斑部病變等其他問題，效果可能有限，醫師術前會評估。

29.問：白內障手術後，近視度數還會增加嗎？

答：人工水晶體的度數是固定的，不會再因白內障而改變。但如果您年紀較輕，眼軸長可能還在變化，度數仍可能小幅變動。

30.問：白內障是水晶體「溶掉」嗎？

答：不是。白內障是水晶體蛋白質變性、混濁。過熟的白內障可能液化，但一般手術是用超音波震碎吸出。

31.問：白內障會遺傳嗎？

答：老化型白內障沒有強烈的遺傳性。但先天性白內障（嬰兒出生就有）部分與遺傳有關。

32.問：白內障手術後，老花眼會一起好嗎？

答：不一定。單焦水晶體不能解決老花，看近仍需老花眼鏡。要選擇多焦點或延焦型水晶體才能同時改善老花。

33.問：50歲做白內障手術會不會太年輕？

答：年齡不是決定因素，視力影響程度才是。若已明顯影響生活，不論幾歲都可以考慮手術。

34.問：白內障可以從外觀看出來嗎？

答：輕度看不出來。嚴重時可能在瞳孔區域看到白色或灰色混濁，讓瞳孔看起來發白。

35.問：白內障和老花眼是同一件事嗎？

答：不一樣。老花是水晶體彈性喪失，只影響近距離；白內障是水晶體混濁，影響所有距離，並有畏光、色彩改變。

36.問：先天性白內障是什麼？

答：嬰兒出生時或幼童時期就有的白內障，可能與遺傳、感染或代謝疾病有關，需要及早治療，以免造成弱視。

37.問：白內障讓我覺得燈光特別刺眼，正常嗎？

答：正常。這是典型的畏光和眩光症狀，因為混濁的水晶體會讓光線散射。手術後通常會明顯改善。

38.問：抽菸會影響白內障嗎？

答：會的。吸菸會加速水晶體氧化和蛋白質變性，讓白內障更早發生、進展更快。戒菸對眼睛健康很有幫助。

39.問：白內障嚴不嚴重，看「視力0.X」就能判斷嗎？

答：不一定。有些人視力數字不差，但眩光、夜間視力差已明顯影響生活。醫師會綜合多項因素評估手術時機。

40.問：白內障有沒有辦法靠飲食改善？

答：沒有食物能治療已形成的白內障。但葉黃素、維生素C、E等抗氧化營養素有助於延緩老化，無法取代手術。

41.問：白內障手術後，飛蚊症變明顯了，為什麼？

答：因為原本混濁的水晶體被換成透明的人工水晶體，光線進入眼睛的量增加，原本就存在的飛蚊就變得明顯了。

42.問：白內障可以兩眼同時手術嗎？

答：台灣多數醫院會建議兩眼分開手術，間隔1-2週，主要是為了安全，避免兩眼同時感染或發生併發症。

43.問：白內障手術前需要空腹嗎？

答：因為是局部麻醉，一般不需要空腹。但請依照您的手術通知單指示，有特殊狀況請提前詢問醫師。

44.問：白內障手術的成功率高嗎？

答：白內障手術是全球施行最多、技術最成熟的外科手術之一，整體成功率超過95%，大多數患者術後視力明顯改善。

45.問：白內障手術後多久可以看清楚？

答：通常術後幾天內視力就會開始改善，多數人1-2週內明顯進步，完全穩定約需1-3個月。

46.問：白內障手術後，可以坐飛機嗎？

答：一般建議術後2週，傷口基本穩定後再搭飛機比較安全。飛行中機艙乾燥可能加重乾眼，記得多補充人工淚液。

47.問：白內障會不會引起頭痛？

答：白內障本身不會直接引起頭痛。但如果白內障過熟引發青光眼，就可能伴隨頭痛、噁心、嘔吐，這時要緊急就醫。

48.問：為什麼白內障手術前要做那麼多檢查？

答：術前檢查可以評估您的眼睛整體狀況，包括計算人工水晶體度數、檢查角膜、視網膜、眼壓等，確保手術安全和效果。

49.問：白內障手術後，眼睛會不會看起來不一樣？

答：外觀上看不出差異。人工水晶體放在眼睛裡面，從外面看不到。只有嚴重的白內障術前瞳孔發白，術後反而會恢復正常的黑色。

50.問：白內障可以透過雷射治療嗎？不用開刀？

答：不行。雷射（如飛秒雷射）是輔助手術的工具，不是單獨的治療方式。真正要移除混濁水晶體，還是需要手術。

51.問：我已經80歲了，還適合做白內障手術嗎？

答：年齡不是問題，身體狀況才是關鍵。只要沒有嚴重的全身性疾病無法耐受手術，許多80-90歲的長輩手術後視力改善得很好。

52.問：白內障手術會影響原本的散光嗎？

答：會。一般手術不會矯正散光，術後散光依然存在。若想同時矯正散光，可以選擇「散光矯正型人工水晶體」。

53.問：白內障會不會突然變嚴重？

答：通常不會突然變嚴重，而是慢慢惡化。但外傷或某些藥物可能讓白內障快速惡化，若視力短期內明顯下降，應儘快就醫。

54.問：白內障手術後，還需要點散瞳劑嗎？

答：術後不需要常規點散瞳劑。只有在術後檢查或特定情況下，醫師才會請您點散瞳劑以便檢查眼底。

55.問：白內障手術後，可以捐贈眼角膜嗎？

答：可以。白內障手術不影響角膜捐贈，因為人工水晶體在眼內，角膜組織仍然是完好的。

56.問：白內障會不會自己好？

答：不會。白內障一旦形成，無法自行恢復透明，只會隨著時間越來越嚴重。手術是唯一有效的治療方式。

57.問：我有高血壓，可以開白內障嗎？

答：可以。只要血壓控制在穩定範圍，白內障手術是安全的。術前請按時服藥，手術當天也可以照常吃血壓藥。

58.問：白內障手術後，可以哭嗎？

答：可以。流淚不會傷害眼睛。但術後初期盡量不要用力揉眼睛，如果流淚很多，用乾淨面紙輕輕按壓眼角就好。

59.問：白內障手術後，眼睛會不會變得很敏感？

答：術後初期可能會有畏光、異物感等敏感反應，這是正常的。隨著傷口癒合和眼睛適應，敏感度會逐漸恢復正常。

60.問：白內障手術後，可以染頭髮嗎？

答：建議術後至少2-4週再染髮。染髮劑的化學物質可能刺激眼睛，且染髮時水或藥劑可能流入眼睛，增加感染風險。

61.問：白內障手術後，可以泡溫泉嗎？

答：不建議。溫泉水含有較多細菌，且高溫可能影響傷口癒合。建議術後至少1-2個月，醫師確認傷口完全癒合後再考慮。

62.問：白內障手術後，可以養寵物嗎？

答：可以，但術後初期要注意寵物的毛髮、灰塵不要進入眼睛，避免感染。接觸寵物後要確實洗手，再點藥或碰觸眼睛。

63.問：白內障手術後，可以種睫毛嗎？

答：建議至少等1個月以上，讓傷口完全癒合、眼睛穩定後再考慮。種睫毛的膠水和工具可能刺激眼睛，務必選擇衛生良好的店家。

64.問：白內障手術後，可以戴隱形眼鏡嗎？

答：一般不需要，因為人工水晶體已經取代了水晶體的功能。若因特殊需求（如矯正殘餘度數），需經醫師評估後才可配戴。

65.問：白內障手術後，可以打高爾夫球嗎？

答：可以，但要等傷口穩定後。建議術後至少1個月，經醫師確認後再逐步恢復。初期避免過度用力揮桿，以免眼壓升高。

66.問：白內障手術後，可以做家事嗎？

答：輕度家事（如摺衣服、洗碗）術後幾天就可以。但要避免彎腰低頭、提重物、拖地等會增加眼壓的活動，至少2-4週。

67.問：白內障手術後，可以抱孫子嗎？

答：可以，但要小心不要被孫子的手或頭撞到眼睛。術後初期避免提重物（包括抱較重的幼兒），建議術後2-4週再抱。

68.問：白內障手術後，可以唱歌嗎？

答：可以。唱歌不會影響眼睛。但如果唱歌時會用力憋氣或用力過猛，術後初期還是稍微注意一下，避免眼壓突然升高。

69.問：白內障手術後，可以吃海鮮嗎？

答：可以。除非您本身對海鮮過敏，否則沒有禁忌。海鮮富含蛋白質，反而有助於傷口癒合。

70.問：白內障手術後，可以喝咖啡或茶嗎？

答：可以適量飲用。咖啡因不會直接影響傷口，但若喝太多導致失眠或心悸，間接影響休息就不太好。適量即可。

71.問：白內障手術後，可以吃中藥進補嗎？

答：建議先諮詢醫師。某些活血化瘀的中藥（如當歸、人參、銀杏）可能增加出血風險，術後初期應避免。

72.問：白內障手術後，可以吃薑母鴨或麻辣鍋嗎？

答：建議術後1-2週內避免過度辛辣刺激的食物，以免引起身體發炎反應或腸胃不適。溫和飲食對恢復較好。

73.問：白內障手術後，可以吃冰或喝冷飲嗎？

答：可以。沒有證據顯示冰冷飲食會影響眼睛恢復。只要您腸胃可以接受，適量飲用沒問題。

74.問：白內障手術後，可以抽菸嗎？

答：強烈建議不要。抽菸會延緩傷口癒合、增加感染風險，對眼睛和全身健康都有害。這是戒菸的好時機。

75.問：白內障手術後，可以喝酒嗎？

答：術後至少2週內避免喝酒，酒精可能影響藥物效果，並增加出血風險。之後少量飲酒通常無大礙，但建議先問醫師。

76.問：白內障手術後，可以行房嗎？

答：可以，但要避免過於激烈的動作和憋氣用力，以免眼壓升高。術後1-2週內建議溫和進行。

77.問：白內障手術後，可以按摩眼睛周圍嗎？

答：不可以。術後至少1-2個月內不要按壓或按摩眼睛周圍，以免影響傷口或造成人工水晶體移位。

78.問：白內障手術後，可以用洗臉機或導入儀嗎？

答：不建議。術後初期應避免任何震動或按壓眼周的儀器，至少等1-2個月，經醫師確認後再使用。

79.問：白內障手術後，可以敷眼膜或眼霜嗎？

答：建議等傷口完全癒合（約1個月）後再使用。敷眼膜時要避開眼球本身，且產品不要流入眼睛。

80.問：白內障手術後，可以化妝嗎？

答：臉部其他部位（底妝）可以，但要避開眼周。眼妝（眼影、睫毛膏、眼線）建議至少等4週，經醫師同意後再開始。



分類二：手術方式全解析 (Surgical Methods)

81.問：白內障手術是怎麼做的？

答：目前主流是「超音波乳化術」。先在眼睛滴麻藥，做一個2-3毫米的小切口，用超音波把混濁的水晶體震碎吸出，再植入人工水晶體。傷口很小，通常不用縫。

82.問：白內障手術需要全身麻醉嗎？

答：不需要。通常只要局部麻醉，滴麻醉眼藥水就可以了。整個過程您是清醒的，但不會痛，手術約15-30分鐘。

83.問：手術時我的眼睛會動來動去，醫師怎麼辦？

答：醫師會用眼瞼撐開器固定您的眼皮。眼球輕微移動是正常的，請您放輕鬆，不要緊張，手術會更順利。

84.問：手術過程中我會看到什麼？會很恐怖嗎？

答：您可能會看到手術燈的強光和一些模糊的色彩，但不會看到手術器械的清楚影像。大多數人覺得還好，不會恐怖。

85.問：手術需要多久時間？

答：單純手術約15-30分鐘。加上術前準備和術後觀察，整個流程大約2-3小時。

86.問：傷口很小不縫針，不會裂開嗎？

答：不會。現代手術的切口是「自密式」設計，會自動密合。只要不揉眼睛、不碰水，傷口癒合得很好。

87.問：什麼是飛秒雷射輔助白內障手術？

答：這是在傳統超音波手術前，先用電腦斷層定位，再用飛秒雷射精準製作切口、撕開囊袋、劈碎水晶體。是一種自費的進階選項。

88.問：飛秒雷射白內障手術比傳統手術好在哪裡？

答：三大優勢：減少超音波能量，保護角膜內皮細胞；囊袋撕開更圓正，高階水晶體置中更精準；對困難白內障能降低風險。

89.問：飛秒雷射手術費用大概多少？健保有給付嗎？

答：飛秒雷射是自費項目，健保不給付。費用各院所不同，一眼約數萬元，請向醫院諮詢詳細價格。

90.問：哪些人適合做飛秒雷射白內障手術？

答：過熟或過硬白內障、角膜內皮細胞偏少、有散光需要精細矯正、選擇高階多焦點水晶體的人，都可以考慮。

91.問：健保有給付白內障手術嗎？

答：有的。常規超音波乳化手術和基本款健保水晶體都在健保範圍內。只有升級水晶體或飛秒雷射需要自費。

92.問：手術是住院還是門診？

答：大多數可以在門診手術室完成，不需要住院。術後觀察1-2小時就可以回家。

93.問：兩眼白內障可以同時手術嗎？

答：台灣多數醫院建議分開手術，間隔1-2週。主要是為了安全，避免兩眼同時感染。

94.問：手術前需要做哪些檢查？

答：包括視力、眼壓、角膜地形圖、角膜內皮細胞計數、眼軸長測量、散瞳眼底檢查等。確保手術安全。

95.問：白內障手術的成功率高嗎？

答：非常高，超過95%。這是全球施行最多的手術之一，技術非常成熟。

96.問：白內障手術後多久可以看清楚？

答：通常數天內開始改善，1-2週內明顯進步，完全穩定約需1-3個月。

97.問：白內障手術做一眼要多少錢？

答：若選健保標準手術加健保水晶體，自負額極少。若選自費水晶體，一眼可能數萬元不等。請向醫院諮詢。

98.問：手術後當天可以自己回家嗎？

答：不可以。手術後視力暫時模糊，加上散瞳效果，一定要有家屬陪同接送，不要自己開車或騎車。

99. 問：白內障手術是用超音波「震爆」水晶體，不會傷到眼睛嗎？

答：超音波能量是精確控制的，只針對水晶體。現代手術系統設計精良，安全性很高。

100. 問：手術前需要空腹嗎？

答：因為是局部麻醉，一般不需要空腹。請依照手術通知單指示，有疑問提前詢問醫師。

101. 問：飛秒雷射和傳統手術，哪個比較好？

答：兩種都安全，各有適用情境。傳統手術適合大多數人；飛秒雷射適合有特殊需求或困難白內障的患者。

102. 問：手術中途可以要求停下來嗎？

答：不建議。手術一旦開始，中途停下可能造成更多問題。術前充分溝通、放鬆心情很重要。

103. 問：手術中如果我不小心眨眼或移動了，怎麼辦？

答：醫師會用撐開器固定眼瞼。請您放輕鬆、保持平靜呼吸，不要突然大幅度移動頭部。

104. 問：兩眼手術間隔要多久？

答：通常建議1-2週，讓第一眼初步恢復後再進行第二眼。

105. 問：醫師說我白內障開刀有難度，我需要擔心嗎？

答：醫師告知您是為了讓您做好心理準備，不代表一定有問題。困難白內障仍可順利完成，請信任醫療團隊。

106. 問：白內障手術需要住院嗎？需要幾天？

答：多數為門診日間手術，不需住院。複雜狀況可能安排住院1天觀察。

107. 問：白內障手術是眼科門診常見的手術嗎？

答：是的，這是全球施行量最大的外科手術之一，也是台灣眼科最常見的手術。

108. 問：飛秒雷射手術和傳統手術，恢復時間一樣嗎？

答：兩者恢復時間相近。飛秒雷射因減少超音波能量，部分患者術後初期視力恢復可能稍快一些。

109. 問：白內障手術需要剃眉毛或剃頭嗎？

答：不需要。手術只在眼部局部進行，不需要剃除眉毛或頭髮。

110. 問：白內障手術是在全黑暗的環境中做嗎？

答：不是。手術在手術顯微鏡下進行，有強光照明，讓醫師看得清楚。

111. 問：白內障手術會痛嗎？

答：不會。局部麻醉後，您不會感到疼痛。可能會有輕微的壓迫感，但不會痛。

112. 問：手術後眼睛會包起來嗎？

答：手術後通常會用紗布或眼罩蓋住眼睛，保護傷口，隔天回診時就會拿掉。

113. 問：白內障手術後，可以馬上睜開眼睛嗎？

答：可以。手術結束後就可以睜開眼睛，只是初期可能有點畏光或模糊。

114. 問：白內障手術後，多久可以不用戴眼罩？

答：睡覺時的眼罩建議戴1週。白天清醒時，如果能注意不揉眼，可以不戴。

115. 問：白內障手術後，眼睛裡會留下東西嗎？

答：會留下人工水晶體，那是永久放在眼睛裡面的，不會造成異物感或不適。

116. 問：白內障手術後，人工水晶體會不會掉出來？

答：不會。人工水晶體固定在囊袋內，非常穩定，不會掉出來。

117. 問：白內障手術後，可以洗臉嗎？

答：術後初期用毛巾擦拭臉部，避開眼睛周圍。等醫師確認傷口癒合後才能正常洗臉。

118. 問：白內障手術後，可以洗頭嗎？

答：建議仰躺（如洗頭台）或去髮廊給人洗，避免水流入眼睛。約2週後醫師確認沒問題就可以正常洗。

119. 問：白內障手術後，可以看電視嗎？

答：可以，但不要看太久，適時休息。初期視力可能還不穩定，不要勉強。

120. 問：白內障手術後，可以滑手機嗎？

答：可以，但要適度休息。如果眼睛乾澀，要點人工淚液。

分類三：術後視覺期待與度數規劃 (Refractive Targets)

121. 問：白內障手術後，我還需要戴眼鏡嗎？

答：取決於您選擇的人工水晶體。單焦點通常需要戴眼鏡（看遠或看近）；多焦點有機會大幅降低眼鏡依賴。

122. 問：手術後可以讓我完全不用戴眼鏡嗎？

答：多焦點或三焦點水晶體有機會，但無法保證百分之百。某些精細視力工作（如看藥單小字）可能仍需輔助眼鏡。

123. 問：術後想要看遠清楚，還是看近清楚，怎麼選？

答：常開車、戶外活動→選看遠清楚；常看書、做手工→保留輕度近視；兩者都想兼顧→考慮多焦點水晶體。

124. 問：什麼是老花眼？白內障手術可以同時治療老花眼嗎？

答：老花眼是水晶體失去彈性，導致看近不清楚。選擇多焦點或延焦型水晶體，可以同時解決白內障和老花眼。

125. 問：什麼是微單眼視力設計？

答：主力眼看遠，非主力眼保留輕度近視看近，大腦會自動整合。這是不想裝多焦點水晶體又想減少眼鏡依賴的折衷方案。

126. 問：微單眼視力設計，我的大腦真的能適應嗎？

答：大多數人可以，需要數週到數月的適應期。醫師可能讓您先戴試驗隱形眼鏡模擬，評估是否適合。

127. 問：只有一眼需要手術，度數怎麼規劃？

答：要考慮兩眼視差，一般建議不超過200度，以免頭暈。醫師會根據未開刀眼的度數來規劃。

128. 問：術後度數可以百分之百準確嗎？

答：通常很準確，但可能有小幅偏差（ $\pm 0.5D$ 以內）。若有殘餘度數，可以配眼鏡矯正，或考慮雷射微調。

129. 問：我有散光，白內障手術後散光還會在嗎？

答：如果沒有選散光矯正型水晶體，術後散光仍然存在，需要配散光眼鏡。選Toric水晶體可以同時矯正散光。

130. 問：我很常用電腦，術後視力怎麼規劃比較好？

答：可以考慮延焦型（EDOF）水晶體，它擅長遠至中距離（電腦距離）。或用單焦點保留輕度近視，看電腦更舒適。

131. 問：術後視力能恢復到幾度？

答：若只有白內障問題，許多人可達0.8-1.0甚至更好。若有黃斑部病變等，恢復可能有限，醫師術前會說明。

132. 問：術後需要多久才能配眼鏡？

答：建議等度數穩定後，通常是術後1-3個月。太早配鏡度數還在變化，很快就不準。

133. 問：白內障手術後我的高度近視可以治好嗎？

答：可以大幅降低近視度數，甚至接近零度。但高度近視的眼底問題不會因手術而改變。

134. 問：術後看燈光有光暈或光芒是正常的嗎？

答：術後初期很常見，多數在幾週到幾個月內逐漸改善。多焦點水晶體患者可能較明顯。

135. 問：白內障術後開車安全嗎？

答：建議等1-2週，視力穩定後再評估。夜間開車初期可能因光暈不適，建議完全適應後再進行。

136. 問：術後我的視力可以到1.0嗎？

答：若眼睛沒有其他問題，有機會。但每個人條件不同，手術目的是達到您的最佳可能視力。

137. 問：術後看字還是覺得有點不清楚，是度數不準嗎？

答：術後初期模糊是正常的。若1個月後仍不清楚，可能有殘餘度數或其他問題，請回診檢查。

138. 問：術後可以打電動或長時間看電腦螢幕嗎？

答：可以，但要適時休息。建議每20分鐘看遠方20秒，並補充人工淚液。

139. 問：術後第一天視力只有0.3，正常嗎？

答：正常。術後第一天角膜可能還有水腫、散瞳效果未退，視力不穩定是正常的，會逐漸改善。

140. 問：術後多焦點水晶體的適應期大概要多久？

答：通常需要4-8週，部分人可能需要3-6個月。大腦會逐漸學會解讀多個焦點。

141. 問：什麼是延焦型水晶體？中距離是多遠？

答：延焦型 (EDOF) 清晰範圍從遠距延伸至中距離，約50-100公分，也就是電腦、儀表板、廚房備料的距離。

142. 問：術後看東西覺得歪歪的，是正常的嗎？

答：不正常。若感覺影像扭曲、變形，可能是黃斑部問題，請儘快回診檢查。

143. 問：術後覺得眼睛很乾，會影響視力嗎？

答：會。乾眼症會讓視力波動、模糊。請按時點人工淚液，通常會逐漸改善。

144. 問：術後可以戴老花眼鏡嗎？

答：可以。若您選擇單焦點水晶體且設定看遠，看近時就需要戴老花眼鏡。

145. 問：術後可以戴太陽眼鏡嗎？

答：可以。術後初期畏光，戴太陽眼鏡會更舒適，還能保護眼睛免受紫外線傷害。

146. 問：術後夜間視力比白天差，是正常的嗎？

答：部分正常，尤其多焦點水晶體使用者。但若夜間視力明顯比白天差很多，請回診檢查。

147. 問：術後可以戴變色鏡片嗎？

答：可以。變色鏡片在戶外會自動變深，對畏光有幫助。沒有特別禁忌。

148. 問：術後度數還會變化嗎？

答：術後1-3個月內可能有些微變化，之後就會穩定。長期來說非常穩定。

149. 問：術後可以開車上高速公路嗎？

答：建議等視力完全穩定、夜間光量可接受後再上高速公路。安全第一，不要勉強。

150. 問：術後可以考駕照或換駕照嗎？

答：可以。只要您的視力達到監理站規定的標準（通常矯正後視力0.6以上），就可以考照或換照。

分類四：人工水晶體選項總覽 (IOL Library)

151. 問：人工水晶體是什麼材質做的？

答：目前多為軟性可折疊的丙烯酸酯或矽膠。丙烯酸酯最普遍，生物相容性好、穩定耐用。

152. 問：人工水晶體放進去後會移位嗎？

答：正常情況下非常穩定，不易移位。極少數情況（如囊袋鬆弛或外傷）可能發生，發生率很低。

153. 問：人工水晶體需要換嗎？能用多久？

答：設計上是永久性的，通常終身使用，不需要更換。

154. 問：健保給付的水晶體和自費的有什麼差別？

答：健保是基本款球面單焦點，只能看單一距離。自費水晶體功能更進階：非球面（畫質更佳）、散光矯正、多焦點等。

155. 問：非球面水晶體好在哪裡？

答：修正了球面水晶體邊緣的變形，提供更清晰銳利的影像，尤其夜間對比度更好，就像高畫質電視。

156. 問：我有散光，選哪種水晶體比較好？

答：若散光超過100度，建議選「散光矯正型 (Toric) 」，可同時矯正散光。散光較少則一般非球面即可。

157. 問：散光矯正水晶體放進去後，散光方向不對怎麼辦？

答：手術時醫師會精確對準軸向。若術後稍有旋轉，早期有時可微調。這也是選擇有經驗醫師的原因。

158. 問：延焦型水晶體是什麼？

答：延焦型 (EDOF) 讓清晰範圍延伸拉長，能清楚看到遠距和中距 (如電腦、儀表板) 。極近距離仍需老花眼鏡。

159. 問：多焦點水晶體和延焦水晶體，哪個比較好？

答：延焦夜間光暈較少，適合開車族；多焦點遠中近都清楚，脫鏡率更高，但夜間光暈較明顯。依生活習慣選擇。

160. 問：多焦點水晶體是怎麼讓遠近都清楚的？

答：鏡片設計了多個焦距的光學區域，光線同時在遠近形成焦點，大腦會自動選擇當前需要的焦點。

161. 問：多焦點水晶體的光暈嚴重嗎？會影響開車嗎？

答：多數人適應後影響不大。對視覺品質要求極高的駕駛可能感覺干擾，術前請與醫師討論。

162. 問：什麼樣的人適合選多焦點水晶體？

答：沒有黃斑部病變、青光眼、嚴重糖尿病視網膜病變；瞳孔大小適中；非常希望脫離眼鏡依賴、能接受適應期的人。

163. 問：什麼人不建議選多焦點水晶體？

答：有黃斑部病變、嚴重青光眼、糖尿病視網膜病變、嚴重角膜疾病的人，多焦點無法發揮效果，反而可能更差。

164. 問：什麼是抗藍光水晶體？

答：鏡片加入黃色過濾色素，過濾部分有害藍光，理論上對黃斑部有保護作用。視覺色調較柔和偏暖。

165. 問：抗藍光水晶體會讓我看到的顏色變黃嗎？

答：剛手術後可能感覺稍偏暖，但大腦很快會適應，日常色彩辨識影響很小。

166. 問：我需要不需要選抗藍光水晶體？

答：有黃斑部病變家族史、長期用3C者可考慮。目前科學證據尚有不同意見，非強制選擇。

167. 問：人工水晶體有品牌之分嗎？哪個牌子比較好？

答：有Alcon、Johnson & Johnson、Zeiss等知名品牌，各有優劣。醫師會根據您的條件推薦，不是單純看品牌。

168. 問：自費水晶體值得花嗎？

答：取決於您的需求和預算。若非常在意脫鏡率、夜間視覺品質、或有散光問題，自費升級能顯著提升生活品質。

169. 問：選了多焦點水晶體後還是覺得不適應，可以換掉嗎？

答：可以評估「置換」，但這是較複雜的二次手術，有一定風險。術前充分評估非常重要。

170. 問：水晶體選好後，還可以在手術前更換嗎？

答：可以，只要在手術前充分溝通即可。一旦植入就很難更換，所以術前一定要做好決定。

171. 問：三焦點水晶體和多焦點水晶體有什麼不同？

答：傳統多焦點通常只有遠和近；三焦點增加了中距焦點（60-80公分），對常用電腦的人更全方位。

172. 問：我的眼底有黃斑部病變，還能選多焦點水晶體嗎？

答：不建議。多焦點對視網膜品質要求較高，黃斑部有問題反而可能讓視覺更差，建議選單焦點。

173. 問：人工水晶體放進去後可以感覺到嗎？

答：完全不會感覺到它的存在，就像戴了很久的隱形眼鏡一樣，沒有異物感。

174. 問：為什麼有些水晶體要好幾萬，有些比較便宜？

答：價格差異來自光學設計複雜度、材質、研發成本。功能越進階，製造成本越高。

175. 問：醫師推薦多焦點水晶體，但我有點猶豫，應該怎麼決定？

答：問清楚：您的眼睛條件適合嗎？您對光量的敏感度如何？您對戴眼鏡的接受度？可以尋求第二意見。

176. 問：健保水晶體的視覺品質真的比較差嗎？

答：能有效恢復視力，對多數日常活動足夠。差異在夜間對比敏感度稍差，以及只能看單一距離。

177. 問：散光矯正水晶體多少散光以上才需要？

答：一般建議散光超過100度（1.0D）時考慮，因為這個程度不矯正會明顯影響視力清晰度。

178. 問：我很怕夜間開車的光量，應該選哪種水晶體？

答：建議選非球面單焦點（無光暈問題）或延焦型（光量少很多）。多焦點可能不適合您。

179. 問：同一品牌的Toric水晶體和一般散光矯正有什麼不同？

答：Toric就是散光矯正型，兩者指同一類產品。在單焦點基礎上加入散光矯正設計。

180. 問：延焦型水晶體看中距離清楚，中距離是多遠？

答：約50-100公分，也就是電腦螢幕距離、儀表板距離、廚房備料距離。

181. 問：多焦點水晶體術後需要適應多久？

答：通常4-8週，部分人3-6個月。適應期內可能感覺看近清晰度時好時壞、夜間光暈明顯。

182. 問：多焦點水晶體會影響對比敏感度嗎？

答：會稍微降低。在光線不足時（如黃昏、昏暗餐廳）可能感覺視覺品質下降，需要加強照明。

183. 問：多焦點水晶體適合夜間開車嗎？

答：多數人可以適應。但若您對光量非常敏感，或需要長時間夜間開車，建議與醫師詳細討論。

184. 問：人工水晶體有分左右眼嗎？

答：沒有。同一型號的水晶體可以放左眼也可以放右眼，沒有區分。

185. 問：人工水晶體可以同時矯正近視和散光嗎？

答：可以。選擇「散光矯正型多焦點」或「散光矯正型延焦」水晶體，可以同時矯正近視、散光、老花。

186. 問：人工水晶體的度數是怎麼計算的？

答：術前會測量您的眼軸長度、角膜弧度等，用公式計算出最適合的人工水晶體度數。

187. 問：如果術後度數不理想，可以事後更換嗎？

答：可以，但屬於較複雜的二次手術。輕微偏差通常用眼鏡矯正即可，嚴重偏差才考慮更換。

188. 問：人工水晶體會過期嗎？

答：不會。人工水晶體沒有保存期限，植入後可永久使用。

189. 問：人工水晶體會引起過敏嗎？

答：極少見。現代人工水晶體生物相容性很好，過敏反應發生率非常低。

190. 問：人工水晶體會阻擋紫外線嗎？

答：大多數人工水晶體都有抗紫外線功能，可以保護視網膜免受紫外線傷害。

191. 問：我選了多焦點水晶體，但術後覺得看近還是不夠清楚，怎麼辦？

答：可能需要適應期，或殘餘度數需配鏡。請回診讓醫師檢查，有時可微調或配輔助眼鏡。

192. 問：我選了延焦型水晶體，但看藥單的字不清楚，正常嗎？

答：正常。延焦型對極近距離（小於30公分）的清晰度較差，看藥單等小字可能需要戴老花眼鏡。

193. 問：人工水晶體可以事後調整度數嗎？

答：目前市面上有少數「可調節式」人工水晶體，術後可用特定光線調整度數，但尚未普及。

194. 問：人工水晶體手術後，可以再做近視雷射嗎？

答：可以。若術後有殘餘度數，且角膜條件允許，可以考慮做近視雷射微調。

195. 問：人工水晶體會因為碰撞而移位嗎？

答：一般日常活動不會。但強烈撞擊（如車禍、被打到）可能導致移位，需要手術復位。

196. 問：人工水晶體可以拿出來清洗嗎？

答：不需要。人工水晶體不會積累蛋白質沉澱，不需要清洗。

197. 問：人工水晶體會發霉嗎？

答：不會。人工水晶體是惰性材質，不會發霉或變質。

198. 問：人工水晶體會影響我做核磁共振（MRI）嗎？

答：不會。大多數人工水晶體是非金屬材質，做MRI是安全的。若有疑問可詢問醫師。

199. 問：人工水晶體可以選擇顏色嗎？

答：一般只有透明和淡黃色（抗藍光）兩種選擇，沒有其他顏色。

200. 問：人工水晶體可以訂做嗎？

答：大部分是標準規格，但特殊情況（如極高度數）有特殊訂製的水晶體，需較長時間等待。

分類五：特殊眼部條件與專屬風險 (High-Risk & Exclusions)

201. 問：我有青光眼，還可以做白內障手術嗎？

答：可以。有時白內障手術還能降低部分患者的眼壓。但多焦點水晶體一般不建議，避免影響視覺品質。

202. 問：我有糖尿病視網膜病變，白內障手術安全嗎？

答：可以，但術前需評估視網膜病變程度。術後需密切追蹤視網膜狀況，繼續眼底治療。

203. 問：我的眼睛以前做過玻璃體切除術，白內障手術有什麼特別？

答：這屬於困難白內障，後囊破裂風險較高，度數預測難度也增加。醫師會特別準備和計畫。

204. 問：我的眼睛曾經受過傷，手術有沒有風險？

答：有。外傷可能造成懸韌帶鬆弛，手術時水晶體不穩定。醫師可能需要使用囊袋張力環輔助。

205. 問：什麼是囊袋張力環？

答：一個彈性小環，當懸韌帶鬆弛時植入囊袋內提供支撐，讓人工水晶體能正常固定。

206. 問：醫師說我的瞳孔很小，手術有影響嗎？

答：小瞳孔會增加手術難度，醫師可能需要使用擴張器。手術時間較長，術後眼壓升高風險稍高。

207. 問：我的白內障很嚴重（過熟白內障），手術風險高嗎？

答：過熟白內障需要更多超音波能量，術後角膜水腫機率較高。飛秒雷射輔助在這種情況特別有優勢。

208. 問：前房淺的眼睛，手術難度高嗎？

答：前房淺操作空間受限，角膜內皮細胞損傷風險較高。醫師會採取特別保護措施。

209. 問：我的角膜內皮細胞很少，還能開刀嗎？

答：醫師會評估細胞數量。若太少可能建議特別保護措施（如飛秒雷射），或告知風險後再決定。

210. 問：高度近視的人做白內障手術，有什麼要注意？

答：度數計算誤差可能較大，術後需密切追蹤視網膜狀況，注意視網膜剝離的跡象。

211. 問：我之前做過近視雷射，白內障手術度數計算準確嗎？

答：角膜形狀已被改變，度數計算可能有較大誤差。現在有專門公式，但仍可能比一般眼睛偏差大。

212. 問：我有黃斑部病變，做白內障手術對黃斑部有沒有影響？

答：手術本身影響很小。術後光線進入增加，理論上對已受損的黃斑部有些刺激，需繼續追蹤治療。

213. 問：我有乾眼症，白內障手術安全嗎？

答：可以，但術前需評估乾眼嚴重度並積極治療。嚴重乾眼會影響度數測量準確性和術後恢復。

214. 問：我的眼睛只有一隻有功能，開刀風險更高嗎？

答：決策需要更謹慎。醫師會仔細評估必要性、時機和風險，在適當條件下仍可安全手術。

215. 問：我有視網膜色素病變，可以做白內障手術嗎？

答：可以，但術後視力改善程度取決於視網膜受損程度。多焦點水晶體通常不建議。

216. 問：我做過角膜移植，白內障手術有什麼特別？

答：手術難度較高，需特別保護角膜移植片。度數計算也可能較不準確，醫師會特別規劃。

217. 問：我有虹彩炎或葡萄膜炎，白內障手術風險高嗎？

答：術前需控制發炎穩定。這類患者術後發炎反應可能較嚴重，需加強抗發炎用藥。

218. 問：我有白內障合併黃斑部水腫，可以先開刀嗎？

答：通常建議先治療黃斑部水腫，穩定後再評估白內障手術，以免術後水腫加重。

219. 問：我有角膜失養症，可以開白內障嗎？

答：需評估角膜失養症的嚴重程度。某些類型術後角膜水腫風險高，醫師會特別保護。

220. 問：我有假性剝離症候群，白內障手術有什麼風險？

答：懸韌帶較脆弱，手術中水晶體不穩定性高，後囊破裂風險增加。醫師會特別小心。

221. 問：我有高眼壓但沒有青光眼，可以開白內障嗎？

答：可以。白內障手術有時能降低眼壓。術後需追蹤眼壓變化。

222. 問：我有圓錐角膜，可以開白內障嗎？

答：可以。但度數計算較困難，且需評估角膜穩定性。多焦點水晶體通常不建議。

223. 問：我有視網膜裂孔但已雷射處理，可以開白內障嗎？

答：可以。只要裂孔已穩定處理，白內障手術是安全的。術後仍需追蹤視網膜狀況。

224. 問：我有中央靜脈阻塞，可以開白內障嗎？

答：可以。但需評估黃斑部水腫狀況。若水腫嚴重，建議先治療再評估手術。

225. 問：我有眼瞼內翻或外翻，會影響白內障手術嗎？

答：可能影響。嚴重眼瞼問題建議先矯正，以免影響手術視野或術後恢復。

226. 問：我有嚴重的乾燥症（修格蘭氏症候群），可以開刀嗎？

答：可以，但乾眼症狀會影響度數測量和術後舒適度。術前需積極控制乾眼。

227. 問：我有風濕免疫疾病，正在吃免疫抑制劑，可以開刀嗎？

答：可以，但需與風濕科醫師討論。部分免疫抑制劑術前可能需要調整。

228. 問：我有帕金森氏症，手術中頭會抖怎麼辦？

答：醫師會協助固定頭部。請在手術前告知醫師，他們會做好相應準備。

229. 問：我有失智症，可以開白內障嗎？

答：可以，但術中配合度可能較差。醫師會評估是否適合局部麻醉，必要時可考慮全身麻醉。

230. 問：我有嚴重的駝背，無法平躺，可以開刀嗎？

答：可以調整手術姿勢。請術前告知醫師，他們會安排合適的擺位。

231. 問：我對某些藥物過敏，需要告訴醫師嗎？

答：非常重要！請在手術前詳細告知所有已知過敏藥物，尤其是麻醉藥、抗生素、碘製劑。

232. 問：我曾經有過心肌梗塞，可以開白內障嗎？

答：可以，但要等心臟狀況穩定後（通常至少6個月）。術前需心臟科評估。

233. 問：我有中風病史，可以開白內障嗎？

答：可以，但要等神經狀況穩定後。術前需相關科別評估。

234. 問：我有洗腎（透析），可以開白內障嗎？

答：可以。洗腎患者白內障發生率較高，手術安全。術前需控制好水分和電解質。

235. 問：我有B型或C型肝炎，可以開白內障嗎？

答：可以。白內障手術不會影響肝病，也沒有特別禁忌。

236. 問：我有愛滋病，可以開白內障嗎？

答：可以。白內障手術與一般人相同，醫療團隊會做好標準防護。

237. 問：我有凝血功能異常（血友病），可以開白內障嗎？

答：可以，但需血液科醫師評估，術前可能需要補充凝血因子。手術仍可安全進行。

238. 問：我懷孕了，可以開白內障嗎？

答：懷孕期間一般不建議非緊急手術。若白內障影響生活，建議產後再評估。

239. 問：我正在哺乳，可以開白內障嗎？

答：可以。局部麻醉藥和術後眼藥水進入乳汁的量極少，對嬰兒影響很小。可與醫師討論。

240. 問：我有嚴重的睡眠呼吸中止症，麻醉有風險嗎？

答：白內障手術是局部麻醉，風險很低。但若需鎮靜，需麻醉科醫師評估。

241. 問：我有癲癇，可以開白內障嗎？

答：可以。術前告知醫師，確保藥物控制良好。手術中應避免強光刺激誘發。

242. 問：我有嚴重的焦慮症，手術中會緊張怎麼辦？

答：請事先告知醫師，他們可以給予適當的鎮靜藥物，幫助您放鬆。

243. 問：我裝有心律調節器，可以開白內障嗎？

答：可以。白內障手術使用的儀器通常不影響心律調節器。術前請告知醫師。

244. 問：我裝有人工關節，可以開白內障嗎？

答：可以。人工關節不會影響白內障手術。

245. 問：我有嚴重的骨質疏鬆，需要停藥嗎？

答：某些骨鬆藥物（如雙磷酸鹽類）長期使用可能與罕見的眼部發炎有關。請告知醫師用藥情況。

分類六：常規手術風險與併發症 (Surgical Risks)

246. 問：白內障手術有什麼風險？

答：常見且暫時的：異物感、乾眼、短暫角膜水腫。少見但嚴重的：眼內感染、後囊破裂、視網膜剝離、眼壓升高。

247. 問：術後眼睛有異物感，是正常的嗎？

答：是的，術後初期幾天到一兩週感覺沙粒感是正常的，是傷口癒合過程的反應。

248. 問：術後眼睛很乾，需要擔心嗎？

答：術後乾眼加重很常見，通常數週至數月內恢復。可使用人工淚液，嚴重時請醫師評估。

249. 問：術後飛蚊症變明顯了，為什麼？

答：因為混濁水晶體換成透明的人工水晶體，光線進入增加，原本就存在的飛蚊變得明顯。這不代表有新問題。

250. 問：術後視力忽然模糊了，怎麼辦？

答：術後短暫模糊可能是正常角膜水腫。但若原本改善後又忽然變差，或伴隨紅、痛，必須立即回診。

251. 問：什麼是眼內炎？有多嚴重？

答：眼球內部的細菌感染，是白內障手術最嚴重的併發症之一。發生率很低（萬分之一至千分之一），但一旦發生可能嚴重影響視力。

252. 問：眼內感染有哪些症狀？

答：眼睛疼痛（術後數天突然加劇）、眼睛發紅、視力忽然明顯下降、畏光。通常在術後1-7天出現，需立即回診。

253. 問：什麼是後囊破裂？

答：手術中水晶體後面的薄膜發生破裂。發生率約1-2%。可能導致玻璃體溢出、人工水晶體固定困難。

254. 問：手術後會不會造成視網膜剝離？

答：風險略高於未手術的眼睛，高度近視者風險更高。若出現閃光感、飛蚊急劇增加、黑影，需立即就醫。

255. 問：術後眼壓會升高嗎？

答：術後短暫眼壓升高可能發生，多數能自行恢復或藥物控制。有青光眼病史者需密切監控。

256. 問：什麼是續發性白內障？和原本的白內障一樣嗎？

答：不一樣。是術後後囊袋慢慢混濁，稱為「後發性白內障」，不是原本的白內障復發，可用雷射治療。

257. 問：後發性白內障要怎麼治療？

答：在門診用YAG雷射，幾分鐘就完成，不需要進開刀房。治療後視力即刻改善，一次治療通常永久有效。

258. 問：術後角膜水腫會自己好嗎？

答：大部分輕微的術後角膜水腫是暫時的，數天到數週內自行恢復。嚴重水腫恢復期較長。

259. 問：術後眼睛出血了怎麼辦？

答：少量結膜下出血（白眼球表面紅色血塊）常見且無害，2-3週自行吸收。內部出血需回診。

260. 問：手術中會有什麼我需要知道的風險？

答：潛在風險包括後囊破裂、玻璃體溢出、角膜內皮細胞損傷等。發生率很低，醫師都有對應處置能力。

261. 問：術後眼睛一直流淚，是問題嗎？

答：術後初期流淚是常見反應，數天至1-2週內減少。若大量流淚伴隨疼痛或分泌物增多，需回診。

262. 問：術後分泌物很多，是感染嗎？

答：少量分泌物正常。若黃色膿性、量多、伴隨疼痛發紅，需立即回診。

263. 問：白內障手術後眼壓升高，需要治療嗎？

答：術後短暫眼壓升高多數藥物控制有效。若持續偏高需額外治療。

264. 問：如果白內障手術後視力不進反退，有什麼可能的原因？

答：可能原因：後發性白內障、角膜水腫、眼壓升高、黃斑部水腫、感染，或原有視網膜問題加重。請回診檢查。

265. 問：後發性白內障用YAG雷射治療，會痛嗎？安全嗎？

答：非常安全快速，只需幾分鐘，不會疼痛。治療後可能暫時眼壓升高，會給降壓藥。

266. 問：白內障手術後，會影響原本的眼壓控制嗎？

答：有些患者術後眼壓會下降，有些會上升。有青光眼病史者需密切追蹤。

267. 問：白內障手術後，黃斑部水腫是什麼？

答：術後炎症反應可能引起黃斑部水腫，發生率約1-2%。多數用藥可控制，少數需進一步治療。

268. 問：白內障手術後，會產生散光嗎？

答：手術切口可能引起輕微散光，通常會隨時間改善。若散光明顯，可用眼鏡矯正。

269. 問：白內障手術後，眼睛會畏光多久？

答：通常數天到數週。多焦點水晶體使用者可能較久。外出可戴太陽眼鏡。

270. 問：白內障手術後，會有複視（雙影）嗎？

答：少見。可能是術後暫時性斜視或角膜水腫引起，多數會自行恢復。持續不消退需檢查。

271. 問：白內障手術後，會產生眼瞼下垂嗎？

答：少見。可能是撐開器使用後暫時性影響，多數會恢復。持續下垂可評估手術矯正。

272. 問：白內障手術後，瞳孔會變形嗎？

答：極少見。可能是手術中虹膜損傷或後粘黏所致。一般不影響視力。

273. 問：白內障手術後，會產生眼球疼痛嗎？

答：輕微不適正常。若劇烈疼痛，可能是眼壓升高、感染或角膜問題，需立即回診。

274. 問：白內障手術後，會產生頭暈嗎？

答：若兩眼視差過大可能頭暈。醫師術前會規劃度數避免。術後頭暈也可能是血壓問題。

275. 問：白內障手術後，會產生噁心想吐嗎？

答：少見。可能是術後眼壓升高或對藥物反應。若出現需回診檢查。

276. 問：白內障手術後，會產生光幻視嗎？

答：有些人術後閉眼時會看到閃光或幾何圖案，這是正常的，會自行消失。

277. 問：白內障手術後，會產生角膜失代償嗎？

答：非常罕見。發生於角膜內皮細胞嚴重不足的患者，術後角膜持續水腫變白，可能需要角膜移植。

278. 問：白內障手術後，會產生人工水晶體脫位嗎？

答：極少見。發生於懸韌帶嚴重鬆弛的患者。可能需要二次手術復位或更換。

279. 問：白內障手術後，會產生葡萄膜炎嗎？

答：術後輕微發炎正常。嚴重葡萄膜炎需加強抗發炎治療。

280. 問：白內障手術後，會產生視神經損傷嗎？

答：極罕見。可能與術後眼壓急劇升高有關。有青光眼病史者風險較高。

281. 問：白內障手術後，會產生交感性眼炎嗎？

答：極罕見（約百萬分之一）。一隻眼睛手術後，另一隻眼睛也發生發炎。需全身性類固醇治療。

282. 問：白內障手術後，會產生囊袋收縮症候群嗎？

答：少見。囊袋過度收縮擠壓人工水晶體，可能影響視力。可用雷射或手術處理。

283. 問：白內障手術後，會產生光學像差嗎？

答：多焦點水晶體使用者較常見（光暈、眩光）。多數會適應，少數無法適應可考慮更換水晶體。

284. 問：白內障手術後，會產生視野缺損嗎？

答：不應發生。若出現，可能是原有青光眼或視網膜問題，需進一步檢查。

285. 問：白內障手術後，會產生眼球萎縮嗎？

答：極罕見。發生於嚴重眼內感染或外傷後。現代手術安全性極高，幾乎不會發生。

分類七：術前準備與用藥安全 (Pre-op Prep & Medication

Safety)

286. 問：手術前需要做什麼準備？

答：完成所有術前檢查、按指示點術前眼藥、手術當天洗淨頭臉、不化妝、穿前釦式寬鬆衣物、安排家屬陪同。

287. 問：術前要點什麼眼藥？什麼時候開始點？

答：通常點散瞳劑（放大瞳孔）和抗生素（預防感染）。請依照術前用藥指示確實執行。

288. 問：我有在吃血壓藥，手術當天要停藥嗎？

答：不需要。血壓藥可在手術當天早上如常服用（少量水）。停藥反而可能血壓不穩。

289. 問：我有在吃阿斯匹靈或抗凝血藥，手術前要停藥嗎？

答：需由醫師評估。請不要自行停藥或繼續服藥，務必告知眼科醫師，他們會指示您如何處理。

290. 問：我有在吃攝護腺藥（如Flomax），需要告訴醫師嗎？非常重要嗎？

答：非常重要！這類藥物會引起「術中虹膜鬆弛症候群」，大幅增加手術難度。就算現在停藥了也要告知。

291. 問：什麼是術中虹膜鬆弛症候群？

答：手術中虹膜變得軟弛飄動、瞳孔縮小，可能從切口脫出。醫師知道後可使用特殊技術和擴張器預防。

292. 問：我有糖尿病，術前血糖要控制到多少？

答：建議空腹血糖200 mg/dL以下，糖化血色素越接近正常越好。血糖過高增加感染風險。

293. 問：手術當天要化妝或戴隱形眼鏡嗎？

答：不可以。化妝品可能污染手術環境。隱形眼鏡需提前停戴（軟式停1週，硬式停1個月）。

294. 問：手術當天要穿什麼衣服？

答：前開扣式衣物，方便更換手術衣。寬鬆舒適，避免穿戴太多首飾。

295. 問：我家人能陪我進手術室嗎？

答：不可以。手術室只允許醫護人員進入。但家屬一定要陪同到院和術後接送。

296. 問：術前有哪些藥要告訴醫師？

答：所有藥物，特別是：抗凝血藥、攝護腺藥、免疫抑制劑、類固醇、中草藥、保健食品。

297. 問：我有高血壓，手術前需要特別注意什麼？

答：按時服藥、避免緊張。手術當天血壓仍高，醫師可能會調整計畫。

298. 問：手術前那幾天，眼睛可以繼續戴眼鏡嗎？

答：可以。隱形眼鏡需停戴，但一般眼鏡不需要停。

299. 問：手術前需要簽什麼文件？

答：手術同意書、麻醉同意書、自費特材同意書（若有）。請仔細閱讀，有疑問提出。

300. 問：術前散瞳劑點了後，眼睛會不舒服嗎？

答：會畏光、看近模糊，這是正常的。效果4-8小時消退。散瞳期間請勿駕車。

301. 問：我有青光眼，散瞳劑安全嗎？

答：閉角型青光眼風險較高。請務必告知醫師，他們會評估是否可以使用。

302. 問：我服用的中藥或保健食品，手術前需要停嗎？

答：魚油、銀杏、大蒜精、維生素E等有抗凝血作用，建議術前1-2週停用。

303. 問：手術前可以吃東西嗎？

答：可以。局部麻醉不需空腹。但若有安排鎮靜或全身麻醉，需依醫囑空腹。

304. 問：手術前可以喝飲料嗎？

答：可以喝開水或無糖飲料。避免含咖啡因飲料，以免心跳加速。

305. 問：手術前可以抽菸嗎？

答：建議術前至少24小時不要抽菸，以免影響麻醉和傷口癒合。

306. 問：手術前可以喝酒嗎？

答：術前24小時內避免喝酒，酒精可能影響麻醉效果和凝血功能。

307. 問：手術前需要停止服用葉黃素嗎？

答：不需要。葉黃素是營養補充品，不會影響手術。

308. 問：手術前可以染頭髮嗎？

答：建議術前至少1週不要染髮，染髮劑化學物質可能刺激眼睛。

309. 問：手術前可以剪頭髮嗎？

答：可以。沒有影響。

310. 問：手術前可以運動嗎？

答：可以，但術前1-2天避免劇烈運動，以免疲勞或受傷。

311. 問：手術前需要先洗澡嗎？

答：建議手術當天早上洗澡，保持清潔。但不要使用過多沐浴乳或香精。

312. 問：手術前需要去除假睫毛嗎？

答：需要。假睫毛可能影響手術無菌，請在手術前卸除。

313. 問：手術前可以塗指甲油嗎？

答：建議不要。手術中需監測血氧，指甲油會影響感應器準確度。

314. 問：手術前需要禁慾嗎？

答：不需要。沒有影響。

315. 問：手術前需要停用安眠藥嗎？

答：不需要。但請告知醫師您有服用安眠藥。

316. 問：手術前需要停用抗憂鬱藥嗎？

答：不需要。但請告知醫師，某些藥物可能與麻醉藥有交互作用。

317. 問：手術前需要停用荷爾蒙藥物嗎？

答：一般不需要。請告知醫師您正在使用荷爾蒙藥物。

318. 問：手術前可以喝咖啡嗎？

答：建議避免。咖啡因可能讓您緊張、心跳加速。

319. 問：手術前可以吃感冒藥嗎？

答：如果感冒症狀明顯，建議先告知醫師，評估是否適合手術。

320. 問：手術前有發燒，可以開刀嗎？

答：不建議。發燒可能是感染徵兆，建議延期手術。

321. 問：手術前月經來了，可以開刀嗎？

答：可以。月經不影響白內障手術。

322. 問：手術前可以戴助聽器嗎？

答：可以。進入手術室前可配戴，手術中可能需要取下。

323. 問：手術前可以戴活動假牙嗎？

答：可以。不需要特別取下。

324. 問：手術前需要去除身體穿環嗎？

答：建議取下。金屬穿環可能影響手術無菌或電燒設備。

325. 問：手術前需要去除紋身嗎？

答：不需要。紋身不影響手術。

326. 問：手術前需要進行斷層或磁振造影檢查嗎？

答：一般不需要。特殊情況（如飛秒雷射）可能需要電腦斷層定位。

327. 問：手術前需要抽血檢查嗎？

答：一般不需要。但若有全身性疾病，醫師可能安排抽血評估。

328. 問：手術前需要做心電圖嗎？

答：一般不需要。但有心臟病史或高齡患者，醫師可能安排。

329. 問：手術前需要做胸部X光嗎？

答：一般不需要。除非有呼吸道疾病或懷疑感染。

330. 問：手術前可以吃普拿疼嗎？

答：可以。普拿疼不影響凝血功能。

331. 問：手術前可以吃維他命嗎？

答：可以。但維生素E、高劑量魚油建議暫停。

332. 問：手術前可以喝人參茶嗎？

答：建議暫停。人參有抗凝血作用。

333. 問：手術前可以吃靈芝嗎？

答：建議暫停。靈芝可能影響凝血。

334. 問：手術前可以吃銀杏嗎？

答：強烈建議暫停，至少停1-2週。銀杏有明顯抗凝血作用。

335. 問：手術前可以吃大蒜精嗎？

答：建議暫停。大蒜精也有抗凝血作用。

分類八：術後日常照護 (Post-op Care)

336. 問：術後最重要的注意事項是什麼？

答：三大原則：不揉眼睛（睡覺戴眼罩）、不碰生水（洗臉用毛巾擦）、不提重物（避免劇烈運動和憋氣）。

337. 問：術後需要戴眼罩嗎？要戴多久？

答：睡覺時需要戴護眼罩，防止睡眠中揉眼。建議戴1週左右。白天清醒時可以不戴。

338. 問：術後多久可以洗臉、洗頭？

答：洗臉用毛巾輕擦避開眼睛。洗頭仰躺或給人洗，防止水流入。醫師確認傷口癒合後（約2週）可恢復正常。

339. 問：術後眼藥水要怎麼點？

答：點藥前洗手。藥水滴入下眼瞼，輕閉眼睛1-2分鐘，按壓眼頭內角幫助吸收。多瓶藥水間隔5分鐘。

340. 問：術後要點哪些眼藥？要點多久？

答：抗生素（1-2週）、消炎藥（4-6週漸減）、人工淚液（視需要）。請遵照醫囑，不要自行停藥。

341. 問：忘記點藥了，怎麼辦？

答：想起後立即補點，下一次按正常時間，不要加倍。盡量維持規律點藥。

342. 問：術後多久可以看電視或用手機？

答：術後隔天就可以，但不要過久。感覺乾澀要休息並點人工淚液。

343. 問：術後可以開車嗎？

答：術後至少1週不建議開車。待視力穩定、夜間光暈可接受後再恢復。

344. 問：術後可以做運動嗎？要停多久？

答：術後1個月內避免劇烈運動、球類、游泳、舉重。走路等輕度活動可以。

345. 問：術後飲食有什麼禁忌嗎？

答：沒有特別禁忌。均衡飲食，避免過度辛辣刺激。糖尿病、高血壓患者繼續飲食控制。

346. 問：術後可以喝酒嗎？

答：術後至少2週避免喝酒。之後少量飲酒通常無礙，但建議先問醫師。

347. 問：術後可以搭飛機嗎？

答：術後2週後一般可以。機艙乾燥可能加重乾眼，多補充人工淚液。

348. 問：術後可以出門嗎？要待在家裡嗎？

答：可以出門。白天戴護目鏡或太陽眼鏡，避免風沙、強光。避免人多擁擠處。

349. 問：術後多久需要回門診追蹤？

答：術後隔天或1-3天第一次回診。之後依醫師安排：1週、1個月、3個月。有異常隨時回診。

350. 問：術後眼睛有紅有腫，正常嗎？

答：輕微充血和浮腫正常，1-2週消退。若突然變很紅、腫、痛、視力下降，需立即回診。

351. 問：術後點藥時不小心碰到瓶口怎麼辦？

答：藥水可能已污染。繼續使用但要格外留意。若藥水變渾濁或有異物，停用並告知醫師。

352. 問：手術後可以睡午覺嗎？

答：可以。睡覺時請戴眼罩，不要趴睡壓到手術眼。

353. 問：術後可以看書或閱讀嗎？

答：可以。不要長時間連續閱讀，適時休息。初期可能需要更多光線。

354. 問：術後眼睛可以化妝嗎？

答：術後至少4週不要化眼妝。臉部其他部位在不碰到眼周的情況下可以使用。

355. 問：術後眼睛怕光，外出需要帶什麼？

答：戴護目鏡或深色太陽眼鏡，選擇能阻擋紫外線和側邊防護的款式。

356. 問：術後能不能搓揉眼睛？如果真的很癢怎麼辦？

答：絕對不能揉！很癢可點人工淚液、輕閉眼睛休息。若伴隨紅腫回診檢查。

357. 問：術後洗澡可以嗎？

答：可以。洗臉用毛巾擦，洗頭仰躺或請人協助，避免水流入眼睛。約2週後可放鬆限制。

358. 問：術後可以游泳嗎？

答：至少1個月後，且需配戴防水護目鏡。開放水域建議2-3個月後。

359. 問：術後多久可以騎機車或腳踏車？

答：腳踏車約1-2週後；機車建議2-4週後，視力穩定且醫師確認後。

360. 問：術後多久可以拿掉眼罩？

答：睡覺戴1週，或依醫師指示。白天清醒不揉眼可不戴。

361. 問：術後如果真的很不舒服，除了回診，有什麼方法可以緩解？

答：輕微不適可點人工淚液、休息。劇痛、視力驟降、大量分泌物→立即回診，不要自行處理。

362. 問：術後第一次複診要做什麼？

答：測視力、量眼壓、檢查傷口和水晶體位置、確認無感染、調整用藥。

363. 問：術後眼藥水點完了，可以自己去藥局買嗎？

答：不可以。術後藥水是處方藥，需醫師評估後開立。快用完請回診。

364. 問：術後可以吃止痛藥嗎？

答：若輕微不適可吃普拿疼。避免阿斯匹靈、布洛芬等抗凝血藥物，除非醫師允許。

365. 問：術後可以冰敷或熱敷眼睛嗎？

答：一般不建議。請依醫師指示。若有瘀青腫脹，先諮詢醫師。

366. 問：術後可以戴眼鏡（未開刀眼）嗎？

答：可以。未開刀眼可正常戴眼鏡。

367. 問：術後可以點人工淚液嗎？

答：可以。選擇不含防腐劑的單支裝人工淚液更佳。

368. 問：術後可以點其他眼藥水（如過敏藥水）嗎？

答：請先諮詢醫師，不要自行添加。

369. 問：術後可以洗眼睛或沖洗眼睛嗎？

答：不可以。不要自行沖洗眼睛。

370. 問：術後可以戴護目鏡睡覺嗎？

答：可以。術後睡覺戴鐵眼罩即可，不需要額外護目鏡。

371. 問：術後可以側睡嗎？

答：可以。建議健側（未開刀側）朝下，手術眼朝上。

372. 問：術後可以趴睡嗎？

答：不建議。趴睡可能壓到眼睛。

373. 問：術後可以打噴嚏或咳嗽嗎？

答：可以。盡量張開嘴巴打噴嚏，減少眼壓瞬間升高。若需用力咳嗽，可輕壓眼睛保護。

374. 問：術後可以排使用力嗎？

答：避免用力憋氣排便，以免眼壓升高。多喝水、多吃蔬果預防便秘。

375. 問：術後可以提幾公斤的東西？

答：術後2-4週內避免提超過3-5公斤的重物。

376. 問：術後可以彎腰撿東西嗎？

答：建議蹲下而不是彎腰，避免頭低於心臟。

377. 問：術後可以吹頭髮嗎？

答：可以。吹風機不要對著眼睛直吹。

378. 問：術後可以使用吹風機嗎？

答：可以。保持距離，避免熱風直吹眼睛。

379. 問：術後可以使用吸塵器嗎？

答：可以。避免灰塵飛揚進入眼睛。

380. 問：術後可以使用電腦多久？

答：建議每30分鐘休息5-10分鐘，看遠方。

381. 問：術後可以使用手機多久？

答：同電腦。適度休息，避免眼睛疲勞。

382. 問：術後可以看3D電影嗎？

答：建議術後1個月再考慮。3D電影可能引起眼睛疲勞或不適。

383. 問：術後可以去KTV唱歌嗎？

答：可以。避免過度用力唱歌。

384. 問：術後可以去夜市嗎？

答：可以。注意不要被碰撞，避免灰塵進入眼睛。

385. 問：術後可以烤肉嗎？

答：可以。避免煙霧直吹眼睛，保持距離。

386. 問：術後可以養寵物嗎？

答：可以。接觸寵物後要洗手再碰眼睛。

387. 問：術後可以種花嗎？

答：可以。避免泥土、灰塵進入眼睛，建議戴護目鏡。

388. 問：術後可以拖地嗎？

答：術後2-4週內避免，因為需要彎腰用力。

389. 問：術後可以煮飯嗎？

答：可以。避免油煙、熱油噴濺到眼睛。

390. 問：術後可以抱小孩嗎？

答：術後2-4週內避免抱較重的幼兒（超過5公斤）。

391. 問：術後可以親吻寵物嗎？

答：不建議。寵物毛髮、口水可能引起過敏或感染。

392. 問：術後可以做瑜伽嗎？

答：術後1個月內避免倒立、頭下腳上的姿勢。

393. 問：術後可以做重量訓練嗎？

答：術後1個月內避免。之後逐步恢復，避免憋氣用力。

394. 問：術後可以做有氧舞蹈嗎？

答：術後2-4週後可逐步恢復，避免劇烈跳動。

395. 問：術後可以打太極拳嗎？

答：可以。動作溫和，不會影響。

396. 問：術後可以跳廣場舞嗎？

答：術後2-4週後可逐步恢復。

397. 問：術後可以做園藝嗎？

答：可以。戴護目鏡，避免灰塵、泥土。

398. 問：術後可以使用除草機嗎？

答：術後1個月內避免，因震動大且可能有異物飛濺。

399. 問：術後可以使用電鑽嗎？

答：術後1個月內避免，原因同上。

400. 問：術後可以洗碗嗎？

答：可以。戴橡膠手套，避免洗碗精噴濺。

分類九：費用與行政流程 (Budget & Logistics)

401. 問：白內障手術健保給付什麼？要自費什麼？

答：健保給付：超音波乳化手術費用、健保水晶體、一般耗材。自費：升級水晶體差額、飛秒雷射、特殊耗材。

402. 問：自費水晶體的差額大概是多少？

答：非球面單焦點約數千元；散光矯正型約1-3萬元；延焦或多焦點約3-6萬元。各院定價不同。

403. 問：飛秒雷射輔助手術要多少錢？

答：一眼約1-3萬元以上（不含水晶體費用）。請向醫院諮詢。

404. 問：保險有沒有給付白內障手術？

答：視您的保單內容。許多醫療實支實付保險有給付。建議術前諮詢保險業務員。

405. 問：手術同意書我要怎麼看？需要注意什麼？

答：仔細閱讀手術目的、方式、風險、替代療法。有疑問一定要問清楚再簽。

406. 問：可以要求不同醫師來做我的手術嗎？

答：可以表達意願。術前主治醫師通常就是手術醫師。

407. 問：手術當天的流程是什麼？

答：報到→核對資料→換衣→點散瞳劑→進手術室→手術→恢復觀察→說明注意事項→回家。約3-5小時。

408. 問：報到時需要帶什麼文件？

答：健保卡、身份證、手術通知書、同意書（已簽）、自費同意書（若有）。

409. 問：需要請假多少天？

答：建議休息3-7天。辦公室工作1週後可上班；粗重工作需2-4週。

410. 問：術後複診費用另外計算嗎？

答：部分追蹤複診可能包含在手術費用中。健保部分負擔照常計算。請向醫院確認。

411. 問：如果手術後不滿意，可以要求補救或退費嗎？

答：醫師會提供後續協助（配鏡、雷射微調）。自費費用原則上不退費。術前充分溝通最重要。

412. 問：如果之後需要做YAG雷射治療後發性白內障，要另外付費嗎？

答：健保有條件給付，費用較低。可詢問醫師相關費用。

413. 問：手術後需要複診，複診費用健保給付嗎？

答：門診診察費健保給付，只需負擔掛號費和部分負擔。

414. 問：如果我對術後結果不滿意，可以找誰反映？

答：先與主治醫師溝通。無法解決可向醫院病人服務中心反映。

415. 問：手術後的眼藥水費用需要自費嗎？

答：標準抗生素和消炎藥通常在健保範圍內。特殊藥水可能自費。

416. 問：手術後多久可以開立診斷書或術後報告，給保險公司申請理賠？

答：術後穩定後（約1-3個月）可申請。急需可提前。

417. 問：手術費用可以刷卡嗎？

答：視各院規定。可先詢問。

418. 問：手術費用可以分期付款嗎？

答：一般不行。可詢問醫院是否有醫療貸款方案。

419. 問：自費水晶體可以退貨嗎？

答：一旦植入無法退貨。術前選擇要謹慎。

420. 問：手術後收據遺失了怎麼辦？

答：可向醫院申請補發。

421. 問：手術後需要開立英文診斷書嗎？

答：若有需要（如出國、保險），可向醫院申請，通常需額外付費。

422. 問：手術前需要先繳費嗎？

答：多數醫院手術當天或術前繳費。請向醫院確認。

423. 問：手術費用包含術後藥水嗎？

答：通常不包含。術後藥水另外開立，健保給付部分負擔。

424. 問：手術費用包含術後複診嗎？

答：手術費用通常不包含複診掛號費。

425. 問：手術費用包含YAG雷射嗎？

答：不包含。YAG雷射是後續治療，費用另計。

426. 問：手術費用包含飛秒雷射嗎？

答：若選擇飛秒雷射，費用另加。請確認報價單。

427. 問：手術費用包含囊袋張力環嗎？

答：不包含。張力環是自費耗材。

428. 問：手術費用包含角膜內皮細胞檢查嗎？

答：通常包含在術前檢查中，健保給付。

429. 問：手術費用包含眼軸長測量嗎？

答：通常包含在術前檢查中，健保給付。

430. 問：手術費用包含角膜地形圖嗎？

答：通常包含，健保給付或部分自費。

431. 問：手術費用包含散瞳眼底檢查嗎？

答：包含，健保給付。

432. 問：手術費用可以申報所得稅醫療扣除額嗎？

答：可以。白內障手術費用（含自費項目）可列舉扣除。

433. 問：手術費用可以申請公司團保嗎？

答：視公司團保內容。可向人事部門詢問。

434. 問：手術費用可以申請勞保給付嗎？

答：白內障手術非職災，一般勞保不給付。但若因職災導致，可申請。

435. 問：手術費用可以申請身障補助嗎？

答：若術後視力仍符合身障標準，可申請相關補助。請洽社會局。

436. 問：手術費用可以申請低收入戶補助嗎？

答：可向社會局或醫院社工人員諮詢。

437. 問：手術費用可以申請榮民補助嗎？

答：榮民可依規定申請補助。請洽榮民服務處。

438. 問：手術費用可以申請農保給付嗎？

答：農保一般不含白內障手術。請洽農保單位。

439. 問：手術費用收據可以開立統編嗎？

答：可以。報到時告知櫃檯。

440. 問：手術費用收遺失可以補開嗎？

答：可以。向醫院申請補發，通常需填寫申請單。

441. 問：手術前需要先辦理住院手續嗎？

答：門診手術不需要。直接到手術室報到。

442. 問：手術後需要辦理出院手續嗎？

答：門診手術不需要。觀察後直接回家。

443. 問：手術同意書可以請家屬代簽嗎？

答：若您意識清楚，應由本人簽署。特殊情況可委託家屬。

444. 問：手術同意書簽了之後可以反悔嗎？

答：手術前隨時可以撤回同意。手術開始後無法。

445. 問：手術前需要先繳保證金嗎？

答：一般不需要。若有自費項目，可能需先繳部分費用。

446. 問：手術後可以申請病歷影本嗎？

答：可以。向醫院病歷室申請，需付費。

447. 問：手術後可以申請手術錄影嗎？

答：一般不提供。部分醫院有教學錄影，需申請並簽署同意書。

448. 問：手術後可以申請人工水晶體標籤嗎？

答：可以。人工水晶體外包裝有標籤，可向醫院索取影本。

449. 問：手術後可以申請術前檢查報告嗎？

答：可以。向醫院病歷室申請。

450. 問：手術後需要填寫滿意度調查嗎？

答：有些醫院會提供，歡迎填寫提供意見。

451. 問：手術費用可以用振興券支付嗎？

答：視各院規定。請先詢問。

452. 問：手術費用可以用信用卡紅利點數折抵嗎？

答：視各院規定。一般不行。

453. 問：手術費用可以開立多家醫院的收據嗎？

答：只能開立執行手術醫院的收據。

454. 問：手術後需要轉院追蹤嗎？

答：可以在原醫院追蹤，也可轉至住家附近眼科。請攜帶病歷摘要。

455. 問：手術後可以換醫師追蹤嗎？

答：可以。建議攜帶手術紀錄。

456. 問：手術後可以去其他醫院做YAG雷射嗎？

答：可以。建議攜帶手術紀錄，讓新醫師了解狀況。

457. 問：手術後可以去眼鏡行驗光配鏡嗎？

答：建議等度數穩定（術後1-3個月）後再驗光配鏡。

458. 問：手術後可以參加醫院舉辦的白內障病友會嗎？

答：可以。許多醫院有舉辦，歡迎參加交流。

459. 問：手術後可以索取衛教單張嗎？

答：可以。醫院通常會提供。也可參考線上衛教資源。

460. 問：手術後有疑問可以打電話問醫院嗎？

答：可以。請於上班時間撥打醫院諮詢電話。緊急狀況請直接回診或去急診。

461. 問：手術後可以預約居家訪視嗎？

答：部分醫院有提供。可向社工或護理部詢問。

462. 問：手術後可以申請居家護理嗎？

答：若行動不便，可申請居家護理協助點藥。

463. 問：手術後可以申請交通接送服務嗎？

答：部分長照2.0或醫院有提供。可洽詢。

464. 問：手術後可以申請復健服務嗎？

答：白內障手術一般不需要復健。

465. 問：手術後可以申請視力訓練嗎？

答：若有雙眼視覺問題，可轉介視覺訓練。

466. 問：手術後可以申請低視能輔具評估嗎？

答：若術後視力仍不佳，可申請。

467. 問：手術後可以申請身心障礙鑑定嗎？

答：若術後視力仍符合標準，可申請。請洽社會局。

468. 問：手術後可以申請愛心手環嗎？

答：若有失智或其他需求，可向社會局申請。

469. 問：手術後可以申請居家用藥指導嗎？

答：可向醫院藥劑部或社區藥局詢問。

470. 問：手術後可以申請營養諮詢嗎？

答：可向醫院營養科諮詢。

471. 問：手術後可以申請心理諮商嗎？

答：若對手術結果有情緒困擾，可尋求心理諮商。

472. 問：手術後可以申請職業重建嗎？

答：若因視力影響工作，可向勞動部勞動力發展署申請。

473. 問：手術後可以申請輔具補助（如放大鏡）嗎？

答：若視力未達標準，可向社會局申請。

474. 問：手術後可以申請居家環境改造補助嗎？

答：若符合身障標準，可申請。

475. 問：手術後可以申請生活重建訓練嗎？

答：若視力嚴重受損，可向盲人重建院申請。

476. 問：手術後可以申請點字或有聲書服務嗎？

答：若視力嚴重受損，可向圖書館或視障服務中心申請。

477. 問：手術後可以申請導盲犬嗎？

答：需符合視障標準，向導盲犬協會申請。

478. 問：手術後可以申請白手杖嗎？

答：若視力嚴重受損，可向社會局或盲人協會申請。

479. 問：手術後可以申請語音報時手錶嗎？

答：若符合視障標準，可向輔具中心申請。

480. 問：手術後可以申請擴視機嗎？

答：若低視能，可向輔具中心申請補助。

481. 問：手術後可以申請放大鏡眼鏡嗎？

答：可向低視能門診評估後開立。

482. 問：手術後可以申請濾光眼鏡嗎？

答：若畏光嚴重，可配戴濾光眼鏡。

483. 問：手術後可以申請防眩光護目鏡嗎？

答：可自行購買。無特別補助。

484. 問：手術後可以申請夜間駕駛輔助裝置嗎？

答：目前無標準輔具。若夜間視力差，建議避免夜間駕駛。

485. 問：手術後可以申請行前訓練嗎？

答：若視力嚴重受損，可向盲人重建局申請定向行動訓練。

486. 問：手術後可以申請就業輔導嗎？

答：可向勞動部勞動力發展署各分署申請。

487. 問：手術後可以申請創業貸款嗎？

答：若有身心障礙證明，可申請相關創業貸款。

488. 問：手術後可以申請稅務減免嗎？

答：若符合身心障礙標準，可申報身心障礙特別扣除額。

489. 問：手術後可以申請停車位識別證嗎？

答：若符合身障標準，可申請身心障礙者專用停車位識別證。

490. 問：手術後可以申請大眾運輸優惠嗎？

答：若領有身障證明，可申請敬老愛心卡或博愛卡。

491. 問：手術後可以申請博物館、國家公園優惠嗎？

答：若領有身障證明，可享優惠。

492. 問：手術後可以申請手機費率優惠嗎？

答：各電信公司有身障優惠方案，可洽詢。

493. 問：手術後可以申請有線電視優惠嗎？

答：各系統台有身障優惠，可洽詢。

494. 問：手術後可以申請水電費優惠嗎？

答：若領有身障證明，可申請水電費優惠。

495. 問：手術後可以申請房屋稅優惠嗎？

答：若符合身障標準，可申請房屋稅減免。

496. 問：手術後可以申請地價稅優惠嗎？

答：若符合身障標準，可申請地價稅減免。

497. 問：手術後可以申請牌照稅優惠嗎？

答：若符合身障標準且車輛為本人所有，可申請牌照稅減免。

498. 問：手術後可以申請健保費補助嗎？

答：若符合低收入戶或中低收入戶標準，可申請健保費補助。

499. 問：手術後可以申請國民年金減免嗎？

答：若領有身障證明，可申請國民年金保費減免。

500. 問：白內障手術後，我該如何保養眼睛，讓視力維持更久？

答：定期回診追蹤、控制慢性病（血糖、血壓）、戶外戴抗UV太陽眼鏡、均衡飲食（葉黃素、維生素C/E）、不抽菸、避免眼睛外傷。最重要的是，有任何視力變化要儘早就醫。