

西安克通大学

中国 西安 710049

Xi'an Jiaotong University Xi'an 710049,P.R. China

11) R= 6x103mol Lt. 5t 12/2= = 3X/0257 2、11)易知处理吸收 观察常的物物的据明如,如对A为要级反应 (2) 双原 2、3.4组数据品的公路(2018) (18),所以对B为自一级领 13) V=&C(B) 5. (1)设V=kC 见小dc=Ydt=kcdt - Edc= kdt Sizedc = R. 30min hos 195 = 2.30 min. 同理: 50.2 -dc=/n5=/2-30 min · · 需要分 min 四曲川知 b= Ins min-=2/n5 5 1

8. 12 r= pc

-dc= rdt=kcdt => - tdc=kdt

地址: 西安市咸宁西路28号

邮编: 710049

再

the - 6000 046. C. t=0.23/1 -023h5005 1= 0.46t

t=2.17h. 二. 17 17 1/6 可分角层 90%

[7430K: 19K1=19A- Ea -1

T1 = 500K, 1gK1 = 1gA - 2.303R I2

=1gA - Ea 1 + Ea (1 - T2)

= 19K1 + 2.303/ (1/1 - 1/2)

= bo -4.7459

Kz = 1.8 x/0-5 L.molt.5-1

地址: 西安市咸宁西路28号

邮编: 710049

第