

# Análisis Matemático III

Javier Ortín Rodenas

Curso 2025-2026

# Contenidos

<b>Preliminares</b>	<b>5</b>
1. Cardinalidad de conjuntos . . . . .	5
0.1.1 Definición de cardinalidad, tipos de cardinalidad . . . . .	5
0.1.2 Ejemplos de conjuntos numerables . . . . .	6
0.1.3 Ejemplos de conjuntos no numerables . . . . .	7
0.1.4 Procesos que dan lugar a conjuntos numerables . . . . .	8
0.1.5 Más procesos que dan lugar a conjuntos numerables . . . . .	9
0.1.6 Unión numerable de conjuntos numerables . . . . .	9
0.1.7 Definición de conjunto de partes . . . . .	11
0.1.8 Cardinal de partes de un conjunto finito . . . . .	11
0.1.9 El conjunto de partes incrementa la cardinalidad . . . . .	11
0.1.10 Cardinalidad de $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ . . . . .	12
0.1.11 Jerarquía de cardinalidades . . . . .	12
2. Descomposición de subconjuntos abiertos de $\mathbb{R}^N$ en cubos diádicos . .	13
0.2.1 Definición de intervalo diádico . . . . .	13
0.2.2 Propiedades de los intervalos diádicos . . . . .	13
0.2.3 Definición de cubo diádico . . . . .	14
0.2.4 Propiedades de los cubos diádicos . . . . .	14
0.2.5 Teorema de descomposición de abiertos en cubos diádicos . .	15
3. Series dobles . . . . .	18
0.3.1 Definición de sucesión doble . . . . .	18
0.3.2 Definición de serie doble . . . . .	18
0.3.3 Teorema de series dobles no negativas . . . . .	19
<b>I Teoría de la medida</b>	<b>22</b>
1. Espacios de medida . . . . .	22
1.1.1 Definición de $\sigma$ -álgebra . . . . .	22
1.1.2 Propiedades de las $\sigma$ -álgebras . . . . .	22
1.1.3 Definición de espacio de medida . . . . .	23
1.1.4 Propiedades de los espacios de medida . . . . .	24
1.1.5 Espacio de medida inducido . . . . .	26
1.1.6 Medida de contar . . . . .	27
1.1.7 Subaditividad en espacios de medida . . . . .	27
1.1.8 Definición de espacio de medida completo . . . . .	28
1.1.9 Compleción de un espacio de medida . . . . .	28
2. El espacio de medida de Lebesgue $(\mathbb{R}^N, \mathfrak{M}_N, \mu_N)$ . . . . .	32
1.2.1 Definiciones de intervalos y cubos . . . . .	32
1.2.2 Definición del volumen de un cubo . . . . .	32

1.2.3	Definición de medida exterior . . . . .	32
1.2.4	Corolario de la definición anterior . . . . .	33
1.2.5	Ejemplos básicos de medida exterior . . . . .	33
1.2.6	Proposición de propiedades de $\mu_N^*$ . . . . .	34
1.2.7	Volumen de un intervalo real . . . . .	35

# Introducción de la asignatura

La materia será la misma que en años anteriores, aunque habrá un cambio en la metodología de enseñanza: no habrá tutorías grupales. No obstante, sí habrá evaluación continua. Su funcionamiento se explicará posteriormente.

# Preliminares

En la sección de preliminares se tratarán los siguientes temas:

- Cardinalidad de conjuntos
- Descomposición de abiertos de  $\mathbb{R}^N$  en unión de cubos diádicos
- Series dobles

## §1. Cardinalidad de conjuntos

### 0.1.1 Definición de cardinalidad, tipos de cardinalidad

Intuitivamente, podemos definir la cardinalidad de un conjunto como el número de elementos que tiene. Además, es lógico plantear la distinción entre conjuntos finitos e infinitos. Veamos cómo formalizar esta idea.

Sea  $A$  un conjunto no vacío, diremos que  $A$  es un conjunto finito de cardinalidad  $n \in \mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$  si existe una aplicación biyectiva  $\varphi : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow A$ .

Se considera que el conjunto vacío  $\emptyset$  es finito con cardinal 0.

Sea  $A$  un conjunto cualquiera, diremos que es un conjunto infinito si existe cierta aplicación inyectiva  $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow A$ . Dentro de esta clasificación, diremos que  $A$  es infinito numerable si existe una aplicación  $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow A$  biyectiva. Si esto último no fuese posible, diremos que  $A$  es infinito no numerable.

Aunque no entra dentro de los objetivos de esta asignatura, es interesante contemplar la siguiente observación: Si un conjunto no es un conjunto finito, podemos afirmar simplemente que es un conjunto "no finito". Si además incluimos el axioma de elección, sí podremos afirmar que tal conjunto es infinito. Dentro de los conjuntos infinitos, todos son o bien numerables o bien no numerables, sin intersección entre ambas categorías.

### 0.1.2 Ejemplos de conjuntos numerables

- $\mathbb{N}$ : trivial, basta considerar la aplicación identidad.
- $\mathbb{Z}$ : basta considerar la siguiente aplicación biyectiva:

$$\varphi(n) = \begin{cases} \frac{n}{2}, & \text{si } n \text{ es par} \\ -\frac{n-1}{2}, & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases} \quad \begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & \dots \\ \downarrow \varphi & \downarrow \varphi & \downarrow \varphi & \downarrow \varphi & \downarrow \varphi & \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -2 & \dots \end{array}$$

- $\mathbb{Q} := \left\{ \frac{z}{n} : z \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} \right\}$ . Denotaremos por  $\hat{\mathbb{Q}}$  al conjunto  $\left\{ \frac{z}{n} : z, n \in \mathbb{N} \right\}$ . Como hemos visto en el apartado anterior, al ser  $\mathbb{Z}$  numerable,  $\hat{\mathbb{Q}}$  y  $\mathbb{Q}$  han de tener necesariamente la misma cardinalidad. Por tanto, basta con demostrar que  $\hat{\mathbb{Q}}$  es numerable, lo que haremos a continuación por medio de una doble desigualdad.

Representaremos los elementos de  $\hat{\mathbb{Q}}$  en una tabla infinita que recorreremos diagonalmente:

	1	2	3	4	...
1	$\frac{1}{1}$	$\frac{2}{1}$	$\frac{3}{1}$	$\frac{4}{1}$	...
2	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{2}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{4}{2}$	...
3	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{3}$	$\frac{4}{3}$	...
4	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{4}{4}$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Por tanto, obtenemos como resultado la siguiente aplicación  $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \hat{\mathbb{Q}}$  con

$$\varphi(1) = \frac{1}{1}, \quad \varphi(2) = \frac{2}{1}, \quad \varphi(3) = \frac{1}{2}, \quad \varphi(4) = \frac{3}{1}, \quad \varphi(5) = \frac{2}{2}, \quad \varphi(6) = \frac{1}{3} \dots$$

Aunque esta aplicación no es inyectiva (por ejemplo  $\varphi(1) = \varphi(5)$ ), sí es suprayectiva. Por tanto,  $\text{card } \mathbb{N} \leq \text{card } \hat{Q}$ . Además, como  $\mathbb{N} \subseteq \hat{Q}$ , es evidente que  $\text{card } \mathbb{N} \geq \text{card } \hat{Q}$ . En consecuencia,  $\text{card } \mathbb{N} = \text{card } \hat{Q}$ ; es decir,  $\hat{Q}$  es numerable y por tanto también lo es  $\mathbb{Q}$ .

### 0.1.3 Ejemplos de conjuntos no numerables

Vemos que  $\mathbb{R}$  es no numerable por reducción al absurdo. Supongamos que existe una aplicación biyectiva  $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ . Así, ha de cumplirse  $\varphi(\mathbb{N}) = \mathbb{R}$ . Definiremos una sucesión de intervalos encajados como sigue:

- Tomamos  $a_1, b_1$  cualesquiera tales que  $a_1 < b_1$  y  $\varphi(1) \notin [a_1, b_1]$
- Para  $n > 1$ , tomamos  $a_n, b_n$  tales que  $a_n < b_n$ ,  $[a_n, b_n] \subset (a_{n-1}, b_{n-1})$  y  $\varphi(n) \notin [a_n, b_n]$

De este modo, obtenemos una sucesión de intervalos cerrados encajados tales que  $\varphi(n) \notin [a_n, b_n] \forall n \in \mathbb{N}$ . Denotando  $I_i = [a_i, b_i]$ , se cumple:

1.  $I_1$  es compacto por el teorema de Heine-Borel
2.  $\{I_n : n \in \mathbb{N}\}$  verifica la propiedad de la intersección finita

Al ser una sucesión de intervalos cerrados encajados, juntando las dos nociones anteriores, podemos afirmar que se satisface la propiedad de la intersección infinita. Por tanto, se tiene:

$$\exists x_0 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n \Rightarrow x_0 \in \mathbb{R} \setminus \varphi(\mathbb{N}) \Rightarrow \varphi(\mathbb{N}) \neq \mathbb{R} \Rightarrow \varphi \text{ no es biyectiva}$$

Se contradice la hipótesis de partida. Por todo lo anterior, concluimos que  $\mathbb{R}$  es no numerable.

La aplicación  $\tan : (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \longrightarrow \mathbb{R}$  es biyectiva, luego el intervalo  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$  es no numerable. Por otro lado, podemos establecer una biyección entre este intervalo y cualquier otro intervalo abierto. Así, cualquier intervalo es no numerable.

### 0.1.4 Procesos que dan lugar a conjuntos numerables

Sea  $A$  un conjunto finito, sea  $B$  un conjunto infinito numerable. Entonces,  $A \cup B$  y  $A \times B$  son conjuntos infinitos numerables (o vacíos).

**Demostración:** Distinguiremos dos casos:

Si  $A = \emptyset$ , entonces  $A \cup B = B$  que es infinito numerable por hipótesis. Además,  $A \times B = \emptyset$  que es finito por definición.

Si  $A \neq \emptyset$ , como  $A$  es finito podemos afirmar que  $A \setminus B = \{a_1, a_2, \dots, a_{n_1}\}$  para cierto  $n_1 \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ . Por ser  $B$  infinito numerable, existe una aplicación biyectiva  $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow B$ . Para ver que  $A \cup B$  es infinito numerable, basta considerar la siguiente biyección:

$$\hat{\varphi}(n) = \begin{cases} a_n, & \text{si } n \leq n_1 \\ \varphi(n - n_1), & \text{si } n > n_1 \end{cases}$$

Esta biyección  $\hat{\varphi}$  enumera primero todos los elementos de  $A \setminus B$  (de haberlos) para luego enumerar todos los elementos de  $B$  en el orden original de  $\varphi$ .

Al ser  $A$  finito, podemos escribir  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{n_2}\}$  para cierto  $n_2 \in \mathbb{N}$ . Para ver que  $A \times B$  es infinito numerable, podemos enumerar sus elementos de la siguiente forma:

	1	2	...	$n_2$
1	$(a_1, \varphi(1))$	$(a_2, \varphi(1))$	...	$(a_{n_2}, \varphi(1))$
2	$(a_1, \varphi(2))$	$(a_2, \varphi(2))$	...	$(a_{n_2}, \varphi(2))$
3	$(a_1, \varphi(3))$	$(a_2, \varphi(3))$	...	$(a_{n_2}, \varphi(3))$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$

Basta enumerar los elementos de  $A \times B$  recorriendo la tabla de izquierda a derecha y de arriba a abajo, pues cada fila tiene  $n_2$  elementos y hay tantas filas como naturales.



### 0.1.5 Más procesos que dan lugar a conjuntos numerables

Sean  $A, B$  conjuntos infinitos numerables con  $A \cap B = \emptyset$ . Entonces,  $A \cup B$  y  $A \times B$  son conjuntos infinitos numerables.

**Demostración:** Al ser  $A$  y  $B$  infinitos numerables por hipótesis, podemos afirmar que existen ciertas aplicaciones biyectivas  $\varphi_A : \mathbb{N} \rightarrow A$  y  $\varphi_B : \mathbb{N} \rightarrow B$ .

Para ver que  $A \cup B$  es infinito numerable, basta considerar la siguiente biyección:

$$\varphi_{A \cup B}(n) = \begin{cases} \varphi_A\left(\frac{n+1}{2}\right), & \text{si } n \text{ es impar} \\ \varphi_B\left(\frac{n}{2}\right), & \text{si } n \text{ es par} \end{cases}$$

Así, se enumeran alternativamente los elementos de  $A$  y  $B$ . Al ser  $A \cap B = \emptyset$ , es seguro que esta aplicación es biyectiva.

Finalmente, para ver que  $A \times B$  es infinito numerable, podemos representar sus elementos de forma matricial utilizando un razonamiento diagonal análogo al empleado para ver que  $\mathbb{Q}$  es numerable.

**Nota:** Aunque en esta demostración hemos supuesto que  $A \cap B = \emptyset$ , el resultado puede aplicarse también para conjuntos de intersección no vacía. Nótese que como  $A$  y  $B$  son infinito numerables, entonces  $A \cap B$ ,  $A \setminus B$  y  $B \setminus A$  han de ser necesariamente conjuntos finitos o infinitos numerables. Finalmente, basta ver que  $A \cup B = ((A \setminus B) \cup (B \setminus A)) \cup (A \cap B)$ , unión de conjuntos disjuntos. Como para el caso del producto cartesiano no se ha usado la hipótesis de que  $A \cap B = \emptyset$ , el resultado es válido en cualquier caso.

### 0.1.6 Unión numerable de conjuntos numerables

Sea  $\{A_n : n \in \mathbb{N}\}$  una colección de conjuntos numerables, entonces su unión es también un conjunto numerable.

**Demostración:** Utilizaremos también un argumento diagonal.

De manera similar a la demostración anterior, expresaremos la unión  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$  a partir de conjuntos auxiliares disjuntos para simplificar el trato de los elementos duplicados:

- Para  $n = 1$ , definimos  $B_1 := A_1$
- Para  $n > 1$ , definimos  $B_n := A_n \setminus \left( \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k \right) = A_n \setminus B_{n-1}$

De este modo, los  $B_i$  son disjuntos entre sí. Además, todos los  $A_i$  son numerables por hipótesis, cada  $B_i$  ha de ser finito o numerable. Según el carácter de cada uno de ellos, introducimos la siguiente notación:

$$\text{Caso finito: } B_i = \{b_1^i, b_2^i, \dots, b_{n_i}^i\} \quad \text{Caso numerable: } B_j = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} b_n^j$$

Con esta notación, expresaremos los elementos de cada  $B_i$  tabularmente:

	$B_1$	$B_2$	$B_3$	$B_4$	$\dots$
1	$b_1^1$	$b_1^2$	$b_1^3$	$b_1^4$	$\dots$
2	$b_2^1$		$b_2^3$	$b_2^4$	$\dots$
3	$b_3^1$		$b_3^3$	$b_3^4$	$\dots$
4	$b_4^1$		$b_4^3$	$b_4^4$	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Recorremos diagonalmente la matriz, saltando las celdas vacías en caso de haberlas (ocurriría en caso de que algún  $B_i$  fuese finito). Por ejemplo, el  $B_2$  de la figura tiene tan solo un único elemento. Como hemos tomado  $B_1 = A_1$ , hay infinitos elementos al ser  $A_1$  infinito numerable por hipótesis (no pueden ser finitos todos los  $B_i$ ).

### 0.1.7 Definición de conjunto de partes

Sea  $A$  un conjunto cualquiera, se denomina "conjunto de partes de  $A$ " y se denota como  $\mathcal{P}(A)$  al conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos de  $A$ . En particular, siempre se cumple que  $\emptyset, A \in \mathcal{P}(A)$ .

Por ejemplo, para  $A = \{1, 2\}$ , se tiene que  $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$ .

### 0.1.8 Cardinal de partes de un conjunto finito

Sea  $A$  un conjunto finito, entonces  $\text{card } \mathcal{P}(A) = 2^{\text{card } A} \in \mathbb{N}$ .

**Demostración:** Distinguiremos dos casos:

Para  $A = \emptyset$ , se tiene que  $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset\}$ , luego  $\text{card } \mathcal{P}(A) = 1 = 2^0 = 2^{\text{card } A}$ .

Si  $A \neq \emptyset$ , sea  $n := \text{card } A \in \mathbb{N}$ , podemos identificar cada subconjunto de  $A$  según la presencia o ausencia de cada uno de sus  $n$  elementos. Definimos el conjunto de las tuplas de ceros y unos de longitud  $n$  como sigue:

$$C := \{(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) : \varepsilon_i \in \{0, 1\} \ \forall i \in \{1, \dots, n\}\}$$

Así, denotando  $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ , cada tupla de  $C$  puede asociarse biunívocamente a un subconjunto de  $A$  al indicar cada  $\varepsilon_i$  si el elemento  $a_i$  pertenece o no al subconjunto. Por tanto, la siguiente aplicación  $\varphi$  es biyectiva:

$$\begin{array}{ccc} \varphi : \mathcal{P}(A) \longrightarrow C & & f_i : \mathcal{P}(A) \longrightarrow \{0, 1\} \\ B \longmapsto \prod_{i=1}^n f_i(B) & \text{donde} & B \longmapsto \begin{cases} 1, & \text{si } a_i \in B \\ 0, & \text{si } a_i \notin B \end{cases} \end{array}$$

### 0.1.9 El conjunto de partes incrementa la cardinalidad

Sea  $A$  un conjunto cualquiera. Entonces,  $\text{card } A < \text{card } \mathcal{P}(A)$ .

**Demostración:** Para todo conjunto  $A$  se cumple que  $\text{card } A \leq \text{card } \mathcal{P}(A)$ , pues  $a \in A \Rightarrow \{a\} \in \mathcal{P}(A)$ . Veamos ahora que no puede darse la igualdad por reducción al absurdo.

Supongamos que existe un conjunto  $A$  tal que  $\text{card } \mathcal{P}(A) = \text{card } A$ . En tal caso, ha de existir una aplicación biyectiva  $\varphi : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ . A partir de ella definimos el siguiente conjunto auxiliar:  $B := \{a \in A : a \notin \varphi(a)\}$ . Por construcción,  $B$  es un subconjunto de  $A$ , luego  $B \in \mathcal{P}(A)$ . Al ser  $\varphi$  biyectiva, existe cierto  $z \in A$  tal que  $\varphi(z) = B$ .

Pueden darse dos casos:

- 1.)  $z \in B = \varphi(z) \Rightarrow z \notin \varphi(z) = B$ , contradicción.
- 2.)  $z \notin B = \varphi(z) \Rightarrow z \in B = \varphi(z)$ , contradicción

En cualquiera de ellos se llega a una contradicción. Por todo lo anterior, concluimos que  $\text{card } A < \text{card } \mathcal{P}(A)$ .

### 0.1.10 Cardinalidad de $\mathcal{P}(\mathbb{N})$

De manera similar a como hicimos para ver el cardinal de un conjunto finito, podemos identificar cada subconjunto de  $\mathbb{N}$  en base a la presencia o ausencia de cada número natural en tal conjunto. Así, sabemos que existe una biyección entre los subconjuntos de  $\mathbb{N}$  y las sucesiones formadas por ceros y unos:

$$\varphi : \mathcal{P}(\mathbb{N}) \longrightarrow \{0, 1\}^{\mathbb{N}} = \left\{ (\varepsilon_n)_{n \in \mathbb{N}} : \varepsilon_i \in \{0, 1\} \ \forall i \in \mathbb{N} \right\}$$

Además, podemos asociar cada sucesión de ceros y unos a la expresión en base 2 de un número real del intervalo  $[0, 1]$ . Aplicando lo visto en los resultados 0.1.3 y 0.1.4, tal intervalo tiene la misma cardinalidad que  $\mathbb{R}$ ; es decir,  $2^{\aleph_0}$ .

### 0.1.11 Jerarquía de cardinalidades

En vista de los resultados anteriores, podemos establecer una jerarquía de cardinalidades. En primer lugar, está el conjunto vacío (de cardinal cero). A contin-

uación, los conjuntos finitos de cardinal natural. Pasando ahora a los conjuntos infinitos, la menor cardinalidad posible es la de los conjuntos infinitos numerables, denotada por  $\aleph_0$ . Como consecuencia del resultado 0.1.9, sabemos que podemos encontrar conjuntos de cardinalidad cada vez mayor al considerar el conjunto de partes de la iteración anterior.

Cabe preguntarse si existe algún tipo de cardinalidad intermedia entre los infinitos de esta escala. Esta cuestión es la conocida como Hipótesis del Continuo (CH), y se sabe que no puede ser probada ni refutada a partir de los axiomas habituales de la teoría de conjuntos (ZFC). Por tanto, debe considerarse como un axioma adicional independiente de ZFC: el axioma del continuo.

## §2. Descomposición de subconjuntos abiertos de $\mathbb{R}^N$ en cubos diádicos

### 0.2.1 Definición de intervalo diádico

Se llama "intervalo diádico de orden  $n$ " con  $n \in \mathbb{N}$  a cualquier intervalo real de la forma  $\left[\frac{j-1}{2^n}, \frac{j}{2^n}\right)$  con  $j \in \mathbb{Z}$ .

### 0.2.2 Propiedades de los intervalos diádicos


Fijado  $n \in \mathbb{N}$  cualquiera, se tiene que la colección de todos los intervalos diádicos de orden  $n$  es numerable (pues hay uno por cada  $j \in \mathbb{Z}$ ) y recubre  $\mathbb{R}$ :

$$\bigcup_{j \in \mathbb{Z}} \left[\frac{j-1}{2^n}, \frac{j}{2^n}\right) = \mathbb{R}$$

Además, dos intervalos diádicos cualesquiera son disjuntos o bien coinciden:

$$i \neq j \Rightarrow \left[\frac{i-1}{2^n}, \frac{i}{2^n}\right) \cap \left[\frac{j-1}{2^n}, \frac{j}{2^n}\right) = \emptyset$$

Las dos propiedades anteriores pueden visualizarse en la siguiente figura:




Para  $n \in \mathbb{N}$  fijo, son disjuntos y cubren  $\mathbb{R}$

Si  $I$  es un intervalo diádico de orden  $n$  y  $J$  es un intervalo diádico de orden  $m \in \mathbb{N}$  con  $m \leq n$ : entonces se cumple:

- O bien  $I \subsetneq J$
- O bien  $I \cap J = \emptyset$

La siguiente figura ilustra este hecho:



Intervalos diádicos de orden  $n$  y  $n + 1$

### 0.2.3 Definición de cubo diádico

Llamamos "cubo diádico de  $\mathbb{R}^N$  de orden  $n$ " con  $n, N \in \mathbb{N}$  a cualquier conjunto de la forma  $I_1 \times I_2 \times \dots \times I_N$  donde cada  $I_i$  es un intervalo diádico de orden  $n$ .

Denotaremos por  $\mathcal{F}_n$  al conjunto de todos los cubos diádicos de orden  $n$  en  $\mathbb{R}^N$ .

### 0.2.4 Propiedades de los cubos diádicos

Los cubos diádicos de orden  $n$  son numerables y recubren  $\mathbb{R}^N$  (consecuencia de la definición y de los resultados anteriores). Además, son disjuntos o coinciden; es decir:

$$\left. \begin{array}{l} C \in \mathcal{F}_n \\ D \in \mathcal{F}_n \\ C \neq D \end{array} \right\} \Rightarrow C \cap D = \emptyset$$

Como  $C, D \in \mathcal{F}_m$ , han de ser de la siguiente forma:

$$C = I_1 \times \dots \times I_N \quad D = J_1 \times \dots \times J_N$$

donde los  $I_i$  y los  $J_j$  son intervalos diádicos de orden  $n$ . Por hipótesis,  $C \neq D$  luego ha de existir cierto  $k \in \{1, \dots, n\}$  tal que  $I_k \neq J_k$ . Por las propiedades de los intervalos diádicos, sabemos que esto implica que  $I_k \cap J_k = \emptyset$ . Esto a su vez implica que  $C \cap D = \emptyset$ .

De manera similar, si  $C \in \mathcal{F}_n, D \in \mathcal{F}_m$  con  $m \leq n$ . Entonces o bien  $C \subsetneq D$  o bien  $C \cap D = \emptyset$ . Por definición de  $\mathcal{F}_n$  y  $\mathcal{F}_m$ , podemos afirmar que:

$$C = I_1 \times \dots \times I_N \quad D = J_1 \times \dots \times J_N$$

Donde los  $I_i$  y los  $J_j$  son intervalos diádicos de orden  $n$  y  $m$ , respectivamente. Por las propiedades de los intervalos diádicos, para cada  $k \in \{1, \dots, N\}$  se tiene que o bien  $I_k \subsetneq J_k$  o bien  $I_k \cap J_k = \emptyset$ . Si  $\exists k_0 \in \{1, \dots, N\}$  tal que  $I_{k_0} \cap J_{k_0} = \emptyset$ , entonces  $C \cap D = \emptyset$ . En caso contrario,  $C \subsetneq D$ .

### 0.2.5 Teorema de descomposición de abiertos en cubos diádicos

Para todo subconjunto no vacío y abierto en  $(\mathbb{R}^N, \tau_{R^N}(d))$ ,  $O$ , existe una colección numerable de cubos diádicos (posiblemente de órdenes distintos) de  $\mathbb{R}^N$ ,  $\{C_n : n \in \mathbb{N}\}$ , tales que:

- 1.)  $O = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} C_n$
- 2.)  $\overline{C_n} \subseteq O \quad \forall n \in \mathbb{N}$
- 3.)  $i \neq j \Rightarrow C_i \cap C_j = \emptyset$

**Demostración:** Definiremos varios conjuntos auxiliares.


Definimos  $\mathcal{G}_n := \{C \in \mathcal{F}_n : \overline{C} \subseteq O\}$ . Cada una de estas colecciones de conjuntos es finita o numerable al serlo  $\mathcal{F}_n$ .

A partir de los  $\mathcal{G}_n$  definiremos otra colección de conjuntos. Para  $n = 1$ , tomamos  $\mathcal{H}_1 := \mathcal{G}_1$ . Para  $n > 1$ , definimos

$$\mathcal{H}_n := \left\{ C \in \mathcal{G}_n : C \not\subseteq \bigcup_{k=1}^{n-1} \mathcal{H}_k \right\} = \left\{ C \in \mathcal{G}_n : C \cap \left[ \bigcup_{k=1}^{n-1} \bigcup_{D \in \mathcal{H}_k} D \right] = \emptyset \right\}$$

La última igualdad se deduce de las propiedades de los cubos diádicos. Por construcción, los  $\mathcal{H}_n$  son numerables y disjuntos entre sí. Además, por construcción, la clausura de sus cubos está contenida en  $O$ . Queda probar el punto (1).

Intuitivamente,  $\mathcal{G}_n$  modela los cubos de un cierto orden que “cabén” en  $O$ . El paso a los  $\mathcal{H}_n$  hace que solo se empiecen a usar cubos “más pequeños” en las zonas donde no “cabrían” cubos de un orden inferior (“más grandes”).





Probaremos que  $O = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{C \in \mathcal{H}_n} C$  por doble contenido.

$\supseteq$  Por definición de  $\mathcal{H}_n$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$  se tiene  $C \in \mathcal{H}_n \Rightarrow C \subsetneq \overline{C} \subsetneq O$

$\subseteq$  Sea  $x_0 \in O \subseteq \mathbb{R}^N$  cualquiera, podemos expresarlo como  $x_0 = (x_1, \dots, x_N)$ .

Al ser  $O$  abierto en  $(\mathbb{R}^N, \tau_{\mathbb{R}^N}(d))$ , existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  que verifica:

$$x_0 \in \prod_{i=1}^N \left( x_i - \frac{1}{2^{n_0}}, x_i + \frac{1}{2^{n_0}} \right) \subset \prod_{i=1}^N \left[ x_i - \frac{1}{2^{n_0}}, x_i + \frac{1}{2^{n_0}} \right] \subset O$$

Además, para cada coordenada  $1 \leq i \leq N$  tenemos que  $\exists! j_i \in \mathbb{Z} : x_i \in \left[ \frac{j_i-1}{2^{n_0}}, \frac{j_i}{2^{n_0}} \right)$ . Así, para cada  $i \in 1, \dots, N$  se tiene que:

$$\left. \begin{array}{l} \frac{j_i-1}{2^{n_0}} \leq x_i \Rightarrow \frac{j_i}{2^{n_0}} \leq x_i + \frac{1}{2^{n_0}} \\ x_i < \frac{j_i}{2^{n_0}} \Rightarrow x_i - \frac{1}{2^{n_0}} < \frac{j_i-1}{2^{n_0}} \end{array} \right\} \Rightarrow \left[ \frac{j_i-1}{2^{n_0}}, \frac{j_i}{2^{n_0}} \right) \subset \left( x_i - \frac{1}{2^{n_0}}, x_i + \frac{1}{2^{n_0}} \right)$$

De este modo,  $D_0 := \prod_{i=1}^N \left[ \frac{j_i-1}{2^{n_0}}, \frac{j_i}{2^{n_0}} \right) \subsetneq \prod_{i=1}^N \left[ x_i - \frac{1}{2^{n_0}}, x_i + \frac{1}{2^{n_0}} \right] \subsetneq O$ .

Y por tanto,  $x_0 \in D_0 \subsetneq \overline{D_0} \subsetneq O$ . A su vez, como  $D_0 \in \mathcal{G}_{n_0}$ , hemos demostrado también que el siguiente conjunto es no vacío:

$$\mathcal{A}_{x_0} := \left\{ n \in \mathbb{N} : \exists C \in \mathcal{G}_n \text{ tal que } x_0 \in C \right\}$$

Al ser  $\mathcal{A}_{x_0}$  un subconjunto no vacío de  $\mathbb{N}$ , podemos afirmar que tiene mínimo, al que denotaremos  $m_0$ . Así, ha de existir  $C_0 \in \mathcal{G}_{m_0}$  tal que  $x_0 \in C_0$ , veamos que  $C_0 \in \mathcal{H}_{m_0}$ . Por definición de  $\mathcal{H}_{m_0}$ ,  $C_0 \notin \mathcal{H}_{m_0} \Rightarrow C_0 \in \mathcal{G}_n$  para cierto  $n < m_0$ . Esto contradice que  $m_0$  sea el mínimo de  $\mathcal{A}_{x_0}$ . Hemos demostrado que  $C_0 \in \mathcal{H}_{m_0}$ .

## §3. Series dobles

El álgebra contempla únicamente la suma como operación binaria. Por la propiedad asociativa, es posible expresar cualquier suma finita como sumas binarias sucesivas. Para No obstante, el álgebra por sí misma no nos basta para sumar series.

### 0.3.1 Definición de sucesión doble

Llamamos “sucesión doble” a cualquier aplicación

$$\begin{aligned}\gamma : \mathbb{N} \times \mathbb{N} &\longrightarrow \overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty - \infty\} \\ n, m &\longmapsto \gamma(n, m) = a_{nm}\end{aligned}$$

Diremos que  $a_{nm}$  es el término general de la sucesión.

### 0.3.2 Definición de serie doble

Dada una sucesión doble de término general  $a_{nm}$ , llamamos “serie doble de término general  $a_{nm}$ ” a la expresión  $\sum_{n,m} a_{nm}$  (que equivale a  $\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} a_{nm}$ ).

Diremos que  $\sum_{n,m} a_{nm}$  es convergente si sus sumas parciales convergen a un número real. Es decir, si:  $\exists s \in \mathbb{R}$  que verifica:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ tal que } n, m \geq n_0 \Rightarrow \left| s - \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} a_{ij} \right| < \varepsilon$$

En este caso, diremos que este  $s$  es el “valor de la suma de la serie”.

Diremos que  $\sum_{n,m} a_{nm}$  es divergente a  $+\infty(-\infty)$  si  $\forall \in \mathbb{R} \quad \exists n_0 \in \mathbb{N}$  tal que dados  $n, m \geq n_0$  se cumple:

$$\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} a_{ij} > K \quad \left( \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} a_{ij} < K \right)$$

En este caso, diremos que el valor de la suma de la sucesión es  $+\infty(-\infty)$ .

Es importante distinguir la igualdad de series como sucesiones y como valores. Veamos un ejemplo con series simples:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 1 + 0 + 0 + 0 + \dots \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots$$

Es claro que las series no tienen el mismo término general (no son iguales como series), pero sí tienen el mismo valor de suma (que es 1).

### 0.3.3 Teorema de series dobles no negativas

Dada una sucesión doble  $\gamma : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \longrightarrow [0, +\infty]$  de término general  $a_{nm}$ , dada una biyección cualquiera  $g : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ , se cumple:

$$\sum_{n,m} a_{nm} = \sum_{n=1}^{\infty} a_{g(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} a_{nm} = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} a_{nm} \in [0, +\infty]$$

**Demostración:** Probaremos primero la igualdad respecto de la reordenación y después respecto de las series anidadas.

Si existe algún término  $a_{n_0 m_0} = +\infty$ , entonces la igualdad se cumple trivialmente al estar las sumas bien definidas ( $\gamma(\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \subseteq [0, +\infty]$ ). Supongamos entonces que todos los términos son finitos, veamos qué casos pueden darse:

- Primer caso: Supongamos que  $\sum_{n=1}^{\infty} a_{g(n)} = s \in \mathbb{R}$ .

Por definición,  $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} : s - \sum_{k=1}^n a_{g(k)} < \varepsilon \quad \forall n \geq n_0$ . Sea  $\varepsilon > 0$  cualquiera pero fijo, fijamos también el  $n_0$  asociado. Como  $g$  es biyectiva,  $\exists m_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $g(\{1, \dots, n_0\}) \subseteq \{1, \dots, m_0\} \times \{1, \dots, m_0\}$ . Al tratarse de series de términos no negativos, dados  $n, m \in \mathbb{N}$  con  $n \geq n_0, m \geq m_0$ , se cumple:

$$\sum_{k=1}^{n_0} a_{g(k)} \leq \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} a_{ij} \Rightarrow 0 \leq s - \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} a_{ij} \leq s - \sum_{k=1}^{n_0} a_{g(k)} < \varepsilon$$

(\*) La desigualdad se deduce de que la suma parcial de la serie doble es una reor-

denación de la suma parcial de la serie simple, siendo esta última absolutamente convergente. Como podemos hacer  $\varepsilon$  arbitrariamente pequeño, concluimos que las dos series tienen el mismo límite.

- Segundo caso:  $\sum_{n=1}^{\infty} a_{g(n)} = +\infty$ .

Sea  $K \in \mathbb{R}$ , por definición,  $\exists n_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $\sum_{k=1}^n a_{g(k)} > K \ \forall n \geq n_0$ . AL ser  $g$  biyectiva,  $\exists m_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $g(1, \dots, n_0) \subseteq \{1, \dots, m_0\} \times \{1, \dots, m_0\}$ . Así, dados  $n \geq m_0, m \geq m_0$  se tiene:

$$K < \sum_{k=1}^{n_0} a_{g(k)} \leq \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} a_{ij}$$

Es claro que la serie doble diverge a  $+\infty$ .

Queda probar la igualdad entre la serie doble y las series anidadas cuando todos los términos son finitos. Veamos qué ocurre según el carácter de la serie doble.

- Primer caso:  $\sum_{n,m} a_{nm} = s \in [0, +\infty)$ .

Sea  $\varepsilon > 0$ . Por definición de convergencia, sabemos que  $\exists n_0 \in \mathbb{N}$  tal que dados  $n \geq n_0, m \geq n_0$  se tiene:

$$\left| s - \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} a_{ij} \right| < \varepsilon$$

Nótese que debido a las propiedades algebraicas de la suma, en el caso finito se da la igualdad; es decir:

$$\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} a_{ij} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij} = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n a_{ij}$$

De este modo, sustituyendo en la definición de convergencia, dados  $n \geq n_0, m \geq n_0$  obtenemos:

$$\left| s - \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n a_{ij} \right| < \varepsilon \Rightarrow \varepsilon \geq \lim_n \left| s - \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n a_{ij} \right| = \left| s - \sum_{j=1}^m \lim_n \left( \sum_{i=1}^n a_{ij} \right) \right|$$

La igualdad se debe a aplicar las propiedades del límite con funciones continuas.

Como la serie doble converge por hipótesis, también han de hacerlo las series de filas y columnas. Es por ello que podemos afirmar que el último límite existe.

La igualdad anterior se cumple para cualquier  $\varepsilon > 0$  y para cualquier  $m \geq n_0$ . Haciendo  $\varepsilon$  arbitrariamente pequeño y tomando límites en  $m$  llegamos al resultado. El razonamiento para la otra serie anidada es análogo; así, concluimos:

$$\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} a_{nm} = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} a_{nm} = \sum_{n,m} a_{nm}$$

• Segundo caso:  $\sum_{n,m} a_{nm} = +\infty$ . Si hubiese algún  $n \in \mathbb{N}$  verificando  $\sum_{m=1}^{\infty} a_{nm} = +\infty$  o si existiese algún  $m \in \mathbb{N}$  tal que  $\sum_{n=1}^{\infty} a_{nm} = +\infty$ , las series anidadas divergerían trivialmente. Supongamos que no es el caso para ver que también se cumple el resultado.

Sea  $K \in \mathbb{R}$  cualquiera, por definición de divergencia se cumple:

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ tal que } \forall n \geq n_0, \forall m \geq n_0 \text{ se cumple } \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n a_{ij} > K$$

Nótese que hemos utilizado la igualdad entre la serie doble y las series anidadas para el caso finito. Además, dados  $n \geq n_0, m \geq n_0$ , se cumple:

$$\sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n a_{ij} > K \Rightarrow K \leq \lim_n \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n a_{ij} = \sum_{j=1}^m \left( \sum_{i=1}^{\infty} a_{ij} \right)$$

Las series de suma de filas y columnas existen por hipótesis, luego la igualdad se cumple para todo  $m \geq n_0$ . Tomando límites en  $m$  podemos observar que  $\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} a_{nm} \geq K$ . Como el  $K$  escogido fue arbitrario, se cumple para cualquier  $K$  real. Así, las series anidadas divergen a  $+\infty$  (análogo para la otra serie anidada).

# I Teoría de la medida

## §1. Espacios de medida

### 1.1.1 Definición de $\sigma$ -álgebra

Sea  $X$  un conjunto cualquiera, diremos que  $\Sigma \subseteq \mathcal{P}(X)$  es una  $\sigma$ -álgebra si cumple las siguientes propiedades:

$$\text{S.1)} \quad \emptyset \in \Sigma$$

$$\text{S.2)} \quad \{E_i : i \in \mathbb{N}\} \subseteq \Sigma \Rightarrow \bigcup_{i \in \mathbb{N}} E_i \in \Sigma$$

$$\text{S.3)} \quad E \in \Sigma \Rightarrow E^c := X \setminus E \in \Sigma$$

Nótese que no es necesario exigir que  $X$  tenga ningún tipo de estructura (ni topológica, ni algebraica...).

### 1.1.2 Propiedades de las $\sigma$ -álgebras

Sea  $X$  un conjunto, sea  $\Sigma$  una  $\sigma$ -álgebra de  $X$ . Sea  $\{E_i : i \in \mathbb{N}\} \subseteq \Sigma$ , y  $E, F \in \Sigma$ . Entonces, se cumple:

$$\text{i)} \quad \bigcap_{i \in \mathbb{N}} E_i \in \Sigma$$

$$\text{ii)} \quad E \cup F \in \Sigma$$

$$\text{iii)} \quad E \cap F \in \Sigma$$

$$\text{iv)} \quad E \setminus F \in \Sigma$$

#### **Demostración:**

i) Por la propiedad (S.3) y la involución del complementario, un conjunto pertenece a una  $\sigma$ -álgebra si y solo si su complementario pertenece a ella. Por tanto, basta ver que:  $X \setminus \left(\bigcap_{i \in \mathbb{N}} E_i\right) = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} (X \setminus E_i) \in \Sigma$ .

Por la propiedad (S.3), para cada  $i \in \mathbb{N}$  tenemos que  $X \setminus E_i \in \Sigma$ , pues  $E_i \in \Sigma$  por hipótesis. Finalmente, aplicando (S.1) tenemos que su unión numerable se encuentra en  $\Sigma$ .

*ii)* Reescribiremos  $E \cup F$  para hacer uso del resultado que acabamos de probar. Por (S.1) sabemos que  $\emptyset \in \Sigma$  luego podemos considerar la colección numerable de conjuntos de  $\Sigma$ ,  $\{A_i : i \in \mathbb{N}\}$  donde  $A_1 = E$ ,  $A_2 = F$ , y  $A_n = \emptyset \ \forall n > 2$ .

De este modo,  $E \cup F = E \cup F \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \dots = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \in \Sigma$ .

*iii)* Como consecuencia de (S.1) y de (S.3), sabemos que  $X \in \Sigma$ . Así, basta considerar  $B_1 = E$ ,  $B_2 = F$ ,  $B_n = X \ \forall n > 2$ .

Aplicando el apartado (i),  $E \cap F = E \cap F \cap X \cap X \cap \dots = \bigcap_{i \in \mathbb{N}} B_i \in \Sigma$ .

*iv)* Por definición de complementario,  $E \setminus F = E \cap (X \setminus F)$ . Por hipótesis,  $E, F \in \Sigma$ . Aplicando (S.3),  $(X \setminus F) \in \Sigma$ . Finalmente, aplicando el apartado (iii),  $E \cap (X \setminus F) \in \Sigma$ .

### 1.1.3 Definición de espacio de medida

Sea  $X$  un conjunto cualquiera y  $\Sigma$  una  $\sigma$ -álgebra de  $X$ , diremos que  $\mu : \Sigma \longrightarrow [0, +\infty]$  es una medida sobre  $\Sigma$  si verifica las siguientes propiedades:

M.1)  $\mu(\emptyset) = 0$

M.2) Sean  $\{E_i : i \in \mathbb{N}\} \subseteq \Sigma$  tales que  $i \neq j \Rightarrow E_i \cap E_j = \emptyset$ ; entonces,

$$\mu \left( \bigcup_{i \in \mathbb{N}} E_i \right) = \sum_{i \in \mathbb{N}} \mu(E_i)$$

A la tríada  $(X, \Sigma, \mu)$  se la denomina “espacio de medida”, y a los conjuntos de  $\Sigma$  se los llama “conjuntos ( $\mu$ -medibles) de  $X$ ”.

### 1.1.4 Propiedades de los espacios de medida

Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida, se cumple:

i) Sean  $E, F \in \Sigma$  con  $F \subseteq E$ , se cumple  $\mu(F) \leq \mu(E)$ .

Si además se tiene que  $\mu(F) < +\infty$ , entonces  $\mu(E \setminus F) = \mu(E) - \mu(F)$ .

ii) Sean  $\{E_i : i \in \mathbb{N}\} \subseteq \Sigma$  tales que  $E_i \subseteq E_{i+1} \ \forall i \in \mathbb{N}$ .

Entonces,  $\mu(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} E_i) = \lim_n \mu(E_n)$ .

iii) Sean  $\{E_i : i \in \mathbb{N}\} \subseteq \Sigma$  tales que  $E_{i+1} \subseteq E_i \ \forall i \in \mathbb{N}$ , y  $\mu(E_1) < +\infty$ .

Entonces,  $\mu(\bigcap_{i \in \mathbb{N}} E_i) = \lim_n \mu(E_n)$ .

#### Demostración:

i) Reescribiendo como unión numerable de conjuntos disjuntos de  $\Sigma$ ,

$$E = (E \setminus F) \cup F \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \dots$$

Aplicando (M.3) y evaluando  $\mu$  a ambos lados obtenemos:

$$\mu(E) = \mu(E \setminus F) + \mu(F) + \mu(\emptyset) + \mu(\emptyset) + \dots$$

Aplicando (M.1) se deduce que  $\mu(E) = \mu(E \setminus F) + \mu(F)$ . Por la no negatividad de  $\mu$ , se tiene que  $\mu(E \setminus F) \geq 0 \Rightarrow \mu(F) \leq \mu(E)$ .

Si además  $\mu(F) < +\infty$ , podemos despejar sin que ocurran indeterminaciones; así,  $\mu(E \setminus F) = \mu(E) - \mu(F)$ .

ii) Una vez más, reescribimos el conjunto a partir de uniones disjuntas:

$$\bigcup_{i \in \mathbb{N}} E_i = E_1 \cup (E_2 \setminus E_1) \cup (E_3 \setminus (E_2 \cup E_1)) \cup (E_4 \setminus (E_1 \cup E_2 \cup E_3)) \cup \dots$$

Como  $E_i \subseteq E_{i+1}$  por hipótesis, podemos simplificar esta expresión:

$$\bigcup_{i \in \mathbb{N}} E_i = E_1 \cup (E_2 \setminus E_1) \cup (E_3 \setminus E_2) \cup (E_4 \setminus E_3) \cup \dots = E_1 \cup \left( \bigcup_{i \in \mathbb{N}} (E_{i+1} \setminus E_i) \right)$$

$$\text{Así, } \mu\left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} E_i\right) = \mu(E_1) + \sum_{i=2}^{\infty} \mu(E_i \setminus E_{i-1}) = (*).$$



Distinguimos dos casos en función de la medida de los  $E_i$ :

*ii.a)* Existe cierto  $j \in \mathbb{N}$  tal que  $\mu(E_j) = +\infty$ . Como  $E_j \subseteq E_n \forall n \geq j$ , aplicando las propiedad (i) de la medida, se tiene que  $\mu(E_n) = +\infty \forall n \geq j$ , luego ha de cumplirse  $\lim_n \mu(E_n) = +\infty$ . Por otro lado, como  $E_j \subseteq \bigcup_{i \in \mathbb{N}} E_i$ , se tiene que  $+\infty = \mu(E_j) \leq \mu(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} E_i)$ , luego,  $\lim_n \mu(E_n) = \mu(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} E_i) = +\infty$ .

*ii.b)* En caso contrario al anterior,  $\mu(E_i) < +\infty \forall i \in \mathbb{N}$ . Desarrollando en (\*),

$$\begin{aligned} \mu\left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} E_i\right) &= \mu(E_1) + \sum_{i=2}^{\infty} \mu(E_i \setminus E_{i-1}) = \mu(1) + \lim_n \sum_{i=2}^n \mu(E_i \setminus E_{i-1}) = \\ &= \lim_n \left( \mu(E_1) + \mu(E_2 \setminus E_1) + \mu(E_3 \setminus E_2) + \dots + \mu(E_n \setminus E_{n-1}) \right) = \\ &= \lim_n \left( \mu(E_1) + (\mu(E_2) - \mu(E_1)) + \dots + (\mu(E_n) - \mu(E_{n-1})) \right) = \\ &= \lim_n \mu(E_n) \end{aligned}$$

Hemos podido simplificar porque todas las medidas son finitas; de lo contrario, podrían producirse indeterminaciones.

*iii)* Por hipótesis,  $E_{i+1} \subseteq E_i \forall i \in \mathbb{N}$ , y  $\mu(E_1) < +\infty$ . De este modo, como todos los  $E_i$  son subconjuntos de  $E_1$  han de tener medida finita también (propiedad (i) de la medida). Expresamos la intersección según el complementario respecto de  $E_1$  como sigue:  $E_1 \setminus \left(\bigcap_{i \in \mathbb{N}} E_i\right) = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} (E_1 \setminus E_i)$ .

Por hipótesis,  $E_{i+1} \subseteq E_i \Rightarrow (E_1 \setminus E_i) \subseteq (E_1 \setminus E_{i+1})$ . Como consecuencia, aplicando los apartados anteriores de este resultado,

$$\begin{aligned} \mu(E_1) - \mu\left(\bigcap_{i \in \mathbb{N}} E_i\right) &= \mu\left(E_1 \setminus \left(\bigcap_{i \in \mathbb{N}} E_i\right)\right) = \mu\left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} (E_1 \setminus E_i)\right) = \\ &= \lim_n \mu(E_1 \setminus E_n) = \mu(E_1) - \lim_n \mu(E_n) \end{aligned}$$

Como todas las medidas son finitas, podemos despejar sin indeterminaciones:

$$\mu\left(\bigcap_{i \in \mathbb{N}} E_i\right) = \lim_n \mu(E_n)$$

### 1.1.5 Espacio de medida inducido

Dado un espacio de medida  $(X, \Sigma, \mu)$ . Sea  $A \in \Sigma$  cualquiera, definimos la siguiente colección  $\Sigma(A) := \{B \cap A : B \in \Sigma\}$ . Entonces,  $(A, \Sigma(A), \mu|_{\Sigma(A)})$  es un espacio de medida.

**Demostración:** Comencemos comprobando que  $\Sigma(A)$  es en efecto una  $\sigma$ -álgebra.

(S.1) Por ser  $\Sigma$  una  $\sigma$ -álgebra,  $\emptyset \in \Sigma$ . Así, basta tomar  $B = \emptyset$ . De este modo,  $\emptyset = A \cap \emptyset \in \Sigma(A)$ .

(S.2) Sean  $\{E_i : i \in \mathbb{N}\} \subseteq \Sigma(A)$ , busquemos  $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} E_i \in \Sigma(A)$ . Por definición de  $\Sigma(A)$ , cada  $E_i$  será de la forma  $A \cap F_i$  con  $F_i \in \Sigma$ . Así, se tiene:

$$\bigcup_{i \in \mathbb{N}} E_i = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A \cap F_i = A \cap \left( \bigcup_{i \in \mathbb{N}} F_i \right) \in \Sigma(A)$$

Consideramos  $B = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} F_i \in \Sigma$  al aplicar (S.2) en  $\Sigma$ .

(S.3) Sea  $E \in \Sigma(A)$ , busquemos  $A \setminus E \in \Sigma(A)$ . Por definición de  $\Sigma(A)$ , podemos afirmar que  $E = A \cap B$  para cierto  $B \in \Sigma$ . Aplicando (S.3), por ser  $\Sigma$  una  $\sigma$ -álgebra de  $X$ ,  $B \in \Sigma \Rightarrow X \setminus B \in \Sigma$ . Así,  $A \setminus E = A \cap (X \setminus B) \in \Sigma(A)$ .

Queda ver que  $\mu|_{\Sigma(A)}$  es una medida. Como  $\Sigma(A) \subseteq \Sigma$ , las propiedades de  $\mu$  se trasladan trivialmente a  $\mu|_{\Sigma(A)}$ .

**Nota:** Para definir una  $\sigma$ -álgebra inducida basta tomar  $A \subseteq X$  cualquiera. No obstante, para que  $\mu|_{\Sigma(A)}$  sea una medida, necesitamos que  $\Sigma(A) \subseteq \Sigma$ , y para ello es necesario exigir  $A \in \Sigma$ .

### 1.1.6 Medida de contar

Veamos dos ejemplos de espacios de medida:

- $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), m)$  donde  $m$  es la “medida de contar” y se define como

$$m(A) = \begin{cases} \text{card } A & \text{si } A \text{ es finito} \\ +\infty & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- $(\mathbb{R}, \mathcal{P}(\mathbb{R}), \mu)$  donde  $\mu(B) = m(B \cap \mathbb{N})$ .

Al ser el conjunto de partes una  $\sigma$ -álgebra trivialmente, basta ver que las medidas cumplen (M.1) y (M.2), lo que es evidente en vista de su definición.

En este tema buscamos establecer una medida en  $\mathbb{R}^N$  basada en la longitud de los intervalos. Hemos de definir adecuadamente la  $\sigma$ -álgebra asociada, pues ha de incluir a todos los intervalos (y por tanto a todos los abiertos) y a sus complementarios (luego todos los cerrados). Sin embargo, como veremos más adelante, no es posible tomar simplemente  $\mathcal{P}(\mathbb{R}^N)$ .

### 1.1.7 Subaditividad en espacios de medida

Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida, sean  $\{E_i : i \in \mathbb{N}\} \subseteq \Sigma$ . Entonces, se cumple:

$$\mu\left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} E_i\right) \leq \sum_{i \in \mathbb{N}} \mu(E_i)$$

**Demostración:** Expresaremos  $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} E_i$  como unión de conjuntos disjuntos.

Definimos  $F_1 := E_1 \in \Sigma$ . Para todo  $n \in \mathbb{N}$ ,  $E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_n \in \Sigma$ . Así,  $F_{n+1} := E_{n+1} \setminus (E_1 \cup \dots \cup E_n) \in \Sigma$ . Veamos que  $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} F_i = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} E_i$  por doble contenido.

$$\left[ \begin{array}{l} \subseteq \end{array} \right] \quad \forall i \in \mathbb{N}, F_i \subseteq E_i \Rightarrow \bigcup_{i \in \mathbb{N}} F_i \subseteq \bigcup_{i \in \mathbb{N}} E_i.$$

$\supseteq$  Sea  $x_0 \in \bigcup_{i \in \mathbb{N}} E_i$ ; por definición,  $\exists i_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $x_0 \in E_{i_0}$ .

Por tanto, el siguiente conjunto  $\mathcal{A}_{x_0}$  es no vacío:  $\mathcal{A}_{x_0} := \{n \in \mathbb{N} : x_0 \in E_n\} \subseteq \mathbb{N}$ . Al ser un subconjunto no vacío de  $\mathbb{N}$ , podemos afirmar que existe  $m_0 := \min \mathcal{A}_{x_0}$ . Por definición de  $\mathcal{A}_{x_0}$

$$\left. \begin{array}{l} x_0 \in E_{m_0} \\ x_0 \notin E_i \quad \forall i < m_0 \end{array} \right\} \Rightarrow x_0 \in F_{m_0} \subseteq \bigcup_{i \in \mathbb{N}} F_i$$

Volviendo al problema de la subaditividad, se cumple:

$$\mu\left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} E_i\right) = \mu\left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} F_i\right) = \mu(F_1) + \mu(F_2) + \dots \leq \mu(E_1) + \mu(E_2) + \dots = \sum_{i \in \mathbb{N}} \mu(E_i)$$

La desigualdad se debe a que  $\forall i \in \mathbb{N}, F_i \subseteq E_i \Rightarrow \mu(F_i) \leq \mu(E_i)$ .

### 1.1.8 Definición de espacio de medida completo

Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida, diremos que es un “completo” (o que  $\Sigma$  es completo respecto de  $\mu$ ) si se cumple:

$$\forall B \in \Sigma \text{ con } \mu(B) = 0, \quad \forall A \subseteq B \text{ se tiene que } A \in \Sigma \text{ y por tanto } \mu(A) = 0$$

### 1.1.9 Compleción de un espacio de medida

Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida cualquiera. Existe una  $\sigma$ -álgebra  $\tilde{\Sigma}$  de  $X$  con  $\Sigma \subseteq \tilde{\Sigma}$ . y una medida  $\tilde{\mu}$  sobre  $\tilde{\Sigma}$  tales que  $\tilde{\mu}|_{\Sigma} = \mu$  y  $(X, \tilde{\Sigma}, \tilde{\mu})$  es completo.

De hecho, podemos hallar  $\tilde{\Sigma}$  y  $\tilde{\mu}$  para que  $(X, \tilde{\Sigma}, \tilde{\mu})$  sea el menor espacio completo que contiene a  $(X, \Sigma, \mu)$ . Es decir, sea  $(X, \Omega, \nu)$  un espacio de medida completo tal que  $\Sigma \subseteq \Omega$  y  $\nu|_{\Sigma} = \mu$ ; entonces,  $\tilde{\Sigma} \subseteq \Omega$ .

En tal caso, diremos que  $(X, \tilde{\Sigma}, \tilde{\mu})$  es la “compleción de  $(X, \Sigma, \mu)$ ”.

**Demostración:** Definiremos el siguiente conjunto auxiliar:

$$\mathcal{N} := \{N \in \mathcal{P}(X) : \exists B \in \Sigma \text{ tal que } N \subseteq B \text{ y } \mu(B) = 0\}$$

Intuitivamente,  $\mathcal{N}$  contiene todos los conjuntos que podrían faltarle a  $\Sigma$  para que  $(X, \Sigma, \mu)$  fuese un espacio de medida completo. Veamos cómo expandir  $\Sigma$  incluyendo estos conjuntos sin introducir otros nuevos que necesitemos completar.

Basta considerar la siguiente definición de  $\tilde{\Sigma}$ :

$$\tilde{\Sigma} := \{A \cup N : A \in \Sigma, N \in \mathcal{N}\}$$

Para verificar que  $\tilde{\Sigma}$  cumple las propiedades que deseamos, introduciremos la siguiente observación: Sean  $A \in \Sigma, N \in \mathcal{N}$ . Existen  $N_0 \in \mathcal{N}, M \in \Sigma$  tales que:

$$A \cup N = A \cup N_0 \quad N_0 \subseteq M \quad \mu(M) = 0 \quad A \cap M = \emptyset$$

Veamos la demostración:

Al considerar  $N_0 := N \setminus A$  es claro que  $A \cup N = A \cup (N \setminus A) = A \cup N_0$ .

Como  $N \in \mathcal{N}$ , se tiene que  $\exists B \in \Sigma$  con  $N \subseteq B$  y  $\mu(B) = 0$ .

Así, tomando  $M := B \setminus A \in \Sigma$  se cumple  $A \cap M = \emptyset$ .

Además,  $N \subseteq B \Rightarrow N_0 = N \setminus A \subseteq B \setminus A = M$ .

Finalmente,  $M \subseteq B \Rightarrow 0 \leq \mu(M) \leq \mu(B) = 0 \Rightarrow \mu(M) = 0$ .

Comprobemos ahora que  $\tilde{\Sigma}$  es en efecto una  $\sigma$ -álgebra de  $X$ .

(S.1) Buscamos  $\emptyset \in \tilde{\Sigma}$

Para ello hay que expresar  $\emptyset = A \cup N$  con  $A \in \Sigma, N \in \mathcal{N}$ .

Tenemos que  $\emptyset \in \Sigma$  por ser  $\Sigma$  una  $\sigma$ -álgebra.

Además,  $\emptyset \subseteq \emptyset$  con  $\emptyset \in \Sigma$  y  $\mu(\emptyset) = 0$ .

Por tanto, tenemos que  $\emptyset \in \mathcal{N}$  al tomar  $B = \emptyset$  en la definición de  $\mathcal{N}$ .

Así, tomando  $A = N = \emptyset$ ,  $\emptyset = A \cup N = \emptyset \cup \emptyset \in \tilde{\Sigma}$ .

(S.2) Sean  $\{E_i : i \in \mathbb{N}\} \subseteq \tilde{\Sigma}$ , buscamos  $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} E_i \in \tilde{\Sigma}$ .

Por definición de  $\tilde{\Sigma}$ ,  $\forall j \in \mathbb{N} : E_j = A_j \cup N_j$  con  $A_j \in \Sigma, N_j \in \mathcal{N}$ .

Entonces,  $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} E_i = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} (A_i \cup N_i) = \left( \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \right) \cup \left( \bigcup_{i \in \mathbb{N}} N_i \right)$ .

Se tiene  $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \in \Sigma$ . Queda ver  $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} N_i \in \mathcal{N}$  para llegar al resultado.

Por definición de  $\mathcal{N}$ ,  $\forall j \in \mathbb{N} : \exists B_j \in \Sigma$  con  $N_j \subseteq B_j$  y  $\mu(B_j) = 0$ .

Así,  $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} N_i \subseteq \bigcup_{i \in \mathbb{N}} M_i$  y  $0 \leq \mu(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} B_i) \leq \sum_{i \in \mathbb{N}} \mu(B_i) = 0$  por subaditividad.

Por todo lo anterior,  $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} N_i \in \mathcal{N} \Rightarrow \bigcup_{i \in \mathbb{N}} E_i \in \tilde{\Sigma}$ .

(S.3) Sea  $E \in \tilde{\Sigma}$ , busquemos  $E^c = X \setminus E \in \tilde{\Sigma}$ .

Razonando como antes,  $E = A \cup N$  con  $A \in \Sigma, N \in \mathcal{N}$ .

Por la observación anterior, sabemos que:  $\exists M \in \Sigma, N_0 \in \mathcal{N}$  tales que:

$$E = A \cup N = A \cup N_0 \quad N_0 \subseteq M \quad M \cap A = \emptyset \quad \mu(M) = 0$$

Así,  $E = A \cup N_0 = A \cup (M \cap N_0) = (A \cup M) \cap (A \cup N_0)$ .

Aplicando las leyes de De Morgan,  $E^c = (A \cup M)^c \cup (A \cup N_0)^c$ .

Centrándonos en este segundo término, como  $N_0 \subseteq M$ , se tiene:

$$\begin{aligned} (A \cup N_0)^c &= A^c \cap N_0^c = A^c \cap ((M \setminus N) \cup M^c) = \\ &= (A^c \cap (M \setminus N_0)) \cup (A^c \cap M^c) = (M \setminus N_0) \cup (A \cup M)^c \end{aligned}$$

De este modo,  $E^c = (A \cup M)^c \cup (M \setminus N_0)$ .

Como  $(A \cup M)^c \in \Sigma$ , y  $(M \setminus N_0) \in \mathcal{N}$ , se tiene que  $E^c \in \tilde{\Sigma}$ .

Veamos ahora cómo extender  $\mu$  a  $\tilde{\mu}$  para que abarque  $\tilde{\Sigma}$ .

$$\tilde{\mu} : \tilde{\Sigma} \longrightarrow [0, +\infty] \quad E \longmapsto \tilde{\mu}(E) := \mu(A) \text{ donde } E = A \cup N \text{ con } A \in \Sigma, N \in \mathcal{N}$$

Veamos en primer lugar que  $\tilde{\mu}$  está bien definida. Es decir, un mismo conjunto  $E \in \tilde{\Sigma}$  tiene siempre la misma medida sin importar la descomposición que consideremos. Sea  $E = A_1 \cup N_1 = A_2 \cup N_2 \in \tilde{\Sigma}$  con  $A_1, A_2 \in \Sigma, N_1, N_2 \in \mathcal{N}$ , busquemos comprobar que  $\mu(A_1) = \mu(A_2)$ .

Para cada  $i = 1, 2$   $N_i \in \mathcal{N} \Rightarrow \exists B_i \in \Sigma$  tal que  $N_i \subseteq B_i$  y  $\mu(B_i) = 0$ .

Así,  $A_1 \subseteq A_1 \cup N_1 = A_2 \cup N_2 \subseteq A_2 \cup B_2$ .

Por tanto,  $\mu(A_1) \leq \mu(A_2 \cup B_2) \leq \mu(A_2) + \mu(B_2) = \mu(A_2)$ .

Análogamente,  $\mu(A_2) \leq \mu(A_1)$  luego  $\mu(A_1) = \mu(A_2)$ .

Veamos ahora que  $\tilde{\mu}$  es en efecto una medida.

(M.1) Buscamos  $\tilde{\mu}(\emptyset) = 0$ .

Basta ver tomar  $A = N = \emptyset$  en la definición de  $\tilde{\Sigma}$ .

Aplicando (M.1) en  $\mu$ ,  $\tilde{\mu}(\emptyset) = \mu(\emptyset) = 0$ .

(M.2) Sean  $\{E_i : i \in \mathbb{N}\} \subseteq \tilde{\Sigma}$  disjuntos, buscamos  $\tilde{\mu}(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} E_i) = \sum_{i \in \mathbb{N}} \tilde{\mu}E_i$ .

Para cada  $i \in \mathbb{N}$ , existen  $A_i \in \Sigma$ ,  $N_i \in \mathcal{N}$  tales que  $E_i = A_i \cup N_i$ .

Así, aplicando la definición de  $\tilde{\mu}$  y aplicando (M.2) en  $\mu$ ,

$$\tilde{\mu}(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} E_i) = \tilde{\mu}(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \cup N_i) = \mu(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i) = \sum_{i \in \mathbb{N}} \mu(A_i) = \sum_{i \in \mathbb{N}} \tilde{\mu}(E_i)$$

Es claro que  $\tilde{\mu}|_{\Sigma} = \mu$  pues se cumple:

$$A \in \Sigma \Rightarrow A = A \cup \emptyset \text{ con } \mu(\emptyset) = 0 \text{ luego } \tilde{\mu}(A) = \mu(A)$$

Comprobemos ahora que  $(X, \tilde{\Sigma}, \tilde{\mu})$  es un espacio de medida completo. Sean  $E \subseteq F \in \tilde{\Sigma}$  con  $\tilde{\mu}(F) = 0$ , buscamos  $E \in \tilde{\Sigma}$ .

Por definición,  $F = A \cup N$  para ciertos  $A \in \Sigma, N \in \mathcal{N}$ .

Además,  $N \in \mathcal{N} \Rightarrow \exists B \in \Sigma$  tal que  $N \subseteq B$  y  $\mu(B) = 0$ .

Por hipótesis,  $\tilde{\mu}(F) := \mu(A) = 0$ .

Así,  $E \subseteq F = A \cup N \subseteq A \cup B$ , y  $\mu(A \cup B) \leq \mu(A) + \mu(B) = 0$ .

Por tanto,  $E \in \mathcal{N} \subseteq \tilde{\Sigma}$ .

Por último, queda comprobar que la compleción es el mínimo espacio de medida completo que contiene al original. Sea  $(X, \Omega, \nu)$  un espacio de medida completo tal que  $\Sigma \subseteq \Omega$  y  $\nu|_{\Sigma} = \mu$ . Entonces,  $\tilde{\Sigma} \subseteq \Omega$ .

Por ser  $(X, \Omega, \nu)$  completo,  $\mathcal{N} \subseteq \Omega$ .

Además,  $\Sigma \subseteq \Omega$  por hipótesis.

De este modo, se cumple:

$$\left. \begin{array}{l} A \in \Sigma \\ N \in \mathcal{N} \end{array} \right\} A \cup N \in \Omega \text{ aplicando (S.2) en } \Omega$$

Concluimos que  $\tilde{\Sigma} \subseteq \Omega$ .

Hemos demostrado que se cumplen todas las hipótesis.

## §2. El espacio de medida de Lebesgue $(\mathbb{R}^N, \mathfrak{M}_N, \mu_N)$

### 1.2.1 Definiciones de intervalos y cubos

Llamaremos “intervalo degenerado” a cualquier conjunto vacío o unitario (unipuntual). Por ejemplo  $\emptyset = (2, -1 =)$ ,  $\{a\} = [a, a] \ \forall a \in \mathbb{R}$ .

Denominamos “cubo de  $\mathbb{R}^N$ ” a cualquier conjunto  $C = I_1 \times \dots \times I_N$  donde  $I_i$  es un intervalo  $\forall i \in \{1, \dots, N\}$ . Si al menos uno de los intervalos que forman el cubo es degenerado, diremos que es un “cubo degenerado de  $\mathbb{R}^N$ ”.

### 1.2.2 Definición del volumen de un cubo

Sea  $C = I_1 \times \dots \times I_N$  un cubo de  $\mathbb{R}^N$  con  $a_j, b_j \in \overline{\mathbb{R}}$  los extremos de cada intervalo  $I_j$ . Llamaremos “volumen de  $C$ ” a su imagen por la siguiente función:

$$v_N(C) := \begin{cases} 0 & \text{si } C \text{ es degenerado} \\ \prod_{i=1}^N |b_i - a_i| & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

### 1.2.3 Definición de medida exterior

Sea  $A$  un subconjunto cualquiera de  $\mathbb{R}^N$ , se define su medida exterior como el número dado por:

$$\mu_N^*(A) := \inf \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} v_N(I_i) : \{I_i : i \in \mathbb{N}\} \text{ cubos abiertos que recubren } A \right\} \in [0, +\infty]$$

Donde  $v_N$  es la el volumen de los cubos anterior.

**Nota:** A pesar de su nombre, la medida exterior no es una medida.



### 1.2.4 Corolario de la definición anterior

Sea  $A$  un conjunto cualquiera, introducimos la siguiente notación:

$$\mathcal{M}(A) := \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} v_N(I_i) : \{I_i : i \in \mathbb{N}\} \text{ cubos abiertos que recubren } A \right\}$$

Por definición,  $\mu_N^*(A) := \inf \mathcal{M}(A)$ . Así, sean  $\{I_i : i \in \mathbb{N}\}$  cubos abiertos tales que  $A \subseteq \bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$ ; entonces  $\sum_{i=1}^{\infty} v_N(I_i) \in \mathcal{M}(A)$  luego  $\mu_N^*(A) \leq \sum_{i=1}^{\infty} v_N(I_i)$  por definición de ínfimo.

De manera similar, sea  $\varepsilon > 0$ , si  $\mu_N^*(A) < \infty$ , podemos encontrar  $\{I_i : i \in \mathbb{N}\}$  cubos abiertos con  $A \subseteq \bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$  tales que  $\sum_{i=1}^{\infty} v_N(I_i) < \mu_N^*(A) + \varepsilon$ . De no ser así, se contradiría la definición de ínfimo. Si  $\mu_N^*(A) = +\infty$ , la desigualdad ha de ser no estricta.

### 1.2.5 Ejemplos básicos de medida exterior

i)  $\mu_N^*(\emptyset) = 0$  pues  $\emptyset \subseteq \emptyset \cup \emptyset \cup \dots$ . Así,  $0 \leq \mu_N^*(\emptyset) \leq \sum_{i=1}^{\infty} v_N(\emptyset) = 0$ .

ii) Sea  $C = I_1 \times \dots \times I_N$  un cubo degenerado acotado; entonces  $\mu_N^*(C) = 0$ .

Si  $C = \emptyset$  ya se tiene por el apartado anterior.

En caso contrario,  $\exists j \in \{1, \dots, N\}$  tal que  $I_j = \{a\}$  para cierto  $a \in \mathbb{R}$ .

Supongamos  $j = 1$  por simplicidad (el resto de casos son análogos).

Para cada  $I_k$  denotamos  $a_k$  y  $b_k$  a sus extremos izquierdo y derecho.

Sea  $\varepsilon > 0$ ,  $C \subseteq C_\varepsilon := (a - \varepsilon, a + \varepsilon) \times (a_2 - \varepsilon, b_2 + \varepsilon) \times \dots \times (a_N - \varepsilon, b_N + \varepsilon)$ .

Así,  $0 \leq \mu_N^*(C) \leq v_N(C_\varepsilon) = 2\varepsilon \cdot (b_2 - a_2 + 2\varepsilon) \cdot \dots \cdot (b_N - a_N + 2\varepsilon) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0$

iii) Sea  $A$  numerable (puede ser no acotado); entonces,  $\mu_N^*(A) = 0$ .

Por ser  $A$  numerable, es de la forma  $A = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ .

Sea  $\varepsilon > 0$  cualquiera pero fijo, se cumple:  $\varepsilon = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{4} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^n}$ .

Para cada  $a_n$  tomamos un cubo abierto  $I_n$  de volumen  $\frac{\varepsilon}{2^n}$  tal que  $a_n \in I_n$ .

Así,  $0 \leq \mu_N^*(A) \leq \sum_{i=1}^{\infty} v_N(I_i) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^n} = \varepsilon \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0$ .

### 1.2.6 Proposición de propiedades de $\mu_N^*$

$\mu_N^*$  cumple las siguientes propiedades:

- i) Monotonía: Sean  $A \subseteq B \subseteq \mathbb{R}^N$ . Entonces,  $\mu_N^*(A) \leq \mu_N^*(B)$ .
- ii) Subaditividad:  $\{A_i : i \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{R}^N) \Rightarrow \mu_N^*\left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu_N^*(A_i)$

#### Demostración:

i) Seguiremos la notación del corolario 1.2.4.

Como  $A \subseteq B$  por hipótesis, todo recubrimiento por cubos abiertos de  $B$  es un recubrimiento de  $A$  también.

De este modo,  $\mathcal{M}(B) \subseteq \mathcal{M}(A)$ .

Por tanto,  $\mu_N^*(A) = \inf \mathcal{M}(A) \leq \inf \mathcal{M}(B) = \mu_N^*(B)$ .

ii) Veamos que se cumple la subaditividad.

Sea  $\varepsilon > 0$  cualquiera pero fijo,  $\varepsilon = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon_n$ .

Para cada  $A_n$  y cada  $\varepsilon_n$ , aplicando el corolario 1.2.4  $\exists \{I_{n,i} : i \in \mathbb{N}\}$  cubos abiertos tales que  $A_n \subseteq \bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_{n,i}$  y  $\sum_{i=1}^{\infty} v_N(I_{n,i}) \leq \mu_N^*(A_n) + \varepsilon_n$ .

Se cumple  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_{n,i}$  con  $\{I_{n,i} : n, i \in \mathbb{N}\}$  numerable.

Por todo lo anterior,

$$\begin{aligned} \mu_N^*(A_n) &\leq \sum_{n,i} I_{n,i} \stackrel{(*_1)}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} v_N(I_{n,i}) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu_N^*(A_n) + \varepsilon_n \stackrel{(*_2)}{=} \\ &\stackrel{(*_2)}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \mu_N^*(A_n) + \sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon_n = \varepsilon + \sum_{n=1}^{\infty} \mu_N^*(A_n) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \sum_{n=1}^{\infty} \mu_N^*(A_n) \end{aligned}$$

(\*\_1) Se debe a la no negatividad de los términos sumados.

(\*\_2) Al ser no negativas, las series o convergen o divergen, luego podemos descomponer en dos sumatorios distintos.

### 1.2.7 Volumen de un intervalo real

Sea  $C = [a, b]$  con  $a \leq b$  un intervalo real compacto. Entonces, se cumple:

$$\mu^*(C) = v(C) = v(\overset{\circ}{C}) = \mu^*(\overset{\circ}{C})$$

Donde  $v = v_1$ ,  $\mu^* = \mu_1^*$ , y  $\overset{\circ}{C} = \text{int } C = (a, b)$ .

**Demostración:** Vemos el caso  $N = 1$  aunque el resto son análogos.

Por definición,  $v(C) = b - a = v(\overset{\circ}{C})$ . Veamos que  $\mu^*(C) = \mu^*(\overset{\circ}{C})$ . Por la monotonía,  $\overset{\circ}{C} \subseteq C \Rightarrow$ . Aplicando la subaditividad:

$$\mu^*(\overset{\circ}{C}) \leq \mu^*(C) = \mu^*(\overset{\circ}{C} \cup \{a, b\}) \leq \mu^*(\overset{\circ}{C}) + \mu^*(\{a, b\}) = \mu^*(\overset{\circ}{C}) + 0$$

Queda ver que  $v(C) = \mu^*(C)$  para llegar a la conclusión deseada. Sabemos que  $\mu^*(C) \leq v(C)$  por el colorario 1.2.4, luego basta ver que  $\mu^*(C) \geq v(C)$ .

Sea  $\varepsilon > 0$  cualquiera pero fijo, por (1.2.4) existen  $\{I_i : i \in \mathbb{N}\}$  intervalos abiertos tales que  $C \subseteq \bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$  y  $\mu^*(C) + \varepsilon \geq \sum_{i=1}^{\infty} v(I_i)$ . Nótese que debido a esta última condición han de ser todos acotados.

Por ser  $C$  compacto, podemos fijar  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $C \subseteq \bigcup_{i=1}^n I_i$ . Por ser acotados, cada  $I_k$  con  $k \in \{1, \dots, n\}$  va a ser de la forma  $(a_k, b_k)$ . El conjunto de extremos de estos intervalos es finito, luego el siguiente conjunto también lo será:

$$\mathcal{A} := [a, b] \cap \left( \left\{ a_k, b_k : k \in \{1, \dots, n\} \right\} \cup \{a, b\} \right)$$

Este conjunto contiene los extremos del intervalo  $C$  original, así como los extremos de los  $I_k$  que se encuentren dentro de  $C$ . Como  $\mathcal{A}$  es finito, fijamos  $m \in \mathbb{N}$  tal que  $\text{card } \mathcal{A} = m + 1$ . Podemos ordenar este conjunto; es decir, podemos renombrar sus elementos para que se cumpla:

$$\mathcal{A} = \{x_i : i \in \{0, 1, \dots, m\}\} \quad \text{donde } a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{m-1} < x_m = b$$

Sea  $j \in \{1, \dots, m\}$  cualquiera pero fijo,  $(x_{j-1}, x_j) \subseteq C \subseteq \bigcup_{i=1}^n I_i$ , luego  $\exists k \in \{1, \dots, n\}$  tal que  $I_k \cap (x_{j-1}, x_j) \neq \emptyset$ . Veamos que  $(x_{j-1}, x_j) \subseteq I_k$ .

Ambos conjuntos son conexos y abiertos, luego su intersección ha de serlo también:

$$(x_{j-1}, x_j) \cap I_k = (u, v) \quad \text{donde } u = \max\{x_{j-1}, a_k\}, v = \min\{x_j, b_k\}$$

1. Si  $u = a_k$ , se tiene que  $x_{j-1} < a_k \Rightarrow a_k \in (x_{j-1}, x_j)$ .
2. Si  $v = b_k$ , se tiene que  $x_j > b_k \Rightarrow b_k \in (x_{j-1}, x_j)$ .

En cualquier caso, se tiene que hay un extremo de  $I_k$  en  $(x_{j-1}, x_j)$ , lo que contradice la definición de  $\mathcal{A}$ . Por tanto,  $u = x_{j-1}, v = x_j$  y  $(x_{j-1}, x_j) \subseteq I_k$ . Veamos una ilustración de cómo se obtienen los elementos de  $\mathcal{A}$  a partir de los  $I_k$ :

