

实

矢量与张量分析

© L^eP_tC (萌狸)笔记项目主页: <http://leptc.github.io/lenote>

署名 · 非商用 · 相同方式共享

精

Matthews. Vector Calculus. Springer

黄克智. 张量分析 (第二版). 清华大学出版社 (较全)

参

余天庆. 张量分析及其应用. 清华大学出版社 (较精)

(同高等代数, 微分几何, 电动力学, 狭相广相)

符号约定

上标撇 ' 表示变换后, \vec{e}_a 表示单位矢量 (不用 \hat{a}), g_i 表示逆变基矢, g^i 表示协变基矢 (非单位长度)
 斜系之后, 矢/张量不再画箭头, (在不致混淆时) 用其分量 $A^\mu T^{\mu\nu}$ 来代指整个矢/张量, 撇标在指标上

相关笔记

矢量与张量代数见 〈高等代数〉 流形上的张量分析见 〈微分几何〉

矢量空间

scalar 标量 / 数量 $\varphi \in \mathbb{R}$ vector 矢量 / 向量 $\vec{A} = A\vec{e}_a$ ① 几何定义: 有 **大小** 和 **方向** 且满足 **平行四边形法则**
n 维矢量空间 $V^n = \mathbb{R}^n$ 上定义了两种运算: ① 矢量 **加法** 对应分量相加减, 满足交换律, 结合律 ② 标量和矢 **数乘** 每一分量与标量乘, 满足结合律, 左右分配律 (详见 **< 高代 >**) ② 代数定义: 元素 $\vec{A} \in V^n$
 V^n 的 **基底** 记为 $\{\vec{e}_i\}$, 则任一矢量可唯一地表示为 $\vec{A} = \sum_i a_i \vec{e}_i$, a_i 称为 \vec{A} 在相应基底下的 **坐标**

平移变换

仿射空间 $P^n = \mathbb{R}^n$, 区别是其元素视为 **点**

没有定义点和点的加法, 定义了点和矢量的运算 $P^n \otimes V^n \rightarrow P^n$, $O \mapsto O' = O + \vec{A}$ (详见 **< 高代 >**)

从而 V^n 中每个 \vec{A} 都给出了 P^n 到自身的一个变换, 称为由 \vec{A} 决定的 **平行移动**

P^n 中任一点加上 V^n 中任一组基底构成一个 **坐标系** $\{O, \vec{e}_i\}$

free vector 自由矢量 没有作用点 **例** 力偶矩 fixed vector 固定矢量 固定作用点 **例** 位矢 \vec{r} , 速度 \vec{v} sliding vector 滑动矢量 固定作用线
例 作用在刚体上的力 **< 力学 >**

内积

定义了 **内积** 的矢量空间称为 **内积空间** (详见 **< 高代 >**)

定义了对称正定内积的实矢量空间称为 **欧氏空间** $E^n \rightarrow$ 有了 **长度** 和 **角度** θ 的概念

inner / dot / scalar product

内积 / 点乘 / 数量积 $\vec{A} \cdot \vec{B} \equiv AB \cos \theta \stackrel{\text{正交基}}{=} \sum_i a_i b_i$, 矢量的 **模** $A = |\vec{A}| \equiv \sqrt{\vec{A} \cdot \vec{A}} \stackrel{\text{正交基}}{=} \sqrt{\sum_i a_i^2}$

内积满足交换律, 分配律 (不存在结合律, 标量不能和矢量点乘叉乘)

转动变换


基底不唯一, 记变换后的基底为 $\{\vec{e}_i'\}$, 新坐标为 $a_i' = \sum_j R_{ij} a_j$, 则 $\vec{A} = \sum_j a_j \vec{e}_j = \sum_i a_i' \vec{e}_i'$ (被动变换, 物不动, 基动坐标变) **「代入 = $\sum_i \sum_j R_{ij} a_j \vec{e}_i'$ 对比」** $\vec{e}_j = \sum_i R_{ij} \vec{e}_i'$ (基底的新旧变换与坐标相反)

rotation 欧氏空间的等距变换为 **空间转动** $R_{ij} = \vec{e}_j \cdot \vec{e}_i' = \cos \langle j, i' \rangle$

性质 R 是正交阵 **< 高代 >** **「 $\sum_j R_{ij} R_{jk}^T = \sum_j R_{ij} R_{kj} = \delta_{ik} \rightarrow \sum_i R_{ij} a_i' = \delta_{ii} a_j$ 」**

\rightarrow **逆变换** $a_i = \sum_j R_{ji} a_j'$, $\vec{e}_j' = \sum_i R_{ji} \vec{e}_i$

推论 **协变** $R_{ij} = \frac{\partial a_i'}{\partial a_j}$, **逆变** $R_{ji} = \frac{\partial a_i}{\partial a_j'}$ $\begin{bmatrix} a_1' \\ a_2' \\ a_3' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$



③ 矢量的分析定义: 空间转动下分量按 $a_i' = \sum_j R_{ij} a_j$ 变换的量 (标量则是 $\varphi' = \varphi$)

例 证矢量的内积是标量

$$(\vec{A} \cdot \vec{B})' = \sum_i a_i' b_i' = \sum_i \left(\sum_j R_{ij} a_j \right) \left(\sum_k R_{ik} b_k \right) = \sum_{ijk} R_{ij} R_{ik} a_j b_k = \sum_{jk} \delta_{jk} a_j b_k = \sum_k a_k b_k = \vec{A} \cdot \vec{B}$$

矢积

(只有 3 维和 7 维空间能定义矢积, 分别用四元数和八元数乘法表示, 一般的乘法见 **< 外积 >**)

vector / cross product

矢积 / 叉乘 / 向量积 $\vec{A} \times \vec{B} \equiv AB \sin \theta \vec{e}_n = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$, \vec{e}_n 按 **右手定则** $\rightarrow |\vec{A} \times \vec{B}| =$ 平行四边形面积 (拉格朗日 1773) (注: 矢量相除的结果为四元数)

性质 有反交换律, 左右分配律, 雅可比恒等式, 不满足结合律 **推论** 平行矢量叉乘为零, $\vec{A} \times \vec{A} = \vec{0} = 0$

例 直线方程 $\vec{r} = \vec{r}_0 + \lambda \vec{k}$ 又可写成 $\vec{r} \times \vec{k} = \vec{h}$, \vec{h} 为常矢量

$$[[\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})]_x = a_y(b_x c_y - b_y c_x) - a_z(b_z c_x - b_x c_z) = b_x(a_y c_y + a_z c_z) + a_x b_x c_x - c_x(a_y b_y + a_z b_z) - a_x b_x c_x]$$

Lagrange's identity

拉格朗日恒等式 $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B}(\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{C}(\vec{A} \cdot \vec{B})$ (结果在 \vec{B}, \vec{C} 面内, 中间者系数为正)

$(\vec{A} \times \vec{B}) \times \vec{C} = \vec{B}(\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{A}(\vec{B} \cdot \vec{C})$ **推论** 当 $\vec{B} \times (\vec{A} \times \vec{C}) = 0$ 时上下两式相等

推论 $(\vec{A} \times \vec{B}) \cdot (\vec{C} \times \vec{D}) = \vec{A} \cdot (\vec{B} \times (\vec{C} \times \vec{D})) = (\vec{A} \cdot \vec{C})(\vec{B} \cdot \vec{D}) - (\vec{A} \cdot \vec{D})(\vec{B} \cdot \vec{C})$

triple / mixed product

三重积 / 混合积 $[\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}] \equiv (\vec{A} \times \vec{B}) \cdot \vec{C} = (\vec{B} \times \vec{C}) \cdot \vec{A} = (\vec{C} \times \vec{A}) \cdot \vec{B} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix} = \pm \text{平行六面体体积}$

例 洛伦兹力 $q\vec{v} \times \vec{B} = m\dot{\vec{v}}$ 两边点乘 \vec{v} 得 $0 = m\dot{\vec{v}} \cdot \vec{v} = m\frac{1}{2}\frac{d}{dt}(\vec{v} \cdot \vec{v}) = m\frac{1}{2}\frac{d}{dt}(|v|^2)$ 得证速度大小不变

反射变换

polar vector

极 / 真矢量 空间反射变换下, 镜面垂直分量反向, 镜面平行分量不变 **例** $\vec{r}, \vec{p}, \vec{E}$, 电矩 \vec{p}


axial / pseudo vector

轴 / 赝矢量 空间反射变换下, 镜面垂直分量不变, 镜面平行分量反向 **性质** 真矢量叉乘得赝矢量

例 $\vec{\omega}, \vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}, \vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}, \vec{B} \propto I\vec{r} \times \vec{e}_r$, 磁矩 \vec{m} , 涡度 $\vec{\zeta} = \nabla \times \vec{B}$

「变换时出个负号」 矢量点乘赝矢量得 **赝标量** **例** 磁通量 Φ_B , 三重积

→ 赝标量乘矢量得赝矢量



直角坐标系

rectangular

coordinate

basis vector

直角坐标系 下点的 **坐标** 记为 (x, y, z) , **基矢** 记为 $\{\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z\}$ **右手系** $\vec{e}_x \times \vec{e}_y = \vec{e}_z$, 矢量 $\vec{A} = \sum_{xyz} a_x \vec{e}_x$

metric

度规 $g_{ij} \equiv \vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = \sum_{xyz} (\vec{e}_i \cdot \vec{e}_x)(\vec{e}_x \cdot \vec{e}_j) = \sum_{xyz} \frac{\partial x}{\partial u_i} \frac{\partial x}{\partial u_j}$, 一般基底下的 **内积** 为 $\vec{A} \cdot \vec{B} = \sum_{ij} g_{ij} a_i b_j$

性质 欧氏空间 g_{ij} 是正定对称矩阵, 存在基底使 $g_{ij} = \delta_{ij}$ **「施密特正交化」** (不唯一, 差个转动变换)

曲线坐标系

curvilinear coordinate system

coordinate surface

coordinate curve

曲线坐标系 下点的 **坐标** 记为 (u_1, u_2, u_3) , $u_i = \text{常数}$ 称为 **坐标面**, 曲面的交线称为 **坐标线**

坐标线的单位切向矢量记为 $\{\vec{e}_i\}$ (不一定是长度的量纲), 指向 u_i 增加的方向, 构成 **局部标架**

假设 坐标变换函数 $x = x(u_1, u_2, u_3)$ (y, z 同理) 单值连续可微 → 存在逆变换 ($J \neq 0$) $u_i = u_i(x, y, z)$


有 $d\vec{r} = \sum \frac{\partial \vec{r}}{\partial u_i} du_i$, 定义 **协变基矢** $\vec{g}_i = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u_i}$ (有长度的量纲, 不一定归一)

cylindrical 柱系 $\begin{cases} x = r \cos \phi \\ y = r \sin \phi \\ z = z \end{cases} \begin{cases} \vec{e}_x = \cos \phi \vec{e}_r - \sin \phi \vec{e}_\phi \\ \vec{e}_y = \sin \phi \vec{e}_r + \cos \phi \vec{e}_\phi \\ \vec{e}_z = \vec{e}_z \end{cases} \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \phi = \arctan(y/x) \\ z = z \end{cases} \begin{cases} \vec{e}_r = \cos \phi \vec{e}_x + \sin \phi \vec{e}_y \\ \vec{e}_\phi = -\sin \phi \vec{e}_x + \cos \phi \vec{e}_y \\ \vec{e}_z = \vec{e}_z \end{cases} \text{polar 极系}$

radial 径向 \vec{e}_r **angular 横向** \vec{e}_ϕ **azimuthal angle 方位角** (经度) ϕ (逆时针为正向) **polar angle 极角** (余纬度) θ

局部标架

spherical 球系 $\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \phi \\ y = r \sin \theta \sin \phi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \begin{cases} \vec{e}_x = \cos \phi (\sin \theta \vec{e}_r + \cos \theta \vec{e}_\theta) - \sin \phi \vec{e}_\phi \\ \vec{e}_y = \sin \phi (\sin \theta \vec{e}_r + \cos \theta \vec{e}_\theta) + \cos \phi \vec{e}_\phi \\ \vec{e}_z = \cos \theta \vec{e}_r - \sin \theta \vec{e}_\theta \end{cases} \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \theta = \arctan(\sqrt{x^2 + y^2}/z) \\ \phi = \arctan(y/x) \end{cases} \begin{cases} \vec{e}_r = \sin \theta (\cos \phi \vec{e}_x + \sin \phi \vec{e}_y) + \cos \theta \vec{e}_z \\ \vec{e}_\theta = \cos \theta (\cos \phi \vec{e}_x + \sin \phi \vec{e}_y) - \sin \theta \vec{e}_z \\ \vec{e}_\phi = -\sin \phi \vec{e}_x + \cos \phi \vec{e}_y \end{cases}$




parabolic

抛物线系 $x = uv \cos \phi, y = uv \sin \phi, z = \frac{1}{2}(u^2 - v^2)$

正交曲线系

坐标系	u_1	u_2	u_3	h_1	h_2	h_3
直角系	$x \in \mathbb{R}$	$y \in \mathbb{R}$	$z \in \mathbb{R}$	1	1	1
柱系	$0 \leq r < \infty$	$0 \leq \phi < 2\pi$	$z \in \mathbb{R}$	1	r	1
球系	$0 \leq r < \infty$	$0 \leq \theta < \pi$	$0 \leq \phi < 2\pi$	1	r	$r \sin \theta$
抛物线	u	v	z	$\sqrt{u^2 + v^2}$	$\sqrt{u^2 + v^2}$	uv



orthogonal curvilinear coordinates

正交曲线坐标系 过任一点的各坐标线相互垂直 **正交条件** $g_{ij}=0 (i \neq j)$ **右手系惯例** $\vec{e}_1 \times \vec{e}_2 = \vec{e}_3$

Lamé coefficient

定义 **拉梅系数** $h_i \equiv \sqrt{g_{ii}}$, 则 $h_i = |\vec{g}_i|$, 单位基矢 $\vec{e}_i = \vec{g}_i / h_i$

→ **线元** $d\vec{l} = \sum h_i \vec{e}_i du_i$, 沿基矢的分量 $dl_i = h_i du_i$, 模长 $dl^2 = \sum \sum g_{ij} du_i du_j \stackrel{\text{正交}}{=} \sum h_i^2 du_i^2$

u_1 面上的 **面元** $dS = h_2 h_3 du_2 du_3$ **体积元** $dV = J du_1 du_2 du_3$, 雅可比行列式 $J = h_1 h_2 h_3 = \sqrt{|g|} \neq 0$

[行列式可视为其行矢量或列矢量的三重积 $J = \left| \frac{\partial \vec{r}}{\partial u_j} \right| = \left[\frac{\partial \vec{r}}{\partial u_1}, \frac{\partial \vec{r}}{\partial u_2}, \frac{\partial \vec{r}}{\partial u_3} \right] = [h_1 \vec{e}_1, h_2 \vec{e}_2, h_3 \vec{e}_3]$] <微积分>

矢函数微分

设 **位矢** 函数 $\vec{r} = \vec{r}(t)$, **极限** **连续** **导数** **偏导数** 等的定义均和 <微积分> 类似

导矢 $\frac{d\vec{r}}{dt} \equiv \dot{\vec{r}} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t+\Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t}$ 是一个矢量 **定理** 其方向沿 $\vec{r}(t)$ **矢端曲线** 的切线 <微几>

矢量加减, 数乘的导数公式均同理, 内积, 矢积, 混合积的莱布尼茨法则亦同理, 注意顺序勿变

直角系 $\vec{r} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$ **速度** $\vec{v} \equiv \dot{\vec{r}} = \dot{x}\vec{e}_x + \dot{y}\vec{e}_y + \dot{z}\vec{e}_z$ **加速度** $\vec{a} \equiv \dot{\vec{v}} = \ddot{x}\vec{e}_x + \ddot{y}\vec{e}_y + \ddot{z}\vec{e}_z$ <力学>


微分 $d\vec{r} = dx\vec{e}_x + dy\vec{e}_y + dz\vec{e}_z$, $|d\vec{r}|^2 = (dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2$

弧长 $ds = \pm |d\vec{r}|$ (相对于正方向) **速率** $v \equiv |\vec{v}| = \dot{s}$

极系 $\vec{r} = r \cos \phi \vec{e}_x + r \sin \phi \vec{e}_y = r \vec{e}_r$ **径向** $\vec{e}_r = \frac{\partial \vec{r}}{\partial r} = \cos \phi \vec{e}_x + \sin \phi \vec{e}_y$,

$\dot{\vec{e}}_r = \frac{d\vec{e}_r}{d\phi} \dot{\phi} = \dot{\phi} \vec{e}_\phi$ **横向** $\vec{e}_\phi = \frac{1}{r} \frac{\partial \vec{r}}{\partial \phi} = -\sin \phi \vec{e}_x + \cos \phi \vec{e}_y$, $\dot{\vec{e}}_\phi = \frac{d\vec{e}_\phi}{d\phi} \dot{\phi} = -\dot{\phi} \vec{e}_r$

$\vec{v} = \left[\frac{\partial \vec{r}}{\partial r} \dot{r} + \frac{\partial \vec{r}}{\partial \phi} \dot{\phi} \right] = \dot{r} \vec{e}_r + r \dot{\phi} \vec{e}_\phi$, $\vec{a} = (\ddot{r} - r \dot{\phi}^2) \vec{e}_r + (2\dot{r} \dot{\phi} + r \ddot{\phi}) \vec{e}_\phi$ 或 $a_\phi = \frac{1}{r} \frac{d}{dt} (r^2 \dot{\phi})$




参数方程消去 t 即为质点的 **轨迹**, 当轨迹已知时选用 **自然坐标系** 较方便

弧长 $s = s(t)$, $\vec{r} = \vec{r}(s)$ **切向** $\vec{e}_t = \frac{d\vec{r}}{ds}$, $\frac{d\vec{e}_t}{d\theta} = \vec{e}_n$ **法向** \vec{e}_n (指向曲线凹侧)

$\frac{d\vec{e}_n}{d\theta} = -\vec{e}_t$, $\dot{\vec{e}}_t = \frac{d\vec{e}_t}{d\theta} \frac{d\theta}{ds} \dot{s} = \vec{e}_n \frac{v}{\rho}$ $\vec{v} = \dot{s} \vec{e}_t$, $\vec{a} = \ddot{s} \vec{e}_t + \frac{v^2}{\rho} \vec{e}_n$, $\tan \theta = \frac{a_n}{a_t}$

曲率半径 $\rho = \frac{ds}{d\theta} = \frac{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}{|y''|}$ <微几> **常用** $a_t = \dot{v} = \frac{dv}{ds} v$



柱系 $\vec{e}_r, \vec{e}_\theta$ 同极系, \vec{e}_z 同直角系 **球系** $\vec{r} = r \vec{e}_r$, $\vec{v} = \dot{r} \vec{e}_r + r \dot{\theta} \vec{e}_\theta + r \dot{\phi} \sin \theta \vec{e}_\phi$

$\vec{a} = (\ddot{r} - r \dot{\theta}^2 - r \sin^2 \theta \dot{\phi}^2) \vec{e}_r + (2\dot{r} \dot{\theta} + r \ddot{\theta} - r \sin \theta \cos \theta \dot{\phi}^2) \vec{e}_\theta + (r \ddot{\phi} \sin \theta + 2\dot{r} \dot{\phi} \sin \theta + 2r \dot{\theta} \dot{\phi} \cos \theta) \vec{e}_\phi$

矢函数积分

不定积分 $\vec{r} = \int \vec{v}(t) dt + \vec{r}_0$, 基本性质均成立 $\int (\varphi \vec{A} \pm \vec{k} \cdot \vec{B}) dt = \varphi \int \vec{A} dt \pm \vec{k} \cdot \int \vec{B} dt$, \vec{k} 为常矢量

定积分 $\int_{t_0}^t \vec{v}(\tau) d\tau = \vec{r}(t) - \vec{r}(t_0)$ **分部积分** $\int \varphi \vec{v} dt = \varphi \vec{r} - \int \dot{\varphi} \vec{r} dt$, 内积, 矢积公式同理

矢量场

(时变) **标量场** $\varphi(x, y, z, t)$ **矢量场** $\vec{A}(x, y, z, t) = \sum_{xyz} a_x(x, y, z, t) \vec{e}_x$ **静态场** 不含时


通量 矢量流过闭合曲面的分量的面积分 $\Phi \equiv \oint_S \vec{a}_\perp dS$, 表示有 **源** 或 **汇** (流入和流出的不一样多)

环量 矢量沿闭合环路的分量的线积分 $\Gamma \equiv \oint_L \vec{a}_\parallel dl$, 表示有 **涡旋** (流体自转)

无散场 $\nabla \cdot \vec{B} = 0 \Leftrightarrow \vec{B} = \nabla \times \vec{A} \Leftrightarrow \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$ 与所选面无关 $\Leftrightarrow \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$

连续性方程 $\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0$ **不可压缩流体** ρ 为常数 $\rightarrow \nabla \cdot \vec{v} = 0$ <流力>

无旋场 / 势场 $\nabla \times \vec{E} = 0 \Leftrightarrow \vec{E} = -\nabla \varphi \Leftrightarrow \oint_a \vec{E} \cdot d\vec{l}$ 与路径无关 $\Leftrightarrow \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$



harmonic field

谐和场 无散无旋 \rightarrow 势函数满足 **拉普拉斯方程** $\nabla^2\varphi=0$ **例** 常矢量场无散无旋

一般矢量场总可表示为无旋场和无散场之和 $\vec{F}=-\nabla\varphi+\nabla\times\vec{A}$ (分解不唯一, 可相差任意的谐和场)

Helmholtz theorem

加边界条件 \rightarrow **亥姆霍兹定理** 若场在无限远处(比 $\frac{1}{r^2}$ 更快地) 趋于零, 则场可由其散度和旋度唯一确定
[拉方程无局域极值, 不存在无限远趋于零的非零谐和场]

矢量场微分

nabla / del operator

矢微算符 / 劈形算符 ∇ 或 $\vec{\nabla}$ (视作矢量, 向右作用) **例** 「拉恒」 $(\nabla\times\vec{A})\times\vec{A}=(\vec{A}\cdot\nabla)\vec{A}-\frac{1}{2}\nabla(A^2)$

$$d\varphi=\frac{\partial\varphi}{\partial x}dx+\frac{\partial\varphi}{\partial y}dy+\frac{\partial\varphi}{\partial z}dz=[(\vec{e}_x\partial_x+\vec{e}_y\partial_y+\vec{e}_z\partial_z)\varphi]\cdot(d\vec{l})\equiv\nabla\varphi\cdot d\vec{l}\rightarrow\nabla\varphi\perp d\vec{l}\Big|_{d\varphi=0}$$

gradient

梯度 $\nabla\varphi$ 方向为该点处 φ 增速最大的方向 (垂直于等值面), 大小等于在这个方向上的斜率 **例** $\nabla r=\vec{e}_r$
梯度为零可能是极大点(山顶), 极小点(山谷), 鞍点(某方向极大, 另方向极小), 肩点(升或降的平坦处)

$$\nabla\cdot\vec{A}=(\vec{e}_x\partial_x+\vec{e}_y\partial_y+\vec{e}_z\partial_z)\cdot(a_x\vec{e}_x+a_y\vec{e}_y+a_z\vec{e}_z)=\partial_x a_x+\partial_y a_y+\partial_z a_z \text{ (结果为标量场)}$$

divergence

散度 $\nabla\cdot\vec{A}$ 无限小闭合曲面围成空间中的通量除以围成空间体积, 描述矢量场中某点处是否有源或汇

$$\nabla\times\vec{A}=\begin{vmatrix}\vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ a_x & a_y & a_z\end{vmatrix} \text{ (结果为矢量场)}$$

例 流体整体以 ω 旋转, $\vec{v}=\omega(-y\vec{e}_x+x\vec{e}_y)$, 则 $\nabla\times\vec{v}=2\omega\vec{e}_z$
流体绕轴旋转 $\omega\propto\frac{1}{r}$, 则 $\nabla\times\vec{v}=0$

curl / rotation

旋度 $\nabla\times\vec{A}$ 无限小闭合曲线围成面积中的环量除以围成范围面积, 描述矢量场中某点处是否有涡旋

分量形式

$$\nabla\varphi=\left(\frac{\vec{e}_1}{h_1}\partial_1+\frac{\vec{e}_2}{h_2}\partial_2+\frac{\vec{e}_3}{h_3}\partial_3\right)\varphi \quad [d\vec{l}=\sum h_i\vec{e}_i du_i]$$

$$\nabla\cdot\vec{A}=\frac{1}{h_1h_2h_3}\left[\partial_1(h_2h_3a_1)+\partial_2(h_1h_3a_2)+\partial_3(h_1h_2a_3)\right] \quad [=\lim_{V\rightarrow 0}\frac{1}{V}\oint\vec{A}\cdot\vec{S}]$$

$$\nabla\times\vec{A}=\frac{1}{h_1h_2h_3}\begin{vmatrix}h_1\vec{e}_1 & h_2\vec{e}_2 & h_3\vec{e}_3 \\ \partial_1 & \partial_2 & \partial_3 \\ h_1a_1 & h_2a_2 & h_3a_3\end{vmatrix} \quad [=\vec{e}_n\lim_{S\rightarrow 0}\frac{1}{S}\oint\vec{A}\cdot\vec{l}]$$

(第 2 行的偏导是作用在第 3 行整体的, 不可化简)

例 柱系 $\nabla\cdot\vec{A}=\frac{1}{r}\partial_r(ra_r)+\frac{1}{r}\partial_\phi a_\phi+\partial_z a_z$ 球系 $\nabla\cdot\vec{A}=\frac{1}{r^2}\partial_r(r^2a_r)+\frac{1}{r\sin\theta}\partial_\theta(\sin\theta a_\theta)+\frac{1}{r\sin\theta}\partial_\phi a_\phi$

推论 中心场 $\nabla f(r)=\frac{df}{dr}\vec{e}_r\rightarrow\nabla\frac{1}{r}=-\frac{\vec{e}_r}{r^2}$, $\nabla\cdot\vec{A}(r)=\frac{1}{r^2}\partial_r(r^2A_r)\rightarrow\nabla\cdot\vec{r}=3$, $\nabla\cdot\vec{e}_r=\frac{2}{r}$, $\nabla\cdot\left(\frac{\vec{e}_r}{r^2}\right)=-\nabla^2\frac{1}{r}=4\pi\delta(\vec{r})$ 「奇点要单独积分来求 $\int_{\theta=0}^\pi\int_{\phi=0}^{2\pi}\frac{1}{r^2}r^2\sin\theta d\theta d\phi$ 」, $\nabla\times f(r)\vec{e}_r=0$ (中心场必无旋)

积的微分

矢量场加减数乘的微分公式简易, 标量场的公式和函数同理 $\nabla(fg)=f\nabla g+g\nabla f$, $\nabla\left(\frac{f}{g}\right)=(g\nabla f-f\nabla g)/g^2$

① 散度公式 $[\partial_x(fa_x)=\frac{\partial f}{\partial x}a_x+f\frac{\partial a_x}{\partial x}]$ $\nabla\cdot(f\vec{A})=(\nabla f)\cdot\vec{A}+f(\nabla\cdot\vec{A})\rightarrow\nabla\cdot\left(\frac{\vec{A}}{f}\right)=(f(\nabla\cdot\vec{A})-(\nabla f)\cdot\vec{A})/f^2$

$[\partial_x(a_yb_z-a_zb_y)=(b_z\partial_xa_y-b_y\partial_xa_z)-(a_z\partial_xb_y-a_y\partial_xb_z)]$ $\nabla\cdot(\vec{A}\times\vec{B})=\vec{B}\cdot(\nabla\times\vec{A})-\vec{A}\cdot(\nabla\times\vec{B})$

② 旋度公式 $\nabla\times(f\vec{A})=(\nabla f)\times\vec{A}+f(\nabla\times\vec{A})$, $\nabla\times(\vec{A}\times\vec{B})=\vec{A}(\nabla\cdot\vec{B})-\vec{B}(\nabla\cdot\vec{A})+(\vec{B}\cdot\nabla)\vec{A}-(\vec{A}\cdot\nabla)\vec{B}$

$[\vec{A}\times(\nabla\times\vec{B})=\vec{A}\times(\nabla_B\times\vec{B})\xrightarrow{\text{拉恒}}\nabla_B(\vec{A}\cdot\vec{B})-\vec{B}(\vec{A}\cdot\nabla_B)]$, 而 $\vec{B}(\vec{A}\cdot\nabla_B)=(\vec{A}\cdot\nabla_B)\vec{B}=(\vec{A}\cdot\nabla)\vec{B}$

③ 梯度公式 $\nabla(\vec{A}\cdot\vec{B})=(\nabla_A+\nabla_B)(\vec{A}\cdot\vec{B})=\vec{A}\times(\nabla\times\vec{B})+\vec{B}\times(\nabla\times\vec{A})+(\vec{A}\cdot\nabla)\vec{B}+(\vec{B}\cdot\nabla)\vec{A}$

注 $(\vec{A} \cdot \nabla)$ 整体视为一个算符, $\vec{F} = (\vec{A} \cdot \nabla) \vec{B}$ 是指 $F_x = \vec{A} \cdot \nabla B_x$, y, z 分量同理

→ 若 \vec{k} 为常矢量, 则 $(\vec{k} \cdot \nabla) \vec{r} = \vec{k} \rightarrow \nabla(\vec{k} \cdot \vec{r}) = \vec{k} \rightarrow \nabla(\vec{k} \cdot \vec{e}_r) = (\vec{k} \cdot \nabla) \vec{e}_r = \frac{1}{r} [\vec{k} - \vec{e}_r (\vec{k} \cdot \vec{e}_r)] = \frac{1}{r} \vec{k}_\perp$

→ $\nabla \left(\vec{k} \cdot \left(\frac{1}{r} \right) \right) = -\nabla \left(\frac{\vec{k} \cdot \vec{e}_r}{r^2} \right) = \frac{1}{r^3} [2(\vec{k} \cdot \vec{e}_r) - r \nabla(\vec{k} \cdot \vec{e}_r)] = \frac{1}{r^3} [3(\vec{k} \cdot \vec{e}_r) \vec{e}_r - \vec{k}] \rightarrow \nabla \nabla \left(\frac{1}{r} \right) = \frac{1}{r^3} (3\vec{e}_r \vec{e}_r - \vec{I})$

$u(x, y, z)$ 连续可微, 则复合函数求导 $\nabla f(u) = \frac{df}{du} \nabla u$, $\nabla \cdot \vec{A}(u) = \nabla u \cdot \frac{d\vec{A}}{du}$, $\nabla \times \vec{A}(u) = \nabla u \times \frac{d\vec{A}}{du}$

例 \vec{k}, \vec{E} 为常矢量 $\rightarrow \nabla \cdot [\vec{E} \sin(\vec{k} \cdot \vec{r})] = \nabla \sin(\vec{k} \cdot \vec{r}) \cdot \vec{E} = \vec{E} \cdot \nabla(\vec{k} \cdot \vec{r}) \cos(\vec{k} \cdot \vec{r}) = \vec{E} \cdot \vec{k} \cos(\vec{k} \cdot \vec{r})$
 $\nabla \times [\vec{E} \sin(\vec{k} \cdot \vec{r})] = \nabla \sin(\vec{k} \cdot \vec{r}) \times \vec{E} = \vec{k} \times \vec{E} \cos(\vec{k} \cdot \vec{r})$

二阶微分

Laplace operator

① 梯度的散度 $\nabla \cdot (\nabla \varphi) \equiv \nabla^2 \varphi$ (或记作 Δ , 不推荐) **拉普拉斯算符** $\nabla^2 = \nabla \cdot \nabla$ (可视为标量)

对标量场 $\nabla^2 \varphi = (\partial_x^2 + \partial_y^2 + \partial_z^2) \varphi$ 对矢量场 (直角系) $(\nabla^2 \vec{A})_x = \nabla^2 A_x$, y, z 分量同理

正交曲线系下 $\nabla^2 \varphi = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\partial_1 \left(\frac{h_2 h_3}{h_1} \partial_1 \right) + \partial_2 \left(\frac{h_1 h_3}{h_2} \partial_2 \right) + \partial_3 \left(\frac{h_1 h_2}{h_3} \partial_3 \right) \right]$

例 柱系 $\nabla^2 = \frac{1}{r} \partial_r (r \partial_r) + \frac{1}{r^2} \partial_\phi^2 + \partial_z^2$ 球系 $\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \partial_r (r^2 \partial_r) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta \partial_\theta) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \partial_\phi^2$

注 算符恒等式 (需作用在连续可微函数上才有意义) $\frac{1}{r^2} \partial_r (r^2 \partial_r) \equiv \frac{1}{r} \partial_r^2 r$ [都等于 $\frac{2}{r} \partial_r + \partial_r^2$]

② 梯度的旋度 $\nabla \times (\nabla \varphi) = 0$ [$\partial_x (\partial_y \varphi) = \partial_y (\partial_x \varphi)$] ④ 旋度的散度 $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) = 0$ [$\partial_x (\partial_y a_z) = \partial_y (\partial_x a_z)$]

③ 散度的梯度 $\nabla(\nabla \cdot \vec{A}) \neq \nabla^2 \vec{A}$, 很少用到

⑤ 旋度的旋度 $\nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}$ [拉恒]

推论 $\nabla \times (\nabla^2 \vec{A}) = -\nabla \times (\nabla \times (\nabla \times \vec{A})) = \nabla^2 (\nabla \times \vec{A})$ (旋度算符和拉普拉斯对易)

矢量场积分

矢场线积分 $\int_L \varphi d\vec{r}$ 和 $\int_L \vec{A} \times d\vec{r}$ 型的积分结果是个矢量, 计算时先对积分路径参数化再算各分量

例 沿 $y=x^2$ 积分, 设 $x=t, y=t^2$, 则 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} (x+y^2) d\vec{r} = \int_0^1 (t+t^4)(1, 2t) dt = (0.7, 1)$

例 沿 $y=\sin x$ 积分, 设 $x=t, y=\sin t$, 则 $\int_{(0,0,0)}^{(\pi,0,0)} (y, x, 0) \times d\vec{r} = \vec{e}_z \int_0^\pi (\sin t \cos t - t) dt = -\frac{\pi^2}{2} \vec{e}_z$

矢场面积分 $\iint_S \varphi d\vec{S}$ 和 $\iint_S \vec{A} \times d\vec{S}$ 型的积分结果是个矢量


矢量面积 $\vec{\Sigma} \equiv \iint_S d\vec{S} (= \iint_S \vec{e}_n dS, \vec{e}_n \text{ 为外法线方向})$ **推论** $\vec{\Sigma} = \frac{1}{2} \oint \vec{r} \times d\vec{l}$

(若 S 为平面, 则 $|\vec{\Sigma}|$ 等于标量面积)

例 半球面 $\vec{\Sigma} = \iint \cos \theta (r^2 \sin \theta d\theta d\phi) \vec{e}_z = 2\pi r^2 \vec{e}_z \int_0^{\pi/2} \sin \theta (d \sin \theta) = \pi r^2 \vec{e}_z$, 球面为零

[梯度体积分公式 $\varphi=1$] \rightarrow 任何闭合曲面 $\vec{\Sigma}=0 \rightarrow$ 有相同边界的曲面的 $\vec{\Sigma}$ 相同

设 \vec{k} 为常矢量 [梯度线积分公式 $\varphi \rightarrow \vec{k} \cdot \vec{r}$] $\rightarrow \oint (\vec{k} \cdot \vec{r}) d\vec{l} = \vec{\Sigma} \times \vec{k}$



积分定理

<微积分> **微积分基本定理** $\int_a^b f' dx = f(b) - f(a) \rightarrow$ **梯度定理** $\int_a^b (\nabla \varphi) \cdot d\vec{l} = \varphi(b) - \varphi(a)$ (与路径无关)

高斯定理 散度体积分 $\iiint_V \nabla \cdot \vec{A} dV = \oiint_S \vec{A} \cdot d\vec{S}$ **斯托克斯定理** 旋度线积分 $\iint_S \nabla \times \vec{A} \cdot d\vec{S} = \oint_L \vec{A} \cdot d\vec{l}$

[高斯定理中 $\vec{A} \rightarrow \varphi \vec{k}$, \vec{k} 为常矢量] 梯度体积分 $\iiint_V \nabla \varphi dV = \oiint_S \varphi d\vec{S}$

[高斯定理 $\vec{A} \rightarrow \vec{A} \times \vec{k}$] 旋度体积分 $\iiint_V \nabla \times \vec{A} dV = \oiint_S d\vec{S} \times \vec{A}$

[斯托克斯定理 $\vec{A} \rightarrow \varphi \vec{k}$] 梯度线积分 $\iint_S d\vec{S} \times (\nabla \varphi) = \oint_L \varphi d\vec{l}$

(φ, ψ 在有界的 V 中有连续二阶偏导, 在 V 的边界 S 上有连续一阶偏导)

[高斯定理 $\vec{A} \rightarrow \psi \nabla \varphi$] **第一标量格林定理** $\oiint_S \psi \nabla \varphi \cdot d\vec{S} = \iiint_V (\nabla \psi \cdot \nabla \varphi + \psi \nabla^2 \varphi) dV$ (亦可写成 $\nabla \cdot (\psi \nabla \varphi)$)

\rightarrow **第二标量格林定理** $\oiint_S (\psi \frac{\partial \varphi}{\partial n} - \varphi \frac{\partial \psi}{\partial n}) dS = \iiint_V (\psi \nabla^2 \varphi - \varphi \nabla^2 \psi) dV$ ($\nabla \varphi \cdot \vec{e}_n dS = \frac{\partial \varphi}{\partial n} dS$, n 为外法线向)

矢量格林定理 $\oiint_S (\vec{A} \times \nabla \times \vec{B}) \cdot d\vec{S} = \iiint_V [(\nabla \times \vec{A}) \cdot (\nabla \times \vec{B}) - \vec{A} \cdot \nabla \times \nabla \times \vec{B}] dV$

$\rightarrow \oiint_S (\vec{A} \times \nabla \times \vec{B} - \vec{B} \times \nabla \times \vec{A}) \cdot d\vec{S} = \iiint_V (\vec{B} \cdot \nabla \times \nabla \times \vec{A} - \vec{A} \cdot \nabla \times \nabla \times \vec{B}) dV$

函数和另一个函数导数乘积的积分可以用 **分部积分**

$$[\nabla \cdot (\varphi \vec{A}) = \varphi(\nabla \cdot \vec{A}) + \vec{A} \cdot (\nabla \varphi)] \quad \iiint_V \varphi(\nabla \cdot \vec{A}) dV = \oint_S \varphi \vec{A} \cdot d\vec{S} - \iiint_V \vec{A} \cdot (\nabla \varphi) dV$$

常用 $\iint_S \varphi(\nabla \times \vec{A}) \cdot d\vec{S} = \iint_S [\vec{A} \times (\nabla \varphi)] \cdot \vec{S} + \oint_L \varphi \vec{A} \cdot d\vec{l}$

$$\iiint_V \vec{B} \cdot (\nabla \times \vec{A}) dV = \iiint_V \vec{A} \cdot (\nabla \times \vec{B}) dV + \oint_S (\vec{A} \times \vec{B}) \cdot d\vec{S}$$

指标表示

suffix notation

summation convention

指标表示 $\vec{A} = \sum_i a_i \vec{e}_i$ **求和约定** (爱因斯坦) 某项中有指标变量成对出现, 表示对该指标的所有可能值求和, 省略 \sum 号 (物理惯例 i, j 表示求和 3 个, μ, ν 表示求和 4 个)

dummy index

free index

哑指标 作和的指标对, 可替换为其它相同取值范围的字母 **自由指标** 不作和的指标, 要替换必须全部替换 **例** 证明 $\text{tr}(AB) = A_{jk}B_{kj} \xrightarrow{\text{换符号}} A_{kj}B_{jk} \xrightarrow{\text{标量可换序}} B_{jk}A_{kj} = \text{tr}(BA)$

内积的指标表示 $\vec{A} \cdot \vec{B} = a_i b_i = \delta_{ij} a_i b_j$ **注** 哑指标不能重复, 属于不同内积的要改用不同指标符号区分

例 $u_i + a_j b_j c_i = a_j a_j b_k c_k a_i$ 表示 $\vec{U} + (\vec{A} \cdot \vec{B}) \vec{C} = |\vec{A}|^2 (\vec{B} \cdot \vec{C}) \vec{A}$

全微分 $(d\varphi)_i = dx_j \partial_j \varphi_i$ 梯度 $(\nabla \varphi)_i = \partial_i$ **例** $(\nabla r)_i = \partial_i \sqrt{x_j x_j} = \frac{1}{2\sqrt{x_j x_j}} \partial_i (x_j x_j) = \frac{1}{2r} 2x_j \partial_i x_j = \frac{1}{r} x_j \delta_{ij} = \frac{x_i}{r}$

散度 $\nabla \cdot \vec{A} = \partial_i a_i$ **例** $\nabla \cdot \vec{r} = \partial_i x_i = \delta_{ii} = 3$ 拉普拉斯 $\nabla^2 \varphi = \partial_i^2 \varphi$ 散度的梯度 $[\nabla(\nabla \cdot \vec{A})]_i = \partial_i \partial_j a_j$

符号

Kronecker symbol

克罗内克符号 $\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & (i=j) \\ 0 & (i \neq j) \end{cases} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (行 $i=1,2,3$ 列 $j=1,2,3$)

substitution tensor

性质 $\delta_{ij} = \delta_{ji}$, $\delta_{ii} = 3$, $\delta_{ij} a_i = a_j$, $\delta_{ij} a_j = a_i$ (故又称 **替换张量**), $\delta_{ij} \delta_{jk} = \delta_{ik}$

Levi-Civita symbol

列维-奇维塔符号 $\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} 0 & (\text{有相同}) \\ 1 & (\text{偶排列}) \\ -1 & (\text{奇排列}) \end{cases} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}_{i=1} \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{i=2} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{i=3}$ (行 j 列 k)

alternating tensor

(又称 **交错张量**) **性质** $\varepsilon_{ijk} = \varepsilon_{jki} = \varepsilon_{kij} = -\varepsilon_{jik}$, $\varepsilon_{iik} = 0$, $\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{ijk} = \text{所有项平方和} = 6$

矢积指标表示 $(\vec{A} \times \vec{B})_i = \varepsilon_{ijk} a_j b_k$ 三重积 $[\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}]_i = a_i (\vec{B} \times \vec{C})_i = \varepsilon_{ijk} a_i b_j c_k$

旋度 $(\nabla \times \vec{A})_i = \varepsilon_{ijk} \partial_j a_k$ **例** $(\nabla \times \vec{r})_i = \varepsilon_{ijk} \partial_j x_k = \varepsilon_{ijk} \delta_{jk} = 0$ **例** 证拉格朗日恒等式 $(\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}))_i =$

$$\varepsilon_{ijk} a_j (\vec{B} \times \vec{C})_k = \varepsilon_{ijk} a_j \varepsilon_{klm} b_l c_m = (\delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}) a_j b_l c_m = a_m b_i c_m - a_j b_j c_i = b_i (\vec{A} \cdot \vec{C})_i - c_i (\vec{A} \cdot \vec{B})_i$$

广义列奇符号 $\varepsilon_{\mu\nu\alpha\beta\dots}$, 有相同 $=0$, 偶排列 $=1$, 奇排列 $=-1$

例 2 阶 $\varepsilon_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$, $\varepsilon_{ij} \varepsilon_{mn} = \begin{vmatrix} \delta_{im} & \delta_{in} \\ \delta_{jm} & \delta_{jn} \end{vmatrix} \rightarrow \varepsilon_{ij} \varepsilon_{in} = \delta_{jn} \rightarrow \varepsilon_{ij} \varepsilon_{ij} = 3$ (4 阶见 < 伪欧 >)

广义克罗内克符号 $\delta_{lmn}^{ijk} = \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{lmn} = \begin{vmatrix} \delta_{il} & \delta_{im} & \delta_{in} \\ \delta_{jl} & \delta_{jm} & \delta_{jn} \\ \delta_{kl} & \delta_{km} & \delta_{kn} \end{vmatrix}$ 当 i, j, k 和 l, m, n 都顺序或逆序时 $=1$
(6 阶张量) 一顺一逆时 $=-1$, 其它非序排列 $=0$

缩并 $\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{imn} = \delta_{jm} \delta_{kn} - \delta_{jn} \delta_{km} \equiv \delta_{mn}^{jk} \rightarrow \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{ijn} = 2 \delta_{kn} \rightarrow \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{ijk} = 3!$

并矢

dyadic

并矢 两矢量并列 (省略张量积 \otimes 符号) $\vec{A}\vec{B} = a_i b_j \vec{e}_i \vec{e}_j$, 其中 $\vec{e}_i \vec{e}_j$ 称为 **并矢基元** (共 9 个)

代表对矢量的线性映射 $\vec{A}\vec{B} \cdot \vec{r} = \vec{A}(\vec{B} \cdot \vec{r})$, $\vec{r} \cdot \vec{A}\vec{B} = (\vec{r} \cdot \vec{A})\vec{B}$ (只作用于最近邻) **例** $\vec{e}_x \cdot \vec{A}\vec{B} \cdot \vec{e}_y = a_x b_y$

性质 并矢运算以及数乘, 满足结合律, 分配律, $\vec{A}\vec{B} \neq \vec{B}\vec{A}$ **定义** 并矢的转置 $(\vec{A}\vec{B})^T = \vec{B}\vec{A}$

单位并矢 $\vec{I} = \delta_{ij} \vec{e}_i \vec{e}_j$ **性质** $\vec{I} \cdot \vec{A} = \vec{A} \cdot \vec{I} = \vec{A}$, $\vec{I} \cdot \vec{I} = \vec{I} \cdot \vec{I} = \vec{I}$

二阶张量 ① 张量的代数定义 $\vec{T} = T_{kl} \vec{e}_k \vec{e}_l = T'_{ij} \vec{e}_i' \vec{e}_j'$ \Leftrightarrow ② 分析定义: 分量按 $T'_{ij} = R_{ik} R_{jl} T_{kl}$ 变换

\Leftrightarrow ③ 多重线性函数定义 $f: (\vec{A}, \vec{B}) \mapsto y \in \mathbb{R}$, $f = T_{ij} a_i b_j$ 对每个变量均线性, 则其系数构成张量

triadics

三并矢 $\vec{A}\vec{B}\vec{C} = a_i b_j c_k \vec{e}_i \vec{e}_j \vec{e}_k$ (共 27 个基元) **三阶张量** $\vec{T} = T_{ijk} \vec{e}_i \vec{e}_j \vec{e}_k$ 变换方式 $T'_{ijk} = R_{il} R_{jm} R_{kn} T_{lmn}$

性质 同阶的张量可以相加减, 结果仍为同阶张量, 有交换律 **张量相等** 所有分量都相等

并矢内积

张量内积 $\vec{T} \cdot \vec{A} = T_{ij} a_k (\vec{e}_j \cdot \vec{e}_k) = T_{ij} a_j \vec{e}_i$, $\vec{T} \cdot \vec{S} = T_{ij} S_{jl} \vec{e}_i \vec{e}_l$, 不可交换

double dot

双点乘 $\vec{T} : \vec{A} \vec{B} = (\vec{T} \cdot \vec{A}) \vec{B} \rightarrow \vec{T} : \vec{S} = T_{ij} S_{ji}$ **例** $\vec{T} : \vec{T} = T_{ii} = \text{tr } \vec{T}$, $\vec{T} : \vec{A} \vec{B} = \vec{A} \cdot \vec{B}$, $\vec{T} : \nabla \nabla = \nabla^2$

矢积的并矢表示 $\vec{A} \times \vec{B} = \epsilon : \vec{A} \vec{B} = \vec{A} \vec{B} : \epsilon$ **例** $\vec{T} \times \vec{k} = -\vec{T} \cdot \epsilon \cdot \vec{k}$, $\vec{k} \times \vec{T} = -\vec{k} \cdot \epsilon \cdot \vec{T}$, $\vec{T} \times \vec{S} = -\vec{T} \cdot \epsilon \cdot \vec{S}$

并矢 (即张量积) 运算的阶: 直接相加, 叉乘: 再减 1 阶, 点乘减 2 阶, 双点乘减 4 阶

例 $\vec{A} \vec{B} \cdot \vec{C} \vec{D} = (\vec{B} \cdot \vec{C}) \vec{A} \vec{D}$, **串联** $\vec{A} \vec{B} \cdot \vec{C} \vec{D} = (\vec{B} \cdot \vec{C}) (\vec{A} \cdot \vec{D})$ **并联** $\vec{A} \vec{B} : \vec{C} \vec{D} = (\vec{A} \cdot \vec{C}) (\vec{B} \cdot \vec{D})$

并矢的矢场微分 $\nabla \cdot (\vec{A} \vec{B}) = (\nabla \cdot \vec{A}) \vec{B} + (\vec{A} \cdot \nabla) \vec{B}$, $\nabla \times (\vec{A} \vec{B}) = (\nabla \times \vec{A}) \vec{B} - (\vec{A} \cdot \nabla) \vec{B}$

(若微分算符后没有括号, 则表示只对紧邻张量进行)

梯度升一阶, 散度降一阶, 旋度不变 **例** $\nabla \vec{r} = \vec{I}$, $\nabla \cdot (\varphi \vec{I}) = \nabla \varphi$

$\nabla \cdot (\vec{A} r^2) = r^2 \nabla \cdot \vec{A} + 2 \vec{r} \cdot \vec{A}$, $\nabla \cdot (\vec{A} \vec{r}) = (\nabla \cdot \vec{A}) \vec{r} + \vec{A}$, $\nabla \cdot (\vec{A} \vec{r} \vec{r}) = (\nabla \cdot \vec{A}) \vec{r} \vec{r} + \vec{A} \vec{r} + \vec{r} \vec{A}$

场量的泰勒展开 $f(\vec{r}) = f(\vec{r}_0) + \nabla f(\vec{r}_0) \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0) + \frac{1}{2!} \nabla \nabla f(\vec{r}_0) : (\vec{r} - \vec{r}_0) (\vec{r} - \vec{r}_0) + \dots$

例 $f(\vec{r} - \vec{r}_0) = f(\vec{r}) - \nabla f(\vec{r}) \cdot \vec{r}_0 + \frac{1}{2!} \nabla \nabla f(\vec{r}) : \vec{r}_0 \vec{r}_0 + \dots$ $\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}_0|} = \frac{1}{r} + \frac{\vec{r}_0 \cdot \vec{e}_r}{r^2} + \frac{\vec{r}_0 \vec{r}_0 : (3 \vec{e}_r \vec{e}_r - \vec{I})}{2r^3} + \dots$

[$\vec{e}_r \vec{e}_r : \vec{I} = \vec{e}_r \cdot \vec{e}_r = 1$, $\vec{r}_0 \vec{r}_0 : \vec{I} = r_0^2$] 第三项分子亦可写成 $(3 \vec{r}_0 \vec{r}_0 - r_0^2 \vec{I}) : \vec{e}_r \vec{e}_r$

张量

[引入矢量乃至高阶张量, 是为了使物理学定律写成与坐标系无关的形式]

tensor

张量 (里奇 1890) 多重线性量 (广义的数量), r **阶** 张量有 r 组 **指标**, n 维空间的张量共有 n^r 个分量

例 标量为零阶张量, 矢量为一阶张量, 矩阵为二阶张量

不同基下像张量一样变换即为张量 **例** 证 $\partial_j a_i$ 是 2 阶张量 $\frac{\partial a_i}{\partial x_j} \xrightarrow{A \text{ 是矢量}} R_{ik} \frac{\partial a_k}{\partial x_j} = R_{ik} \frac{\partial a_k}{\partial x_l} \frac{\partial x_l}{\partial x_j} = R_{ik} R_{jl} \frac{\partial a_k}{\partial x_l}$

quotient rule

商法则 若 $a_i = T_{ij} b_j$ 在任何坐标系对任意矢量 \vec{B} 成立, 则 T_{ij} 是张量

[$a_i \xrightarrow{A \text{ 是矢量}} R_{ik} a_k = R_{ik} T_{kj} b_j \xrightarrow{B \text{ 是矢量}} R_{ik} T_{kj} R_{mj} b'_m \xrightarrow{\text{任何系}} T'_{im} b'_m \rightarrow (T'_{im} - R_{ik} T_{kj} R_{mj}) b'_m \xrightarrow{\text{任何 } B} 0$]

可推广为: 若 m 阶张量 A 和 n 阶张量 B 通过 $(m+n)$ 个指标的量 T 线性联系, 则 T 是 $(m+n)$ 阶张量

isotropic tensor

各向同性张量 其分量在所有坐标系都不变 **例** $\delta'_{ij} = R_{ik} R_{jm} \delta_{km} = R_{ik} R_{jk} = \delta_{ij}$, 而 δ 的确在任何坐标系定义都一样, 故 δ 是 (2 阶对称) 张量, 同理可证 $\epsilon'_{ijk} = \epsilon_{ijk}$ 是 (3 阶反对称) 张量 **定理** 1 阶各向同性只有零矢量, 2 阶都是 δ 的倍数, 3 阶都是 ϵ 的倍数, 4 阶各向同性张量可表示成 $T_{ijkl} = \lambda \delta_{ij} \delta_{kl} + \mu \delta_{ik} \delta_{jl} + \nu \delta_{il} \delta_{jk}$

symmetric tensor

对称张量 $T_{ij} = T_{ji}$, 一般为 6 个独立分量 (主轴坐标系下剩 3 个, 即 **主值**) (对 n 维有 $\frac{1}{2}n(n+1)$ 个)

性质 $\epsilon_{ijk} T_{jk} = 0$ [$0 = \epsilon_{mni} \epsilon_{ijk} T_{jk} = (\delta_{mj} \delta_{nk} - \delta_{mk} \delta_{nj}) T_{jk} = T_{mn} - T_{nm}$]

张量的 **对称化** 对选中指标的所有排列取算数平均 **例** $T_{(ij)k(l)} = \frac{1}{3!} (T_{ijkl} + T_{jlk i} + T_{likj} + T_{iljk} + T_{ljk i} + T_{jikl})$

若已对称则不变 $T_{\mu\nu} = T_{(\mu\nu)}$, 若做对称化的指标是哑标则有 **传染性** $T^{(\mu\nu)} F_{\mu\nu} = T^{(\mu\nu)} F_{(\mu\nu)}$

antisymmetric tensor

反对称张量 $T_{ij} = -T_{ji}$, 3 个独立分量 (对于 n 维有 $\frac{1}{2}(n-1)n$ 个) **性质** $\text{tr}(T) = 0$

张量的 **反对称化** 同理, 但奇排列变减号 **例** $T_{[ij]k[l]} = \frac{1}{3!} (T_{ijkl} + T_{jlk i} + T_{likj} - T_{iljk} - T_{ljk i} - T_{jikl})$

记 T 的 **全反对称化张量** 为 $[T] = \frac{1}{k!} \delta_i^{j_1 \dots j_k} T_{j_1 \dots j_k}$ **性质** [] 运算对加法和数乘有线性性, 对张量积有结合律

定理 任何张量可表示成对称和反对称之和 $T_{ij} = \frac{1}{2}(T_{ij} + T_{ji}) + \frac{1}{2}(T_{ij} - T_{ji}) = T_{(ij)} + T_{[ij]}$

性质 坐标变换不改变对称性 (混合张量除外) [已知 $T_{ij} = T_{ji}$ 则 $T'_{ij} = R_{ik} R_{jm} T_{km} = R_{jm} R_{ik} T_{mk} = T'_{ji}$]

外积

V^n 中的 p 阶反对称张量, 称为 p 次外形式, 简称 p 形式 $[T] \in V_{[p]}^n$


设任意张量 $T \in V_p^n, F \in V_q^n$, **外积 / 楔积** $T \wedge F = \frac{(p+q)!}{p!q!} T_{[i \dots F_{j \dots]} \in V_{[p+q]}^n$
(若 $p+q > n$ 则 $T \wedge F = 0 \in V_{[0]}^n$)

定义在 V^n 上的 $V_{[p]}^n$ 共 $n+1$ 个 \rightarrow **格拉斯曼代数** (1844) $\{\bigoplus_{p=0}^{n+1} V_{[p]}^n, +, \wedge\}$

性质 $\varphi \wedge T = \varphi T$, 线性性, 结合律, **斜交换律** $T \wedge F = (-1)^{pq} F \wedge T$

例 两矢量外积 $\vec{A} \wedge \vec{B} = \frac{2!}{1!1!} a_{[i} b_{j]} = \vec{A} \vec{B} - \vec{B} \vec{A} = -\vec{B} \wedge \vec{A}$

推论 线性相关矢量外积为零, $\vec{A} \wedge \vec{A} = 0$ 几何意义: $\vec{A} \wedge \vec{B} =$ 有向面积, 3 矢量外积为有向体积



对偶

Hodge dual

霍奇对偶 / 星算符 $*: V_{[p]}^n \rightarrow V_{[n-p]}^n, T \mapsto *T \equiv \frac{\sqrt{|g|}}{p!} \delta_{i_1 \dots i_n}^{j_1 \dots j_p} T^{i_1 \dots i_p} \omega_{j_1 \dots j_n}$ (0 $\leq p \leq n$) **性质** 线性性, **对偶性** $**T = (-1)^{p(n-p)} T$ **例** E^3 中有 4 种对偶: $*\varphi = \varphi \vec{e}_1 \wedge \vec{e}_2 \wedge \vec{e}_3, *(a^i \vec{e}_i) = \sum a^i \vec{e}_2 \wedge \vec{e}_3, *(\sum T^{12} \vec{e}_1 \wedge \vec{e}_2) = \sum T^{23} \vec{e}_1$ (\sum 表示指标轮换, 3 项求和) **推论** $\vec{A} \times \vec{B} = *(\vec{A} \wedge \vec{B}) \rightarrow$ 外积和矢积同构 (V^n 中, $(n-1)$ 个矢量外积, 得 1 个和它们都垂直矢量的矢量, 故称外积为矢积的推广)

外微分

构造方法: 从 n 个基底微分中选 p 个外积, 这 C_n^p 种外积设上系数 (f, φ, P, Q, R 均为坐标的函数) 作和

p 形式	$n=1$	$n=2$	$n=3$	$d\omega$	$n=1$	$n=2$
0 形式	$f(x)$	$f(x, y)$	$f(x, y, z)$	1 形式	$f' dx$	$\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$
1 形式	φdx	$P dx + Q dy$	$P dx + Q dy + R dz$	2 形式	0	$\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx \wedge dy$
2 形式		$\varphi dx \wedge dy$	$P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy$	3 形式		0
3 形式			$\varphi dx \wedge dy \wedge dz$			

3 维 p 形式的物理意义 **例** 0 形式: 标量场, 1 形式: 做功 $\vec{F} \cdot d\vec{l}$, 2 形式: 通量 $\vec{B} \cdot d\vec{S}$, 3 形式: 质量 ρdV

例 1 形式外积 ($1 \wedge 1 \rightarrow 2$) $(P_1 dx + Q_1 dy + R_1 dz) \wedge (P_2 dx + Q_2 dy + R_2 dz) = \begin{vmatrix} dy \wedge dz & dz \wedge dx & dx \wedge dy \\ P_1 & Q_1 & R_1 \\ P_2 & Q_2 & R_2 \end{vmatrix}$
($1 \wedge 2 \rightarrow 3$) $(P_1 dx + Q_1 dy + R_1 dz) \wedge (P_2 dy \wedge dz + Q_2 dz \wedge dx + R_2 dx \wedge dy) = (P_1 P_2 + Q_1 Q_2 + R_1 R_2) dx \wedge dy \wedge dz$

设 $\omega = \sum f dx_1 \wedge dx_2 \wedge \dots \wedge dx_p$ **外微分** 系数对所有基全微分, 其它同 p 形式, 共 C_n^p 种作和

$d\omega = \sum \left(\sum \frac{\partial f}{\partial x_i} dx^i \right) \wedge dx_1 \wedge dx_2 \wedge \dots \wedge dx_p$ **性质** 0 形式外微分就是微分, p 形式的外微分为 $(p+1)$ 形式

例 $\omega = P dx + Q dy$, 则 $d\omega = \left(\frac{\partial P}{\partial x} dx + \frac{\partial P}{\partial y} dy \right) \wedge dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} dx + \frac{\partial Q}{\partial y} dy \right) \wedge dy = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy$

庞加莱引理 $d d\omega = 0$ 「既交换又反交换」

积分公式

generalized Stokes' theorem

广义斯托克斯定理 $\int_G d\omega = \int_{\partial G} \omega$, 高维区域积分等于低一次形式在区域边界上的积分

n	p	$\int_{(p+1)\text{维}} (p+1)\text{形式} = \oint_{(p)\text{维}} (p)\text{形式}$	名称
1	0	$\int_a^b f' dx = f(b) - f(a)$	微积分基本定理
3	0	$\int_a^b \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} dx + \frac{\partial \varphi}{\partial y} dy + \frac{\partial \varphi}{\partial z} dz \right) = \varphi(b) - \varphi(a)$	梯度定理
2	1	$\iint_S \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy$	格林公式
3	1	$\iiint_V \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy + R dz$	斯托克斯定理
3	2	$\iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \iiint_S P dy dz + Q dz dx + R dx dy$	高斯定理

斜角坐标系

oblique

斜角坐标系 设有非正交非归一基 g_1, g_2 , 夹角为 θ , $\vec{A} = a^1 g_1 + a^2 g_2$

a^i 称为 \vec{A} 的 **逆变分量** (投影 \neq 分量), g_i 称为 **协变基矢**

引入另一组 **对偶基** $g^1 \perp g_1, g^2 \perp g_2$ (详见《高代》), 有 $\vec{A} = a_1 g^1 + a_2 g^2$

a_i 称为 \vec{A} 的 **协变分量**, g^i 称为 **逆变基矢**, 取其长度 $|g^i| = \frac{1}{|g_i| \sin \theta}$

从而满足 **对偶条件** $g^i \cdot g_j = \delta_j^i \rightarrow$ **内积** 用逆变乘协变来表示较简便 $\vec{A} \cdot \vec{B} = (a^i g_i) \cdot (b_j g^j) = a^i b_j \delta_i^j = a^i b_i$

对于三维斜角系, 取三个斜交的 g_i , 为右手系时混合积为正, 记 $[g_1, g_2, g_3] = \sqrt{g}$

对偶基矢 的构造方式为 $g^1 = \frac{1}{\sqrt{g}}(g_2 \times g_3)$, 有 $g^1 \cdot g_1 = 1$, 从而满足对偶条件

推论 $[g^1, g^2, g^3] = \frac{1}{\sqrt{g}}$ 故也为右手系, $g_1 = \sqrt{g}(g^2 \times g^3)$

度规张量 $g_{ij} \equiv g_i \cdot g_j, g^{ij} \equiv g^i \cdot g^j$ **性质** 均为对称矩阵, $[\delta_j^i = g^{ik} g_k \cdot g_j = g^{ik} g_{kj}]$ 互为逆矩阵, $|g_{ij}| = g$

\rightarrow **基矢分解** $g^i = g^{ij} g_j, g_i = g_{ij} g^j$ **指标升降** $a^i = \vec{A} \cdot g^i = (a_j g^j) \cdot g^i = g^{ij} a_j, a_i = g_{ij} a^j$

从而 **内积** 可表示为 $\vec{A} \cdot \vec{B} = a^i b_i = a_i b^i = g^{ij} a_i b_j = g_{ij} a^i b^j$

(直角系有 **自对偶性** $a^i = a_i$ $[g_{ij} = \delta_{ij}]$, 故此前未区分逆变和协变, 指标均写在下方)

斜系转动变换

g_i 和直角系的转换关系为 $g_i = \sum \frac{\partial x}{\partial u^i} e_x$ $[g_i \cdot (\nabla u^j) = \frac{\partial x^k}{\partial u^i} \frac{\partial u^j}{\partial x^k} = \delta_i^j]$ **推论** $g^i = \nabla u^i$

对于曲线系, $d\vec{r} = g_i du^i = g^i du_i, g_i = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u^i}$, 基矢变换方式为 $g_i = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u^i} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u^j} \frac{\partial u^j}{\partial u^i} = R_i^j g_j$

雅可比矩阵 $R_i^j \equiv \frac{\partial u^j}{\partial u^i}$ (写成(新)' = R(旧), 撇号在下为协变, 在上为逆变)

$[\vec{A} = a^j g_j = a^i g_i = a^i R_i^j g_j]$ 某一分量的变换方式和基矢相反 $a^i = R_j^i a^j$, 逆变基矢同理 $g^i = R_j^i g^j$

例 分量 u^i 的全微分 du^i 是逆变矢量 $[du^i = \frac{\partial u^i}{\partial u^j} du^j]$

梯度 $\partial_i \varphi$ 是协变矢量 $[\frac{\partial \varphi}{\partial u^i} = \frac{\partial \varphi}{\partial u^j} \frac{\partial u^j}{\partial u^i}]$ 亦可用商法则来证 $[d\varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial u^i} du^i, \text{而 } du^i \text{ 是任意逆变矢量}]$

度规张量的变换方式为 $(g^i)_{ij} \equiv g_{ij} = g_i \cdot g_j = R_i^k g_k \cdot R_j^l g_l = R_i^k R_j^l g_{kl}$, 同理可证 $g_{ij} = R_i^k R_j^l g_{kl}$

混合张量

张量总可用并矢基表示 $T = T^{ij}_k e^i e_j e_k$ (并矢不可交换, 故每个指标需明确占一列以区分前后 $T^i_j \neq T_j^i$)

逆变张量 $T^{ij} = R_i^k R_j^l T^{kl}$ **协变张量** $T_{ij} = R_i^k R_j^l T_{kl}$ **混合张量** $T^i_j = R_i^k R_j^l T^k_l, T_i^j = R_i^k R_j^l T^j_l$

例 克罗内克符号是混合张量 $\delta^i_j = R_i^k R_j^l \delta^k_l, \delta^k_l = R_i^k R_j^l \delta^i_j = \frac{\partial u^i}{\partial u^j} = \delta^i_j$

高阶张量 依此类推 **推论** 若某个坐标系下, 张量的所有分量在某点为零, 则任何坐标系下该点都恒为零

张量的 **指标升降** 不可变前后顺序 **例** $T_{ij} = T_i^l g_l = g_{ik} T^k_j = g_{ik} T^{kl} g_l$

交换指标的前后顺序 (不改变上下) 称为张量的 **转置**, 对不同指标, 转置的结果不同

\rightarrow **对称张量** 可以不区分前后顺序 (混合指标一般不定义对称性, 克罗内克符号是特例)

张量积 **例** $T \otimes F = U \Leftrightarrow T^{ij} F_k^l = U^{ij}_k{}^l$, 一般不可交换 **张量内积** **例** $T^{ij}_k F^k_{jl} = U^i_l$

contraction

缩并 同一张量中一上一下指标相同, 按求和约定应视为内积并消掉 $[\text{可以证明结果是降两阶的张量}]$


例 $T^{ilj}_{kl} = F^{ij}_k$, 顺序不同张量不同 $T^{ilj}_{kl} \neq T^{ijl}_{kl}$

注 同为上标或下标不可缩并或做内积, 因为求和结果不一定是张量

Eddington

爱丁顿张量 $\varepsilon_{ijk} \equiv [g_i, g_j, g_k] = \pm \sqrt{g}, 0, \varepsilon^{ijk} = \pm 1/\sqrt{g}, 0$ (偶/奇排列规则同列奇符号)

$\varepsilon_i{}^{jk} = \pm g_{ii}/\sqrt{g}, 0$, 另有 $= \pm g_{li}/\sqrt{g}$ (当 $i=j$ 或 $j=k$, 且 ljk 是偶/奇排列时) $[\varepsilon_i{}^{jk} = g_{li} \varepsilon^{ljk}]$



伪欧空间

不要求内积正定 → **伪欧氏空间** (详见〈高代〉) **性质** g_{ij} 是不定对称矩阵, 存在基底使 $g_{ij} = \pm \delta_{ij}$
Minkowski Space

号差 三个维度同号, 一个维度异号的四维伪欧空间称为 **闵氏空间** (以下均以闵氏空间为例)

(伪欧必须区分逆变协变) 仿射 (平直) 闵氏空间的 **度规** 记作 $\eta_{\mu\nu} = \eta^{\mu\nu} = \text{diag}[1 \ -1 \ -1 \ -1]$ 〈狭相〉

内积 $a^\mu b_\mu = a_\mu b^\mu = \eta_{\mu\nu} a^\mu b^\nu = \eta^{\mu\nu} a_\mu b_\nu = a^0 b^0 - \vec{a} \cdot \vec{b}$ (上标指第 0 分量) **例** $\eta_\mu^\rho = \eta_{\mu\nu} \eta^{\nu\rho} = \delta_\mu^\rho$

逆变坐标 $x^\mu = (ct, x, y, z)$ (列矢量) **协变坐标** $x_\mu = (ct, -x, -y, -z)$, $(ds)^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$

单位张量 (四维) $\delta_\nu^\mu x^\nu = x^\mu$, 迹 $\delta_\mu^\mu = 4$ **性质** $\eta, \delta, \varepsilon$ 均为各向同性张量

Ricci tensor density

里奇符号 (实际上是张量密度 $\tilde{\varepsilon}$, 此处懒得区分) $\varepsilon^{0123} = +1$, $\varepsilon_{0123} = -1$

公式 $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \varepsilon_{\mu\nu\tau\omega} = -2(\delta_\tau^\rho \delta_\omega^\sigma - \delta_\omega^\rho \delta_\tau^\sigma)$, $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \varepsilon_{\mu\nu\rho\tau} = -6\delta_\tau^\sigma$, $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} = -4!$

$$\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \varepsilon_{\alpha\beta\tau\omega} = - \begin{vmatrix} \delta_\alpha^\mu & \delta_\beta^\mu & \delta_\tau^\mu & \delta_\omega^\mu \\ \delta_\alpha^\nu & \delta_\beta^\nu & \delta_\tau^\nu & \delta_\omega^\nu \\ \delta_\alpha^\rho & \delta_\beta^\rho & \delta_\tau^\rho & \delta_\omega^\rho \\ \delta_\alpha^\sigma & \delta_\beta^\sigma & \delta_\tau^\sigma & \delta_\omega^\sigma \end{vmatrix}$$

若 $F^{\mu\nu}$ 是反对称张量, 则它的 **对偶** 是赝张量 $*F^{\mu\nu} = \frac{1}{2} \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma}$ (几何上表示垂直的面) 内积 $F^{\mu\nu} * F_{\mu\nu}$ 是赝标量, 矢量的对偶是三阶反对称赝张量 $*F^\mu = \frac{1}{3!} \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\nu\rho\sigma}$ (几何上表示法向量), $*F^{\mu\nu\rho} = \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_\sigma$

推动变换

boost
伪欧空间的等距变换为 **推动 / 伪转动**

(〈狭相〉中称为 **洛伦兹变换** LT)

(上标 μ 记行, 下标 ν 记列)

$$\Lambda_\nu^\mu = \begin{bmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cosh \xi & -\sinh \xi & 0 & 0 \\ -\sinh \xi & \cosh \xi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

公式 $\Lambda_\nu^\mu \Lambda_\rho^\nu = \delta_\rho^\mu \rightarrow \Lambda_\nu^\mu \Lambda_\mu^\nu = 4$ **注** $\Lambda_\nu^\mu = (\Lambda^{-1})^\mu_\nu$ 本章不必区分前后

标量 不随坐标系的推动变换 **例** 内积, 固有量, 电量, 4 体积元 d^4x 等

4 矢量 分量变换方式为: 矩阵写法 $\vec{x}' = \vec{\Lambda} \vec{x}$, 指标表示 $x'^\mu = \Lambda_\nu^\mu x^\nu$, 对偶的变换方式相反 $x_\mu = \Lambda_\mu^\nu x_\nu$
[$V = V^\nu e_\nu = V'^\mu e_\mu' = \Lambda_\nu^\mu V^\nu e_\mu' \rightarrow e_\nu = \Lambda_\nu^\mu e_\mu'$] 基矢和分量的变换方式相反 $e_\mu' = \Lambda_\mu^\nu e_\nu$, $e^\mu' = \Lambda_\nu^\mu e^\nu$

张量 分量变换方式为: 矩阵写法 (不能换序) $\eta = \Lambda^T \eta \Lambda$, 指标表示 $(\eta')^{\mu\nu} = \Lambda_\rho^\mu \Lambda_\sigma^\nu \eta^{\rho\sigma}$

[间隔不变 $(\Delta s)^2 = (\Delta x)^T \eta (\Delta x) = (\Delta x')^T \eta (\Delta x') = (\Delta x)^T \Lambda^T \eta \Lambda (\Delta x)$, 狭相中称为相对性原理]

伪欧中的微分

[$\frac{\partial}{\partial x^\mu} = \frac{\partial x^\nu}{\partial x^\mu} \frac{\partial}{\partial x^\nu} = \Lambda_\mu^\nu \frac{\partial}{\partial x^\nu}$] **逆变导数** $\partial^\mu \equiv \sum \frac{\partial}{\partial x_\mu} = (\frac{1}{c} \partial_t, -\nabla)$ **协变导数** $\partial_\mu \equiv \sum \frac{\partial}{\partial x^\mu} = (\frac{1}{c} \partial_t, \nabla)$
cogradient

例 标量的 4 梯度是 4 矢量 $\partial_\mu \phi = (\frac{1}{c} \partial_t \phi, \nabla \phi)$, 4 矢量的散度是标量 $\partial_\mu x^\mu = \delta_\mu^\mu \rightarrow \partial_\mu x^\mu = 4$

性质 $\partial^\mu x^\nu = \eta^{\mu\nu}$, $\partial_\mu x_\nu = \eta_{\mu\nu}$, $\partial^\mu = \eta^{\mu\nu} \partial_\nu$, $\partial_\mu \partial_\nu = \partial_\nu \partial_\mu$ (是对称张量)

d'Alembert operator

达朗贝尔算符 $\square^2 = \partial^\mu \partial_\mu = \frac{1}{c^2} \partial_t^2 - \nabla^2$ (或记作 \square , 不推荐) (是标量算符) (东岸度规与此相反)

复欧空间

注 实伪欧空间可等效地表示成复真欧空间

例 **复闵氏空间** 取 $x_\mu = x^\mu = (ict, x, y, z)$ 亦可实现非正定内积

(此为泡利度规, 已弃用, 把 t 换成 it 的 trick 仅限狭相, 不适用于广相)

[$\cos \vartheta = \gamma$, $\sin \vartheta = i\gamma\beta$, $\tan \vartheta = i\beta = i \tanh \theta = \tanh(i\theta)$]

Wick rotation

LT 表现为复闵空间的 **维克转动** → LT 构成 $SO(4)$ 群 〈群论〉

