

Đề thi số: 1

**Bài thi môn:** Giải Tích II

**Số tín chỉ:** 4

**Lớp:** MAT1042-21, MAT1042-23

**Thời gian làm bài:** 90 phút

**Câu 1** (2.0 đ). Cho hàm số:  $z = (x - y) \cdot \sqrt{x^2 + y^2}$ . Tính  $z'_x(0,0), z'_y(0,0)$ .

**Câu 2** (2.0 đ). Tính tích phân hai lớp:  $\iint_D x^2 dx dy$ ,  $D$  là miền phẳng được giới hạn bởi các đường:  $y = x^2, x = y^2$ .

**Câu 3** (2.0 đ). Tính tích phân:  $I = \oint_C (xy + x + y + \sin^3 x) dx + (xy + x - y + 2^y) dy$ , với  $C$

là đường tròn:  $x^2 + y^2 = 2x + 2y$ , chiều  $C$  ngược chiều kim đồng hồ.

**Câu 4** (2.0 đ). Tính diện tích mặt cầu bán kính  $R$ .

**Câu 5** (2.0 đ). Giải phương trình vi phân:  $y'' - y = 2x + 1 - xe^x$ .

----- Hết -----

*Sinh viên không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.*

Họ và tên sinh viên:.....; Số báo danh:.....

## Đáp án - Đề số 1

### Câu 1 (2.0 đ):

$$(1.0) \quad z'_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{z(x,0) - z(0,0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0.$$

$$(1.0) \quad z'_y(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{z(0,y) - z(0,0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} (-|y|) = 0.$$

### Câu 2 (2.0 đ):

$$(1.0) \quad \text{Vẽ hình. } D = \{0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq \sqrt{x}\}.$$

$$(1.0) \quad \text{Do đó, } \iint_D x^2 dx dy = \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} x^2 dy = \int_0^1 (x^{5/2} - x^4) dx = \left[ \frac{2}{7} x^{7/2} - \frac{1}{5} x^5 \right]_0^1 = \frac{3}{35}.$$

### Câu 3 (2.0 đ):

$$(0.5) \quad \text{Vẽ hình. Ta có: } P = xy + x + y + \sin^3 x; Q = xy + x - y + 2^y.$$

$\Rightarrow P'_y = x + 1; Q'_x = y + 1$ : các đạo hàm riêng liên tục trên miền D được giới hạn bởi đường cong kín C.

(0.5) Dùng công thức Green đối với đường cong kín C:

$$I = \iint_D (Q'_x - P'_y) dx dy = \iint_D (y - x) dx dy.$$

$$(0.5) \quad \text{Đặt: } x = 1 + r \cos \varphi, y = 1 + r \sin \varphi, |J| = r, D_{r\varphi} = \{0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq r \leq \sqrt{2}\}.$$

$$(0.5) \quad \text{Do đó, } I = \iint_{D_{r\varphi}} r^2 (\sin \varphi - \cos \varphi) dr d\varphi = \int_0^{2\pi} (\sin \varphi - \cos \varphi) d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} r^2 dr =$$
$$= [-\sin \varphi - \cos \varphi]_0^{2\pi} \cdot \left[ \frac{r^3}{3} \right]_0^{\sqrt{2}} = 0.$$

### Câu 4 (2.0 đ):

$$(0.5) \quad \text{Phương trình nửa trên mặt cầu S: } z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}.$$

$$dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} = \frac{R dx dy}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}.$$

Hình chiếu của nửa trên mặt cầu xuống mp xOy là miền  $D_{xy} = \{x^2 + y^2 \leq R^2\}.$

$$(0.5) \quad \text{Diện tích của mặt cầu: } DT = 2 \iint_S dS = 2 \iint_{D_{xy}} \frac{R dx dy}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}.$$

$$(0.5) \quad \text{Đặt: } x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi, |J| = r, D_{r\varphi} = \{0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq r \leq R\}.$$

$$(0.5) \quad \text{Do đó, } DT = 2R \iint_{D_{r\varphi}} \frac{r dr d\varphi}{\sqrt{R^2 - r^2}} = -R \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R (R^2 - r^2)^{-1/2} d(R^2 - r^2) =$$

$$= -4\pi R \cdot \sqrt{R^2 - r^2} \Big|_0^R = 4\pi R^2 .$$

**Câu 5 (2.0 đ)**

(0.5) Pt không thuần nhất:  $y'' - y = 2x + 1 - xe^x$

Pt thuần nhất:  $y'' - y = 0$

Pt đặc trưng:  $k^2 - 1 = 0 \rightarrow k = 1, k = -1$

Nghiệm tổng quát của pt thuần nhất:  $y^*(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$

(0.5) Nghiệm riêng của pt không thuần nhất tìm dưới dạng:

$$\bar{y}(x) = Ax + B + x \cdot e^x \cdot (Cx + D)$$

(1.0) Dùng phương pháp đồng nhất thức:  $A = -2, B = -1, C = -\frac{1}{4}, D = \frac{1}{4}$

Nghiệm tổng quát của pt không thuần nhất:

$$y(x) = y^*(x) + \bar{y}(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - 2x - 1 + x e^x \left( -\frac{1}{4}x + \frac{1}{4} \right).$$

Đề thi số: 2

**Bài thi môn:** Giải Tích II

**Số tín chỉ:** 4

**Lớp:** MAT1042-21, MAT1042-23

**Thời gian làm bài:** 90 phút

**Câu 1** (2.0 đ). Cho hàm số:  $z = (2x - y) \cdot \sqrt{x^2 + y^2}$ . Tính  $z'_x(0,0), z'_y(0,0)$ .

**Câu 2** (2.0 đ). Tính tích phân hai lớp:  $\iint_D \sqrt{x} dx dy$ ,  $D$  là miền phẳng được giới hạn bởi các đường:  $y = x^2, x = y^2$ .

**Câu 3** (2.0 đ). Tính tích phân:  $I = \oint_C (xy + x + y + \sin^3 x) dx + (xy + x - y + 2^y) dy$ , với  $C$  là đường tròn:  $x^2 + y^2 = 2x - 2y$ , chiều  $C$  ngược chiều kim đồng hồ.

**Câu 4** (2.0 đ). Tính diện tích mặt cầu bán kính  $R$ .

**Câu 5** (2.0 đ). Giải phương trình vi phân:  $y'' - y = 3x + 2xe^x$ .

----- Hết -----

**Sinh viên không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.**

Họ và tên sinh viên:.....; Số báo danh:.....

## Đáp án - Đề số 2

### Câu 1 (2.0 đ):

$$(1.0) \quad z'_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{z(x,0) - z(0,0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (2|x|) = 0.$$

$$(1.0) \quad z'_y(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{z(0,y) - z(0,0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} (-|y|) = 0.$$

### Câu 2 (2.0 đ):

$$(1.0) \quad \text{Vẽ hình. } D = \{0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq \sqrt{x}\}.$$

$$(1.0) \quad \text{Do đó, } \iint_D \sqrt{x} dx dy = \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} \sqrt{x} dy = \int_0^1 (x - x^{5/2}) dx = \left[ \frac{1}{2} x^2 - \frac{2}{7} x^{7/2} \right]_0^1 = \frac{3}{14}.$$

### Câu 3 (2.0 đ):

$$(0.5) \quad \text{Vẽ hình. Ta có: } P = xy + x + y + \sin^3 x; Q = xy + x - y + 2^y.$$

$\Rightarrow P'_y = x + 1; Q'_x = y + 1$ : các đạo hàm riêng liên tục trên miền D được giới hạn bởi đường cong kín C.

$$(0.5) \quad \text{Dùng công thức Green đối với đường cong kín C:}$$

$$I = \iint_D (Q'_x - P'_y) dx dy = \iint_D (y - x) dx dy.$$

$$(0.5) \quad \text{Đặt: } x = 1 + r \cos \varphi, y = -1 + r \sin \varphi, |J| = r, D_{r\varphi} = \{0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq r \leq \sqrt{2}\}.$$

$$(0.5) \quad \text{Do đó, } I = \iint_{D_{r\varphi}} [r^2 (\sin \varphi - \cos \varphi) - 2r] dr d\varphi = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} [r^2 (\sin \varphi - \cos \varphi) - 2r] dr = \\ = \int_0^{2\pi} \left( \frac{2\sqrt{2}}{3} \sin \varphi - \frac{2\sqrt{2}}{3} \cos \varphi - 2 \right) d\varphi = -4\pi.$$

### Câu 4 (2.0 đ):

$$(0.5) \quad \text{Phương trình của nửa trên mặt cầu S: } z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}.$$

$$dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} = \frac{R dx dy}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}.$$

Hình chiếu của nửa trên mặt cầu xuống mp xOy là miền  $D_{xy} = \{x^2 + y^2 \leq R^2\}.$

$$(0.5) \quad \text{Diện tích của mặt cầu: } DT = 2 \iint_S dS = 2 \iint_{D_{xy}} \frac{R dx dy}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}.$$

$$(0.5) \quad \text{Đặt: } x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi, |J| = r, D_{r\varphi} = \{0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq r \leq R\}.$$

$$(0.5) \quad \text{Do đó, } DT = 2R \iint_{D_{r\varphi}} \frac{r dr d\varphi}{\sqrt{R^2 - r^2}} = -R \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R (R^2 - r^2)^{-1/2} d(R^2 - r^2) =$$

$$= -4\pi R \cdot \sqrt{R^2 - r^2} \Big|_0^R = 4\pi R^2 .$$

**Câu 5 (2.0 đ)**

(0.5) Pt không thuần nhất:  $y'' - y = 3x + 2xe^x$

Pt thuần nhất:  $y'' - y = 0$

Pt đặc trưng:  $k^2 - 1 = 0 \rightarrow k = 1, k = -1$

Nghiệm tổng quát của pt thuần nhất:  $y^*(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$

(0.5) Nghiệm riêng của pt không thuần nhất tìm dưới dạng:

$$\bar{y}(x) = Ax + B + x \cdot e^x \cdot (Cx + D)$$

(1.0) Dùng phương pháp đồng nhất thức:  $A = -3, B = 0, C = \frac{1}{2}, D = -\frac{1}{2}$

Nghiệm tổng quát của pt không thuần nhất:

$$y(x) = y^*(x) + \bar{y}(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - 3x + x e^x \left( \frac{1}{2} x - \frac{1}{2} \right).$$