

# Espacios Métricos 2

$$\text{Sea } (E, d)$$

$$x \in E$$



$$r > 0$$

$$\Rightarrow B(x, r) = \{y \in E : d(x, y) < r\}$$

o

$$\overline{B}(x, r) = \{y \in E : d(x, y) \leq r\}$$

$$(\mathbb{R}^2, d_2)$$



$$\text{Si } E = \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow d(x, y) = |x - y|$$

$$\Rightarrow B(x, r) = \{y \in \mathbb{R} : d(x, y) < r\}$$

$$= \{y \in \mathbb{R} : |x - y| < r\}$$

$$r < x - y < r$$

$$x - r < y < x + r$$

$$= \{y \in \mathbb{R} : x - r < y < x + r\}$$

$$= (x - r, x + r)$$

Para pensar:

$$\text{Se } E = \mathbb{Z}$$

$$x = 3$$

Mostrar

$$B(x, r) \text{ y } \overline{B}(x, r) \quad \text{para } r = \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}$$

$$r = \frac{1}{2}:$$

$$B(\underbrace{3}_x, \underbrace{\frac{1}{2}}_r) = \left\{ y \in \mathbb{Z} : d(3, y) < \frac{1}{2} \right\}$$

$$\underbrace{| \underbrace{3}_{\in \mathbb{Z}} - \underbrace{y}_{\in \mathbb{Z}} |}_{\in \mathbb{Z}} < \underbrace{\frac{1}{2}}_{\in \mathbb{Q}}$$

$$\Rightarrow \underbrace{3 - \frac{1}{2}}_{\notin \mathbb{Z}} < y < \underbrace{3 + \frac{1}{2}}_{\notin \mathbb{Z}} \quad \leftarrow \checkmark$$

Como  $y \in \mathbb{Z}$

sospecho


$$\Rightarrow 3 - \frac{1}{2} < 3 \leq y \leq 3 < 3 + \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow y = 3$$

? Preguntar  
o Proceder:


∴

$$B(3, \frac{1}{2}) = \{ 3 \}$$




Similarmente

$$\mathcal{B}(3, 1) = \{3\}$$




$$\mathcal{B}(3, \frac{3}{2}) = \{2, 3, 4\} = [2, 4] \in \mathbb{Z}$$


Para la bola cerrada,




$$\overline{\mathcal{B}}(3, \frac{1}{2}) = \{3\}$$



$$\overline{\mathcal{B}}(3, 1) = \{2, 3, 4\}$$



$$\overline{\mathcal{B}}(3, \frac{3}{2}) = \{2, 3, 4\}$$



$\Rightarrow$  Los abiertos son  $\{3\}$ ,  $\{2, 3, 4\}$

$\Rightarrow$  Los cerrados son su complemento:

$$\mathbb{Z} \setminus \{3\}, \mathbb{Z} \setminus \{2, 3, 4\}.$$

**Definición**

Sea  $A \subset E$ . Decimos que  $x$  es un **punto interior** de  $A$  si existe algún  $r > 0$  tal que  $B(x, r) \subset A$ .

**Definición**

Sea  $A \subset E$ . El **interior de  $A$**  es el conjunto de todos los puntos interiores de  $A$ , y lo notamos  $A^\circ$ .

**Definición**

Un conjunto  $G \subset E$  se dice **abierto** si cada punto de  $G$  es un punto interior de  $G$  (análogamente, si  $G = G^\circ$ ).

**Observación**

Un conjunto  $G \subset E$  es abierto si y sólo si para todo  $x \in G$  existe algún  $r > 0$  tal que  $B(x, r) \subset G$ .

### Ejercicio (guía)

$$x \in E$$

$$r > 0$$

Probar que  $\underbrace{B(x, r)}_{\text{Bola abierta}}$  es un conjunto abierto

Pero primero,


### Ejercicio ★


$$x \in E$$

$$r > 0$$

$$a \in B$$



Lo pienso en  $(\mathbb{R}^2, d_2)$





$$\text{Si } l = r - d(x, a)$$

$$\Rightarrow B(a, l) \subset B(x, r)$$



Esquema de resolución:

$$\hookrightarrow \text{Sea } y \in B(a, l) \Rightarrow \dots$$

$$\dots \Rightarrow y \in B(x, r)$$

Pista: Desig. Triang.

### Proposición

Se tienen las siguientes propiedades:

- (i)  $A^\circ \subset A$ .
- (ii)  $A_1 \subset A_2$ , entonces  $A_1^\circ \subset A_2^\circ$ .
- (iii)  $A^\circ$  es un conjunto abierto.
- (iv) Si  $G$  es abierto y  $G \subset A$ , entonces  $G \subset A^\circ$ .

$A^\circ$  es el mayor abierto contenido en  $A$

Dem iv)  $G$  abierto,  $G \subset A$

Uso esquema de enter:

Sea  $x \in G$

q.v.q  $x \in A$

Como  $G$  es abierto

$$\Rightarrow \exists r > 0 \mid B(x, r) \subset G$$

$G \subset A$

$$\Rightarrow \exists r > 0 \mid B(x, r) \subset A$$

$$\Rightarrow x \in A^\circ$$

Probé que

$$\text{Si } x \in G \Rightarrow x \in A^\circ$$



Finite o Infinito

### Teorema

La unión de cualquier familia o colección de conjuntos abiertos es abierta.

La intersección de finitos conjuntos abiertos es abierta.

Finitos!

Dem:

$(G_i)_{i \in I}$        $I$  conjunto de índices finito o infinito  
con  $G_i$  abierto  $\forall i \in I$

$\neq \emptyset$

$A = \bigcup_{i \in I} G_i$  es abierto?

Sea

$$x \in A = \bigcup_{i \in I} G_i$$

$$\Rightarrow \exists i_0 \in I \mid x \in G_{i_0}$$

Como  $G_{i_0}$  es abierto

$$\Rightarrow \exists r > 0 \mid B(x, r) \subset G_{i_0} \subset \bigcup_{i \in I} G_i = A$$

$$\Rightarrow \exists r > 0 \mid B(x, r) \subset A$$

∴ Probé que  $A$  es abierto.

□

Ejercicio:

Probar que

$A = \bigcap_{i \in I} G_i$  es abierto, con  $I$  conjunto de índices finitos

Sea

$$x \in A = \bigcap_{i \in I} G_i$$

$$\Rightarrow x \in G_i \quad \forall i \in I$$

como  $G_i$  es abierto

$$\Rightarrow \exists r > 0 \mid B(x, r) \subset G_i$$

$\forall i \in I$ , pues todos los  $G_i$  son abiertos, y  $x \in G_i \quad \forall i$

$$\Rightarrow \exists r > 0 \mid B(x, r) \subset A$$

∴  $A$  es abierto

□

Ej:

Buscar un ejemplo de  $\infty$  abiertos con intersección no abierta.

?  $[0, 1] \subset \mathbb{R}$



### Ejercicio

Decidir si son ciertas las siguientes afirmaciones:

$$(A \cup B)^\circ = A^\circ \cup B^\circ \quad (A \cap B)^\circ = A^\circ \cap B^\circ$$

Pista :

Para este tipo de ejercicios (interiores, abiertos, cerrados, clausuras)

los Racionales e  $\mathbb{I}$  racionales suelen ser útiles:

Elijo :

$$E = \mathbb{R}$$

$$A = \mathbb{Q}$$

$$B = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$

$$\Rightarrow (A \cup B)^\circ = (\mathbb{Q} \cup \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})^\circ = \mathbb{R}^\circ \stackrel{\mathbb{R} \text{ es abierto}}{\downarrow} = \mathbb{R}$$

$$A^\circ \cup B^\circ = \mathbb{Q}^\circ \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})^\circ = \mathbb{Q} \cup \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} = \mathbb{R}$$

$\uparrow$   
 $\mathbb{Q}$  es abierto  
 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  es abierto

∴

$$(A \cup B)^\circ = A^\circ \cup B^\circ$$

□

?

$$\text{Otro) } (A \cap B)^\circ = (\mathbb{Q} \cap \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})^\circ \stackrel{\text{disjuntos}}{\downarrow} = \emptyset^\circ = \emptyset$$

$$A^\circ \cap B^\circ = \mathbb{Q} \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) = \emptyset$$

**Definición**

Un conjunto  $V \subset E$  se llama un entorno de  $x$  si existe un conjunto abierto  $G$  tal que  $x \in G \subset V$ .

**Observación**

El conjunto  $V$  es un entorno de  $x$  si y sólo si  $x \in V^\circ$ .

Un conjunto  $G$  es abierto si y sólo si es un entorno de cada  $x \in G$ .

**Definición**

Decimos que  $x$  es un punto de adherencia del conjunto  $A \subset E$  si para todo  $r > 0$ ,  $A \cap B(x, r) \neq \emptyset$ .

Es equivalente decir que para todo  $r > 0$ , existe  $a \in A$ , tal que  $a \in B(x, r)$ .

**Definición**

La clausura de  $A \subset E$  es el conjunto  $\bar{A}$  formado por todos los puntos (de  $E$ ) de adherencia del conjunto  $A$ .

Intuitivamente

$$\bar{A} = \{ \text{Puntos de } A + \text{Puntos pegados a } A \}$$

**Proposición**

Sean  $A, B \subset E$ .

(i)  $A \subset \bar{A}$ .

(ii) Si  $A \subset B$  entonces  $\bar{A} \subset \bar{B}$   $\rightarrow$  VER

(iii)  $\bar{\bar{A}} = \bar{A}$ .

$\rightarrow$  si  $x \in A \Rightarrow x$  es de adhi.  $\Rightarrow x \in \bar{A}$

Dem iii)

$$\bullet \bar{A} \subset \overline{(\bar{A})} \text{ por i)}$$

$$\bullet \text{ Veamos que } \overline{\bar{A}} \subset \bar{A}$$

$$\text{Sea } x \in \overline{(\bar{A})}$$

$$\forall \epsilon > 0 \\ x \in \bar{A}$$

$$\text{Como } x \in \bar{A}$$

$$\Rightarrow \text{Dado } r > 0, \exists a \in \left( B(x, r) \cap \bar{A} \right)$$

$$\text{Sea } \ell = r - d(a, x)$$

$$\Rightarrow B(a, \ell) \subset B(x, r)$$

ej. ★

Como

$$a \in \bar{A}$$

$$\Rightarrow \underbrace{B(a, \ell)}_{\subset B(x, r)} \cap A \neq \emptyset$$

$$\Rightarrow B(x, r) \cap A \neq \emptyset$$

Probé que, dado cualquier  $r > 0$ , esto vale

$$\Rightarrow x \in \overline{A}$$

$$\therefore \text{ si } x \in \overline{A} \Rightarrow x \in \overline{A}$$

$$\text{ o sea } \overline{\overline{A}} \subseteq \overline{A}$$

y como sabemos que

$$\overline{A} \subseteq \overline{\overline{A}}$$

$$\Rightarrow \overline{\overline{A}} = \overline{A}$$



### Ejercicio

Decidir si son ciertas las siguientes afirmaciones:

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B} \quad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cap \overline{B}.$$

**Definición**

Un conjunto se llama cerrado si  $F = \bar{F}$ .

**Teorema**

$A$  es cerrado si y sólo si  $A^c$  es abierto.

$$A^c = E \setminus A$$

Dem :

$\Rightarrow$ ) Sabemos que  $A$  es cerrado  
y  $A^c$  es abierto

$$\text{Sea } x \in A^c \Rightarrow x \notin A = \bar{A}$$

$$\Rightarrow x \notin \bar{A}$$

$$\Rightarrow \exists r > 0 / B(x, r) \cap A = \emptyset$$

$$\Rightarrow \exists r > 0 / B(x, r) \cap A^c \neq \emptyset$$

$$\Rightarrow \exists r > 0 / B(x, r) \subset A^c$$

$\therefore A^c$  es Abierto.

### Observación

(i)  $\bar{A}$  es cerrado;

(ii)  $A \subset \bar{A}$ ;

(iii) Si  $F$  es un cerrado y  $A \subset F$ , entonces  $\bar{A} \subset \bar{F} \subset F$ .

$$A \subset F, F \text{ cerrado} \Rightarrow \bar{A} \subset F$$

$\bar{A}$  es EL MENOR cerrado que contiene a  $A$ .

$$A^\circ \subset A \subset \bar{A}$$

$\downarrow$  el menor cerrado que contiene a  $A$

mayor abierto contenido en  $A$

10/12

### Teorema

i La intersección de cualquier familia o colección de conjuntos cerrados es cerrada.

ii La unión de finitos conjuntos cerrados es cerrada.

Dem i) 2 maneras

↳ Por def. (ejercicio)

↳ Usando propiedades que conocemos

Como si:  $A$  es cerrado  $\Leftrightarrow A^c$  es abierto

Puedo usar herramientas de abiertos en cerrados:

Usando el Teorema de Abiertos

$(F_i)_{i \in I}$  con  $F_i$  cerrado  $\forall i \in I$

$$A = \bigcap_{i \in I} F_i$$

Como

$F_i$  es cerrado  $\forall i$


Teo  $\Rightarrow F_i^c$  es abierto  $\forall i$

1° Teo  $\Rightarrow \bigcup_{i \in I} F_i^c$  es abierto  
Unión de Abiertos

Teo  $\Rightarrow \left( \bigcup_{i \in I} F_i^c \right)^c$  es cerrado



Por Ley de De Morgan



$$\left( \bigcup_{i \in I} F_i^c \right)^c = \bigcap_{i \in I} F_i$$

$$\therefore \bigcap_{i \in I} F_i = A \text{ es cerrado}$$



ii) Ejercicio,


### Ejercicio

Consideremos el espacio métrico  $\mathbb{Z}$  con la distancia dada por el módulo de la diferencia.

¿Cuáles son los subconjuntos abiertos de  $\mathbb{Z}$ ? ¿Y los cerrados?

$$E = \mathbb{Z}$$

$$d = |x - y|$$



Usar que  $\{3\}$  es abierto  $\uparrow$   
(ver al principio).



