
Análisis I - Análisis Matemático I - Matemática I - Análisis II (C)

2do. cuatrimestre 2020

Simulacro del Primer Parcial - 14/10/2020

Ejercicio 1: Sea C la curva que se obtiene como la intersección de las superficies


$$x^2 + y^2 - z = 0 \quad y \quad x^2 - 4x + y^2 + z = 0$$

- (a) Hallar una función $r(t)$ cuya imagen describa la curva C
- (b) Verificar que el punto $P = (1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 2 - \sqrt{2})$ pertenece a la curva C y hallar la ecuación de la recta tangente a C en el punto P

• $x^2 + y^2 = 1$

• $x^2 + y^2 = 4 = 2^2$

• $x^2 + y^2 = 9 = 3^2$



a) $\cancel{x^2} + \cancel{y^2} - z = \cancel{x^2} - 4x + \cancel{y^2} + z$

$$4x = 2z$$

$$x = \frac{1}{2}z$$

por eq 1

$$x = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$$

Polares

$$\begin{cases} x = r \cdot \cos \theta \\ y = r \cdot \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

$$\boxed{1} \quad z = x^2 + y^2 \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} z &= r^2 & r &\in [0, +\infty) \\ x &= r \cdot \cos \theta & \theta &\in [0, 2\pi) \\ y &= r \cdot \sin \theta \end{aligned}$$

$$\boxed{2} \quad z = 4x - (x^2 + y^2) \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} z &= 4 \cdot r \cdot \cos \theta - r^2 \\ x &= r \cdot \cos \theta \\ y &= r \cdot \sin \theta \\ r &\in [0, +\infty) \\ \theta &\in [0, 2\pi) \end{aligned}$$

Igualo $\boxed{1}$ con $\boxed{2}$

$$x = r \cdot \cos \theta \quad \swarrow \text{Coinciden en } \boxed{1} \text{ y } \boxed{2}$$

$$y = r \cdot \sin \theta$$

y además

$$\begin{cases} z = r^2 \\ z = 4 \cdot r \cdot \cos \theta - r^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow r^2 = 4 \cdot r \cdot \cos \theta - r^2$$

$$0 = 4r \cdot \cos \theta - 2r^2$$

$$0 = 2r (2 \cos \theta - r)$$

$$r > 0$$

$$0 = 2 \cos \theta - r$$

$$\boxed{r = 2 \cos \theta}$$

Volviendo

$$x = r \cdot \cos \theta \Rightarrow 2 \cos^2 \theta$$

$$y = r \cdot \sin \theta \Rightarrow 2 \cos \theta \cdot \sin \theta$$

$$z = r^2 \Rightarrow 4 \cos^2 \theta$$

Finalmente, puedo definir

$$\sigma(t) = (2 \cos^2 t, 2 \cos t \cdot \sin t, 4 \cos^2 t)$$

$$\text{con } t \in [0, 2\pi)$$

$$b) \sigma(t) = (2 \cos^2 t, 2 \cos t \cdot \sin t, 4 \cos^2 t)$$

Ignorab coord. e coord.

$$\begin{cases} 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} = 2 \cos^2 t & \textcircled{\text{I}} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} = 2 \cos t \cdot \sin t & \textcircled{\text{II}} \\ 2 - \sqrt{2} = 4 \cos^2 t & \textcircled{\text{III}} \end{cases}$$

Si

$$1 - \frac{\sqrt{2}}{2} = 2 \cos^2 t \Rightarrow \cos^2 t = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{4}$$

$$|\cos t| = \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{4} \right)^{1/2}$$

$$\swarrow \cos t = \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{4} \right)^{1/2} \quad \textcircled{\text{I}}$$

$$\searrow \cos t = - \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{4} \right)^{1/2} \quad \textcircled{\text{II}}$$

$$\textcircled{\text{I}} \quad t_1 = \underset{\text{calculadora}}{\arccos} \left(\left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{4} \right)^{1/2} \right)$$

$$t_1 \downarrow = \frac{3}{8} \pi$$

$$\cos t_1 \approx 0,38 \in [0, 2\pi) \quad \checkmark$$

$$\textcircled{\text{II}} \quad t_2 = \arccos \left(- \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{4} \right)^{1/2} \right)$$

$$t_2 \downarrow \text{calc} = \frac{5}{8} \pi$$

$$\cos t_2 = -0,38 \notin [0, 2\pi)$$

∴ el punto P pertenece a la curva C cuando $t = \frac{3}{8}\pi$

Busca recta tangente a C en P

Derivo $\sigma(t)$:

$$\sigma(t) = (2 \cos^2 t, 2 \cos t \cdot \sin t, 4 \cos^2 t)$$

$$\sigma'(t) = (-4 \cos t \cdot \sin t, -2 \sin^2 t + 2 \cos^2 t, -8 \cos t \cdot \sin t)$$



Evalúo en $t = \frac{3}{8}\pi$

$$\sigma'(\frac{3}{8}\pi) = (-\sqrt{2}, -\sqrt{2}, -2\sqrt{2})$$

↑ dirección tangente a la curva

Defino recta L como

$$L : (x, y, z) = P + \alpha (-\sqrt{2}, -\sqrt{2}, -2\sqrt{2})$$



Ejercicio 2: Calcular los siguientes límites:

$$(a) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x-1)^2 \sin(x^2)y}{x^2 + y^4} \quad \leq \quad \frac{\uparrow \uparrow \uparrow}{\downarrow \downarrow \downarrow}$$

$$(b) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{xy} - 1}{x^2 + y^2}$$

a) Sospecho que no existe por ese denominador

$$\text{Si } x = y^2$$

$$\sigma(t) = \left(\underbrace{t^2}_x, \underbrace{t}_y \right)$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{(y^2-1)^2 \cdot \sin(y^4) \cdot y}{y^4 + y^4} =$$

$$= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{(y^2-1)^2 \cdot \sin(y^4) \cdot y}{2 \cdot y^4} \rightarrow 1$$

Sabemos que

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(t)}{t} = 1$$

$$= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{(y^4 - 2y^2 + 1) \cdot y}{2} = 0 \quad \parallel$$

Otra curva

$$y = x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x-1)^2 \cdot \sin(x^2) \cdot x}{x^2 + x^4} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x-1)^2 \cdot \sin(x^2) \cdot x}{x^2(1+x^2)} = \frac{(x-1)^2 \cdot \sin(x^2)}{x+x^3} \stackrel{L'H}{=} \frac{2(x-1) \cdot \sin x^2 + (x-1)^2 \cdot \cos x^2 \cdot 2x}{1+3x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x-1)^2 \cdot x}{1+x^2}$$

$$\frac{(x^2 - 2x + 1)x}{x^2 + 1}$$

$$y = m \cdot x$$

$$x = m y$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x-1)^2 \cdot \sin(x^2) \cdot m x}{x^2 + m^4 x^4}$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{(m y - 1)^2 \cdot \sin(m^2 y^2) \cdot y}{m^2 y^2 + y^4}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x-1)^2 \cdot \sin(x^2) \cdot m x}{x(x + m^4 x^3)}$$

$$= (m-1) \cdot \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin(m^2 y^2)}{m^2 y + y^3}$$

$$\stackrel{L'H}{\downarrow} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{m \cdot \cos(x^2) \cdot 2x}{1 + 2m^4 x^2} = 0$$

$$\stackrel{L'H}{\downarrow} = (m-1) \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\cos(m^2 y^2) \cdot m^2 \cdot 2y}{m^2 + 3y}$$

$$= 0$$

$$y = x^a$$

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x-1)^2 \cdot \sin(x^2) \cdot x^a}{x^2 + x^{4a}} & \stackrel{1.}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{2x^{3/2}} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x^2 \cdot 2x}{2 \cdot \frac{3}{2} \cdot x^{1/2}} \\
 & \quad 2x^2 \qquad 2x^{\frac{3}{2}} \qquad = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cdot \cos x^2}{3x^{1/2}} \\
 & \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\overbrace{2 \cdot \cos x^2}^{-2} - \overbrace{4x^2 \cdot \sin x^2}^{=0}}{\frac{3}{2} \cdot x^{-1/2}}
 \end{aligned}$$

$$(b) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{xy} - 1}{x^2 + y^2}.$$

$$\text{Si } y = x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{2 \cdot x^2}$$

L'H

$$\downarrow = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} \cdot \cancel{2x}}{2 \cdot \cancel{2x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2}}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\text{Si } y = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^0 - 1}{x^2} = 0$$

Como encontré 2 límites
distintos \Rightarrow el límite
no existe

Ejercicio 3: Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2 - \sin(x^4)}{x^2 + \frac{1}{3} y^2} + 2 & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ a & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Hallar, si es posible, un valor de $a \in \mathbb{R}$ para que $f(x, y)$ sea continua en todo \mathbb{R}^2 . ¿Es f diferenciable para algún a ?

Veo $x=0$

$$f(0, y) = \frac{0 - \sin(0)}{0^2 + \frac{1}{3} y^2} + 2 = 2$$

↑
Candidato a a

$$\left| \underbrace{\frac{x^2 \cdot y^2 - \sin(x^4)}{x^2 + \frac{1}{3} y^2}}_{\neq 0} + 2 - \underbrace{2}_a \right| \leq \left| \frac{x^2 \cdot y^2 - \sin(x^4)}{\frac{1}{3} x^2 + \frac{1}{3} y^2} \right|$$

$$\frac{1}{3} x^2 \leq x^2 \quad x \geq 0$$

DesigT,

$$\leq \frac{x^2 \cdot y^2}{\frac{1}{3}(x^2 + y^2)} + \frac{\overbrace{|\sin(x^4)|}^{\leq x^4}}{\frac{1}{3}(x^2 + y^2)}$$

$$\leq \frac{\|(x, y)\|^4}{\frac{1}{3}\|(x, y)\|^2} + \frac{\|(x, y)\|^4}{\frac{1}{3}\|(x, y)\|^2}$$

$$= 3\|(x, y)\|^2 + 3\|(x, y)\|^2$$

$$= 6\|(x, y)\|^2 \xrightarrow{(x, y) \rightarrow (0, 0)} 0$$

∴ Si $a=2 \Rightarrow f$ es continua en todo \mathbb{R}^2 .

Es diferenciable? a debe ser 2 para que f sea continua.
Solo si

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - \left(\overset{2}{f(0,0)} + f_x(0,0) \cdot (x-0) + f_y(0,0) \cdot (y-0) \right)}{\|(x,y)\|} \stackrel{?}{=} 0$$

Calculo derivadas parciales

$$f_x(x,y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h}$$

$$f_x(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0) - \overset{2}{f(0,0)}}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h^2 \cdot 0 - \sin(h^4)}{h^2} + 2 - 2}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \cdot \frac{\sin h^4}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h^4}{h^3}$$

L'H

$$\downarrow = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(h^4) \cdot 4h^3}{3h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4 \cdot \cos(h^4) \cdot h}{3}$$

$$f_x(0,0) = 0$$

$$\begin{aligned}
 f_y(0,0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0,h) - \overbrace{f(0,0)}^{=2}}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\underbrace{\frac{0 - \sin(0)}{0 + \frac{1}{3}h^2}}_{=0} + 2 - 2 \right) \frac{1}{h}
 \end{aligned}$$

$$f_y(0,0) = 0$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - \left(\overbrace{f(0,0)}^{=2} + \overbrace{f_x(0,0)}^0 \cdot (x-0) + \overbrace{f_y(0,0)}^{=0} (y-0) \right)}{\|(x,y)\|}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{\|(x,y)\|} \cdot \left(f(x,y) - \overbrace{f(0,0)}^{=2} \right)$$

Acoto

$$\left| \frac{1}{\|(x,y)\|} \left(\frac{x^2 y^2 - \sin x^4}{x^2 + \frac{1}{3} y^2} + 2 - 2 \right) \right| =$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{\|(x,y)\|} \left| \underbrace{\frac{x^2 y^2 - \sin x^4}{x^2 + \frac{1}{3} y^2}}_{\text{lo acoté arriba}} \right| \leq \frac{1}{\|(x,y)\|} \left(\frac{x^2 y^2}{\frac{1}{3}(x^2 + y^2)} + \frac{|\sin(x^4)|}{\frac{1}{3}(x^2 + y^2)} \right) \\
 &\leq \frac{\|(x,y)\|^4}{\frac{1}{3}\|(x,y)\|^3} + \frac{\|(x,y)\|^4}{\frac{1}{3}\|(x,y)\|^3}
 \end{aligned}$$

$$= 6 \| (x, y) \| \xrightarrow{(x, y) \rightarrow (0, 0)} 0$$

$\therefore f(x, y)$ es diferenciable en $(0, 0)$

con $a = 2$,

Además $f(x, y)$ es diferenciable $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$

Pues es suma, resta, producto, composición y cociente (con denominador distinto de cero) de funciones diferenciables (polinomios y la función seno).

$\therefore f(x, y)$ es diferenciable $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 //$

Ejercicio 4: Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable tal que el plano tangente a su gráfico en el punto $(1, 2, f(1, 2))$ es

$$-x - 2y + z = -1.$$

Si $x = 3s + t^2$ e $y = 2s^2 + 2t$ y definimos $F(s, t) = f(x, y)$, calcular la ecuación del plano tangente al gráfico de F en el punto $(0, 1, F(0, 1))$.

$$\begin{cases} x = 3s + t^2 \\ y = 2s^2 + 2t \end{cases}$$

$$F(s, t) = f(3s + t^2, 2s^2 + 2t)$$

Plano tangente a F

$$P_1(0, 1) = F(0, 1) + \left. \frac{\partial F}{\partial s}(s, t) \right|_{(0, 1)} (s - 0) + \left. \frac{\partial F}{\partial t}(s, t) \right|_{(0, 1)} (t - 1)$$

$$F(0, 1) = ?$$

$$\begin{cases} x = 3s + t^2 \\ y = 2s^2 + 2t \end{cases} \Big|_{(0, 1)} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \end{cases}$$

$$F(0, 1) = f(1, 2)$$

↗ Ver su plano tangente en el $(1, 2)$ pues coinciden

$$f(1, 2) = x + 2y - 1 \Big|_{(1, 2)}$$

$$= 1 + 4 - 1$$

$$F(0, 1) = 4$$

Cálculo derivadas parciales

$$\frac{\partial}{\partial s} F(s,t) = \frac{\partial f}{\partial x}(x(s,t), y(s,t)) \cdot \frac{\partial x}{\partial s}(s,t) + \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) \cdot \frac{\partial y}{\partial s}(s,t)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} F(s,t) = \frac{\partial f}{\partial x}(x(s,t), y(s,t)) \cdot \frac{\partial x}{\partial t}(s,t) + \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) \cdot \frac{\partial y}{\partial t}(s,t)$$

Coinciden con las derivadas del plano
pues es su polinomio de grado 1.

$$\text{Plano : } z = x + 2y - 1$$

$$\bullet \frac{\partial f}{\partial x} = 1$$

$$\bullet \frac{\partial f}{\partial y} = 2$$

$$\frac{\partial x}{\partial s}(s,t) = \frac{\partial}{\partial s}(3s + t^2) = 3$$

$$\frac{\partial x}{\partial t}(s,t) = 2t$$

$$\frac{\partial x}{\partial t}(0,1) = 2$$

$$\frac{\partial y}{\partial s}(s,t) = \frac{\partial}{\partial s}(2s^2 + 2t) = 4s$$

$$\frac{\partial y}{\partial s}(0,1) = 0$$

$$\frac{\partial y}{\partial t}(s,t) = 2$$

Finalmente

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial s} F(s, t) &= \frac{\partial f}{\partial x}(x(s, t), y(s, t)) \cdot \frac{\partial x}{\partial s}(s, t) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \cdot \frac{\partial y}{\partial s}(s, t) \\ \frac{\partial}{\partial t} F(s, t) &= \frac{\partial f}{\partial x}(x(s, t), y(s, t)) \cdot \frac{\partial x}{\partial t}(s, t) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \cdot \frac{\partial y}{\partial t}(s, t)\end{aligned}$$

$$\frac{\partial}{\partial s} F(0, 1) = 3$$

$$\frac{\partial}{\partial t} F(0, 1) = 2 + 4 = 6$$

Volviendo a la ecuación del plano

$$P_1(0, 1) = F(0, 1) + \frac{\partial F}{\partial s}(s, t) \Big|_{(0, 1)} (s - 0) + \frac{\partial F}{\partial t}(s, t) \Big|_{(0, 1)} (t - 1)$$

$$P_1(0, 1) = 4 + 3s + 6(t - 1)$$

$$= 4 + 3s + 6t - 6$$

$$P_1(0, 1) = 3s + 6t - 2$$

Como F es diferenciable por ser composición de funciones diferenciables (f, x, y)

\Rightarrow Su plano tangente existe en $(0,1, F(0,1))$ y es

$$\Pi : w = 3s + t - 2$$

