

EMT-1 來源題

無解析版 · 答案在末頁

共 106 題 · 是非 0 題 · 選擇 106 題

選擇題 106 題

001. 《緊急醫療救護法》是在哪一天公布的？

- (A) 民國 84 年 8 月 9 日
- (B) 民國 86 年 7 月 11 日
- (C) 民國 89 年 2 月 2 日
- (D) 民國 96 年 7 月 11 日

002. 下列何者不屬於緊急傷病患？

- (A) 突然昏迷的病人
- (B) 牙痛的病人
- (C) 溺水的病人
- (D) 急產的孕婦

003. 救護紀錄表依法至少要保存幾年？

- (A) 3 年
- (B) 5 年
- (C) 7 年
- (D) 10 年

004. 救護車不是情況緊急卻使用警鳴器及紅色閃光燈，依《緊急醫療救護法》第 42 條的罰鍰是多少？

- (A) 新臺幣 1 萬元以上 5 萬元以下
- (B) 新臺幣 3 萬元以上 15 萬元以下
- (C) 新臺幣 6 萬元以上 30 萬元以下
- (D) 新臺幣 10 萬元以上 50 萬元以下

005. 下列哪一項，初級救護技術員不得施行？

- (A) 給予氧氣
- (B) 使用口咽呼吸道
- (C) 使用鼻咽呼吸道
- (D) 使用聲門上呼吸道

006. 初級救護技術員在證書效期三年內，要完成多少小時的繼續教育才能申請展延？

- (A) 12 小時
- (B) 24 小時
- (C) 36 小時
- (D) 72 小時

007. 依《緊急醫療救護法》第 18 條，救護車出勤至少要有幾名救護人員？

- (A) 1 名
- (B) 2 名
- (C) 3 名
- (D) 4 名

008. 上呼吸道與下呼吸道以哪裡為分界？

- (A) 鼻咽
- (B) 會厭
- (C) 聲門
- (D) 氣管隆凸

009. 哪一個解剖切面把人體分成前、後兩部分？

- (A) 矢狀切面
- (B) 冠狀切面
- (C) 正中切面
- (D) 水平切面

010. 摸得到橈動脈的脈搏，代表病人的收縮壓至少約多少 mmHg？

- (A) 60
- (B) 70
- (C) 80
- (D) 90

011. 下列何者不是八大生命徵象？

- (A) 血氧
- (B) 膚色
- (C) 瞳孔
- (D) 血糖

012. 評估昏迷指數時，病人能回答問題但答錯了，語言反應是幾分？

- (A) V2
- (B) V3
- (C) V4
- (D) V5

013. 評估昏迷指數時，給予痛刺激的方式是哪一種？

- (A) 捏肩
- (B) 按眼眶上緣
- (C) 搓胸骨
- (D) 按人中

014. 成人脈搏的正常值是每分鐘幾次？

- (A) 40~60 次
- (B) 60~100 次
- (C) 100~120 次
- (D) 120~140 次

015. 正常體溫的範圍是攝氏幾度？

- (A) 35.0~36.0 度
- (B) 36.5~37.5 度
- (C) 37.5~38.5 度
- (D) 38.0~39.0 度

016. 依 EMT-1 教材，血氧濃度低於多少視為供氧不足？

- (A) 90%
- (B) 92%
- (C) 94%
- (D) 96%

017. 使用口咽呼吸道之前，要先確認病人處於哪一種狀態？

- (A) 清醒
- (B) 對聲音刺激有反應
- (C) 對痛刺激有反應
- (D) 對痛刺激沒有反應

018. 為嬰兒做 CPR 時，壓胸的深度約幾公分？

- (A) 2 公分
- (B) 4 公分
- (C) 5 公分
- (D) 6 公分

019. 到院前心肺功能停止的病人當中，心室纖維顫動約占多少？

- (A) 10%
- (B) 20%
- (C) 40%
- (D) 80%

020. 成人嚴重異物哽塞後失去意識、倒在地上，第一步要做什麼？

- (A) 打開呼吸道
- (B) 吹氣一次
- (C) 壓胸 30 次
- (D) 目視有無適當呼吸

021. 關於袋瓣罩甦醒球的使用，下列何者錯誤？

- (A) 面罩尖端朝向下巴
- (B) 用 EC 手勢固定面罩
- (C) 接上氧氣與儲氣袋
- (D) 擠壓到胸部有起伏

022. 心室纖維顫動的病人如果沒有接受 CPR，存活率每分鐘約下降多少？

- (A) 1~2%
- (B) 3~4%
- (C) 7~10%
- (D) 15~20%

023. 兒童生存之鏈的第一個環節是什麼？

- (A) 預防
- (B) 啟動緊急應變
- (C) 高品質 CPR
- (D) 高級心肺復甦

024. 嬰兒有脈搏、但沒有正常呼吸時，人工呼吸多久給一次？ 不計分

- (A) 2~3 秒一次
- (B) 5~6 秒一次
- (C) 8~10 秒一次
- (D) 10~12 秒一次

025. 非創傷病人的評估順序，下列何者正確？

- (A) 意識 → 呼吸道 → 呼吸 → 循環 → 輔助檢查
- (B) 意識 → 呼吸 → 呼吸道 → 循環 → 輔助檢查
- (C) 呼吸道 → 意識 → 呼吸 → 循環 → 輔助檢查
- (D) 意識 → 循環 → 呼吸道 → 呼吸 → 輔助檢查

026. 成人清醒、有呼吸，要評估脈搏時摸哪裡？

- (A) 頸動脈
- (B) 橈動脈
- (C) 肱動脈
- (D) 股動脈

027. 下列何者不算危急狀況？

- (A) 小兒經評估為危急
- (B) 血氧濃度 91%
- (C) 急產或已在現場完成接生
- (D) 微血管充填時間超過 2 秒

028. 副手要變換頸椎限制方式時，主手改用哪一種頸椎限制術來協助？

- (A) 胸骨枕骨頸椎減移
- (B) 胸骨前額頸椎減移
- (C) 胸骨脊椎頸椎減移
- (D) 肩部頸椎減移

029. 螺旋包紮時，每一圈要蓋住上一圈的多少？

- (A) 四分之一到三分之一
- (B) 三分之一到二分之一
- (C) 二分之一到三分之二
- (D) 完全重疊

030. 全身血液約占體重的多少？

- (A) 五分之一
- (B) 十分之一
- (C) 十三分之一
- (D) 二十分之一

031. 關於抽吸，下列何者錯誤？

- (A) 抽吸前先給予氧氣
- (B) 抽吸管的長度量鼻尖到耳垂
- (C) 抽吸管放入口腔做口咽部抽吸
- (D) 抽吸時間少於 15 秒

032. 最有效而且最常用的止血法是哪一種？

- (A) 直接加壓止血
- (B) 抬高傷肢
- (C) 止血點止血
- (D) 止血帶止血

033. 固定肢體骨折時，要固定哪些部位？

- (A) 只固定骨折處
- (B) 骨折處和上方的關節
- (C) 骨折處和下方的關節
- (D) 骨折處和上下兩個關節

034. 非創傷病人的循環評估，不包含下列哪一項？

- (A) 脈搏
- (B) 微血管充填時間
- (C) 四肢膚色與溫度
- (D) 血糖

035. 評估病人的失能狀況 (XABCDE 的 D)，不包含下列哪一項？

- (A) 昏迷指數
- (B) 瞳孔
- (C) 四肢感覺與運動
- (D) 血糖

036. 慢性阻塞性肺病的病人，血氧濃度低於多少算危急？

- (A) 85%
- (B) 88%
- (C) 90%
- (D) 94%

037. 創傷評估 XABCDE 的 X 代表什麼？

- (A) 大量出血
- (B) 呼吸道
- (C) 頸椎
- (D) 暴露檢查

038. 成人雙下肢燙傷，紅腫並起水泡。燙傷深度與體表面積各是多少？

- (A) 一度、18%
- (B) 二度、18%
- (C) 二度、36%
- (D) 三度、36%

039. 大量傷病患的定義，是單一事故的傷病患人數達到幾人以上？

- (A) 5 人
- (B) 10 人
- (C) 15 人
- (D) 30 人

040. 從火場救出的病人意識清醒、血氧濃度 96%，應該用哪一種方式給氧？

- (A) 鼻導管
- (B) 簡單面罩
- (C) 非再吸入型面罩
- (D) 袋瓣罩甦醒球

041. 用 G-FAST 評估中風時，下列哪個做法錯誤？

- (A) 請病人雙手平舉、手心向下
- (B) 請病人微笑，看臉部是否對稱
- (C) 請病人說一句話
- (D) 看兩眼是否偏向一側

042. 病人噎到，用哈姆立克法時要壓哪裡？

- (A) 胸骨中段
- (B) 劍突
- (C) 肚臍上緣
- (D) 肚臍下方

043. 病人昏迷指數 3 分，副手可以用哪一種頸椎限制術？

- (A) 雙膝頸椎減移
- (B) 胸骨前額頸椎減移
- (C) 胸骨枕骨頸椎減移
- (D) 肩部頸椎減移

044. 關於瀕死呼吸，下列何者錯誤？

- (A) 淺而短
- (B) 極慢
- (C) 不規則
- (D) 常出現在心跳停止後一分鐘內

045. 20 歲男性雙腳骨折無法行走，呼吸每分鐘 20 次，微血管充填時間 1 秒，可以正常溝通。依 START 檢傷法應分到哪一類？

- (A) 紅色
- (B) 黃色
- (C) 綠色
- (D) 黑色

046. 下列何者不是緊急醫療救護人員？

- (A) 醫師
- (B) 護理人員
- (C) 救護技術員
- (D) 救護車駕駛

047. 依《緊急醫療救護法》第 45 條，救護技術員未依規定施救，罰鍰是多少？

- (A) 新臺幣 5 千元以上 2 萬 5 千元以下
- (B) 新臺幣 1 萬元以上 5 萬元以下
- (C) 新臺幣 6 萬元以上 30 萬元以下
- (D) 新臺幣 10 萬元以上 50 萬元以下

048. 20 歲女性昏迷，給痛刺激會睜眼、會發出聲音、肢體伸直，昏迷指數是幾分？

- (A) 5 分
- (B) 6 分
- (C) 7 分
- (D) 8 分

049. 血壓低於多少算有危險？

- (A) 80/50 mmHg (B) 90/60 mmHg
(C) 100/70 mmHg (D) 110/70 mmHg

050. 下列哪一種情況應該使用袋瓣罩甦醒球？

- (A) 意識清醒、血氧 96%
(B) 已使用非再吸入型面罩，血氧仍低於 90%
(C) 輕微喘、能說完整句子
(D) 手指擦傷

051. 嬰兒異物哽塞時怎麼處理？

- (A) 腹部推擠法 (B) 拍背壓胸法
(C) 用手指伸進嘴裡挖 (D) 倒提雙腳拍打

052. 成人 CPR 的口訣是什麼？

- (A) 快快壓、重重壓、胸回彈、莫中斷 (B) 慢慢壓、輕輕壓、胸回彈、莫中斷
(C) 快快壓、輕輕壓、不回彈、可中斷 (D) 慢慢壓、重重壓、胸回彈、常中斷

053. 臍帶還連在母親身上的新生兒沒有脈搏，壓胸與吹氣的比例是多少？

- (A) 3 : 1 (B) 5 : 1
(C) 15 : 2 (D) 30 : 2

054. 非再吸入型面罩的氧氣流量是每分鐘幾公升？

- (A) 1~6 公升 (B) 6~10 公升
(C) 10~15 公升 (D) 20~25 公升

055. 頸圈的大小怎麼量？

- (A) 下顎到鎖骨的距離 (B) 耳垂到肩膀的距離
(C) 頸部一圈的長度 (D) 下顎到胸骨下緣的距離

056. 小兒評估三角包含哪三項？

- (A) 外觀、呼吸作功、皮膚循環 (B) 意識、血壓、體溫
(C) 呼吸道、呼吸、循環 (D) 瞳孔、膚色、血氧

057. 初級救護技術員得施行之救護項目，下列何者為非？ (不計分)

- (A) 檢傷分類 (B) 急產接生
(C) 使用自動心臟電擊器 (D) 使用沖洗用生理食鹽水沖洗眼睛

058. 初級救護技術員教育訓練 W 小時，證書有效期為 X 年，於 Y 年內需繼續教育 Z 小時，請問 W+X+Y+Z=? (不計分)

- (A) 67 (B) 68
(C) 69 (D) 70

059. 未依緊急傷病患作業救護程序施行救護者，依緊急醫療救護法第 45 條，處多少罰鍰？

- (A) 處新台幣 5 千元以上 2 萬 5 千元以下罰鍰
(B) 處新台幣 1 萬元以上 5 萬元以下罰鍰
(C) 處新台幣 6 萬元以上 30 萬元以下罰鍰
(D) 處新台幣 10 萬元以上 50 萬元以下罰鍰

060. 救護車載送病患至少要有幾名緊急醫療救護人員？

- (A) 2 人 (B) 3 人
(C) 4 人 (D) 沒有限制

061. 救護紀錄表要存放幾年才能銷毀？

- (A) 5
- (B) 6
- (C) 7
- (D) 8

062. 請問頸動脈、肱動脈、股動脈、橈動脈、足背動脈，分別為多少？

- (A) 60. 70. 70. 90. 90
- (B) 60. 70. 80. 80. 80
- (C) 60. 70. 70. 80. 90
- (D) 70. 70. 80. 80. 90

063. 成人共有幾塊骨頭？

- (A) 205
- (B) 206
- (C) 207
- (D) 208

064. 緊急醫療的運作需要分為四個階段，請排出正確的順序？（1 到院前救護單位的派遣 2 轉送到適當的醫療場所 3 報告及啟動緊急醫療系統 4 救護技術員的醫療評及現場處置）

- (A) 1234
- (B) 2143
- (C) 3142
- (D) 4312

065. 鼻咽呼吸道測量方式為何？

- (A) 測量嘴角到耳垂距離
- (B) 測量鼻尖到下巴距離
- (C) 測量鼻尖到嘴角距離
- (D) 測量鼻尖到耳垂距離

066. 創傷患者要暢通呼吸道時，需使用？

- (A) 壓額抬下顎法
- (B) 拇食指交叉法
- (C) 食拇指交叉法
- (D) 下顎推舉法

067. 遇到低血壓患者，應給予？

- (A) 平躺
- (B) 頭高腳低
- (C) 腳高頭低
- (D) 半坐臥

068. 一名燒燙傷患者，左手臂（整隻手）以及左腳（整隻腳）二度燒燙傷，試問它的燒燙傷面積為何？

- (A) 18
- (B) 27
- (C) 36
- (D) 45

069. 一名患者意識清楚，從火場被救出，在檢查時發現患者鼻毛燒焦，試問患者氧氣治療需選擇？

- (A) 氧氣鼻管
- (B) 氧氣面罩
- (C) 非再吸入型面罩
- (D) 不用給患者氧氣治療

070. 對孕婦的哈姆立克急救法應採用？

- (A) 腹部推擠法
- (B) 胸部推擠法
- (C) 背部敲擊法
- (D) 倒立法

071. 沒有施行心肺復甦術，其存活率每分鐘約減少多少？

- (A) 7-10%
- (B) 10-15%
- (C) 15-20%
- (D) 20-25%

072. 基本心肺復甦術下壓深度？

- (A) 5-6 公分
- (B) 2-4 公分
- (C) 7-8 公分
- (D) 8 公分以上

073. 危急度判斷呼吸速率大於幾次為危急個案？

- (A) 每分鐘>29 次
- (B) 每分鐘>35 次
- (C) 每分鐘>20 次
- (D) 每分鐘>10 次

074. 下列何者為危急個案患者？

- (A) 血壓 120/80、心跳 90、血氧 95%、意識昏迷的患者。
- (B) 血壓 120/80、心跳 90、血氧 95%、主訴胸悶/痛。
- (C) 血壓 120/80、心跳 90、血氧 95%、左側肢體無力患者。
- (D) 以上皆是。

075. 快速最有效的簡單止血方法有？

- (A) 直接加壓止血
- (B) 止血帶止血法
- (C) 止血點止血法
- (D) 全部皆可

076. 為患者進行止血包紮時，應該要注意事項，何者為非？

- (A) 優先使用止血帶止血
- (B) 敷料要大於傷口邊緣
- (C) 無菌技術
- (D) 清潔傷口

077. 從正臥翻身至患者已呈現頭頸一直線之狀態，此時救護人員之主手該以何種頸椎限制固定？好讓副手使用肩部頸椎限制固定。

- (A) 頭部頸椎限制
- (B) 胸骨前額頸椎限制
- (C) 胸骨脊椎頸椎限制
- (D) 胸骨枕骨頸椎限制

078. (接續上一題：病人已由俯臥翻成仰躺) 救護人員為患者上完頸圈後，救護人員之副手該以何種頸椎保護固定？好準備將患者固定上長背板。

- (A) 肩部頸椎限制
- (B) 頭肩部頸椎限制
- (C) 胸骨前額頸椎限制
- (D) 胸骨脊椎頸椎限制

079. (1)儘早 CPR (2)儘早高級心臟救命術 (3)儘早求救 (4)完整的復甦後照顧 (5)儘早去顫，有關生命之鏈順序，何者正確？

- (A) 12345
- (B) 13254
- (C) 31254
- (D) 31524

080. 患者對聲音無反應，給他疼痛刺激時眼睛會睜開，會呻吟，手腳伸展僵直，請問 GCS？

- (A) E2V3M2
- (B) E2V2M3
- (C) E1V3M2
- (D) E2V2M2

081. 下列危急個案判斷的敘述何者錯誤？

- (A) 生命徵象-急性意識不清
- (B) GCS-14 分
- (C) 特殊情況-持續抽搐
- (D) 創傷機轉-成人高度 5 公尺墜落
- (E) 創傷部位-嚴重撕裂傷

082. 在發生車禍時，操作傷患車內脫困過程中，下列何者為常見的錯誤？

- (A) 車體尚未熄火前即接觸傷患
- (B) 未確實做好傷患的頭頸部保護
- (C) 操作人員未做好自我保護
- (D) 以上皆是

083. 在非創傷二度評估時，操作項目「全身皮膚是否有異常」指的是檢查皮膚有無下列何者異常？

- (A) 紅疹
- (B) 紫斑
- (C) 針孔
- (D) 以上皆是

084. 下列何者不是非創傷二度評估的操作項目？

- (A) 氣管是否偏移
- (B) 聽診兩側肺音
- (C) 胸部觸診是否有壓痛
- (D) 腹部觸診是否有壓痛

085. 檢查氣管是否偏移，應使用幾隻手指操作？

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4

086. 中風的黃金治療時間？

- (A) 1 小時
- (B) 2 小時
- (C) 3 小時
- (D) 30 分鐘

087. 老人評估中，若有神經學症狀時，辛辛那提檢查任何一項不正常且新發作患者，可能為腦中風之可能性為 _%，三項均不正常 _%？

- (A) 70%、80%
- (B) 72%、85%
- (C) 75%、85%
- (D) 80%、90%

088. 欲用夾板固定肢體骨折，夾板長度必須至少涵蓋？

- (A) 整個肢體
- (B) 骨斷端及其上面的關節
- (C) 骨斷端及上下兩個關節
- (D) 骨斷端及其下面的關節

089. 下列何者為錯誤的？

- (A) 到達現場時應注意現場是否安全
- (B) 推擔架床上救護車時僅需注意前方就好
- (C) 患者資料及病情不可以隨意洩漏
- (D) 接觸病人時應做好適當防護

090. 有關大量傷病患事故，其敘述下列何者錯？

- (A) 一般而言在大量傷病患事故中，常使用 START 檢法
- (B) 傷票顏色分為黑、紅、黃、綠共四色
- (C) 大量傷病患的定義為單一事故中，災害發生時傷病患人數達 15 人以上或預判可能發生 15 人以上之緊急醫療救護
- (D) 依傷票顏色判定後送醫院優先順序，黑色應該要優先後送

091. 下列哪一種結常用於三角巾包紮？

- (A) 滑結
- (B) 爪結
- (C) 死結
- (D) 平結

092. 下列何種器材常使用於車禍患者脫困？

- (A) 抽吸式護木
- (B) KED
- (C) 椅式擔架
- (D) 搬運毯

093. 救護技術員應該知道什麼事情？

- (A) 心肺復甦術
- (B) 辨識生命危急的問題
- (C) 控制出血
- (D) 以上皆是

094. 利用 AVPU 來表示意識程度，其中 V 是表示病人？

- (A) 清醒
- (B) 對聲音有反應
- (C) 對疼痛刺激有反應
- (D) 昏迷

095. 下列敘述何者不是長骨？

- (A) 鎖骨
- (B) 股骨
- (C) 脛骨
- (D) 腓骨

096. 當前臂骨折，固定前/後應檢查？

- (A) 檢查頸動脈、感覺運動功能
- (B) 檢查股動脈、感覺運動功能
- (C) 檢查橈動脈、感覺運動功能
- (D) 檢查肱動脈、感覺運動功能

097. 成人 CPR 對於無呼吸的病人，在給予第一次正壓給氧後，若無法吹入氣體，則施救者應該？

- (A) 重新打開呼吸道，再給予正壓給氧
- (B) 開始胸外按壓
- (C) 檢查脈搏
- (D) 檢查是否有異物堵塞呼吸道

098. 您救護一患者騎機車自摔，主訴頸部及雙手麻麻的、有刺痛感，欲為其上頸圍，此時您要如何測量頸圍大小？

- (A) 下巴的平行切線至鎖骨之平行切線
- (B) 下頷骨轉角的平行線至肩膀
- (C) 下巴的平行切線至肩膀
- (D) 患者中指後兩節

099. 對於呼吸困難的傷患，應採取何種姿勢運送？

- (A) 平躺
- (B) 左側躺
- (C) 半坐臥
- (D) 無限制姿勢

100. 「緊急醫療救護法」，於民國幾年發布？

- (A) 82
- (B) 84
- (C) 86
- (D) 88

101. 腦神經共有幾對？

- (A) 11
- (B) 12
- (C) 13
- (D) 14

102. 請問骨盆骨折，則出血量大約為？

- (A) 500 C.C.
- (B) 1000 C.C.
- (C) 3000 C.C.
- (D) 10000 C.C.

103. 下列何者非「生命徵象」檢查項目？

- (A) 意識
- (B) 血壓
- (C) 瞳孔
- (D) 血糖

104. 檢查骨盆是否穩定與疼痛，檢查方式為？

- (A) 向外側擠壓一次為限
- (B) 向左側擠壓一次為限
- (C) 向右側擠壓一次為限
- (D) 向內側擠壓一次為限

105. 下列何者錯誤？

- (A) 氧氣鼻導管，1~6 L/min
- (B) 氧氣面罩，6~10 L/min
- (C) 非再吸入型氧氣面罩，10~15 L/min
- (D) 甦醒球，10~15 L/min

106. 抽吸操作規範，下列何者正確？

- (A) 抽吸前應先給予氧氣鼻導管之氧氣治療
- (B) 抽吸導管欲深入之長度(嘴角至下巴)
- (C) 抽吸時間<15 秒
- (D) 抽吸時間<10 秒

答案速查

「—」表示舊制或條件衝突，不作現行計分；「†」表示答案尚待完整核實，請以當梯授課與現行法規為準。

001	A 002	B 003	C 004	C 005	D 006	B 007	B 008	C† 009	B 010	C
011	D 012	C 013	A 014	B 015	B 016	C 017	D 018	B 019	C 020	C
021	A 022	C 023	A 024	— 025	A 026	B 027	B 028	B 029	C 030	C†
031	B 032	A 033	D 034	D 035	D 036	C 037	A 038	C 039	C 040	C
041	A 042	C 043	A 044	A 045	B 046	D 047	B 048	B† 049	B† 050	B†
051	B† 052	A† 053	A† 054	C† 055	A† 056	A† 057	— 058	— 059	B† 060	A†
061	C† 062	C† 063	B† 064	C† 065	D† 066	D† 067	C† 068	B† 069	C† 070	B†
071	A† 072	A† 073	A† 074	D† 075	A† 076	A† 077	B† 078	B† 079	D† 080	D†
081	C† 082	D† 083	D† 084	C† 085	B† 086	C† 087	B† 088	C† 089	B† 090	D†
091	D† 092	B† 093	D† 094	B† 095	A† 096	C† 097	A† 098	C† 099	C† 100	B†
101	B† 102	C† 103	D† 104	D† 105	D† 106	C†				