EMT-1 自編教材概念練習

無解析版 · 答案在末頁

共 96 題 · 是非 0 題 · 選擇 96 題

選擇題 96 題

001. 依現行《救護技術員管理辦法》（民國 114 年 1 月 1 日施行）附表一，初級救護技術員訓練課程的總時數是幾小時？
(A) 24 小時　(B) 40 小時
(C) 48 小時　(D) 56 小時

002. 依《救護技術員管理辦法》，初級救護技術員證書的有效期間是幾年？
(A) 3 年　(B) 4 年
(C) 5 年　(D) 6 年

003. 依現行《救護技術員管理辦法》，初級救護技術員在證書效期三年內要完成多少繼續教育課程，才能申請展延？
(A) 16 小時以上，其中 8 小時為模組二、四及六之科目
(B) 24 小時以上，其中 12 小時為模組二、四及六之科目
(C) 32 小時以上，其中 16 小時為模組二、四及六之科目
(D) 40 小時以上，其中 20 小時為模組二、四及六之科目

004. 依《救護技術員管理辦法》第13條，下列何者屬於初級救護技術員得施行之救護項目？
(A) 使用聲門上呼吸道維持呼吸　(B) 建立周邊血管路徑並給予輸液
(C) 依預立醫療流程施行氣管插管　(D) 使用自動體外心臟電擊去顫器

005. 依《緊急醫療救護法》第34條，救護紀錄表應由救護車設置機關（構）及應診之醫療機構保存至少幾年？
(A) 1 年　(B) 3 年
(C) 5 年　(D) 7 年

006. 依《緊急醫療救護法》第14-2條，救護人員以外之人為免除他人生命之急迫危險而施予急救措施，法律責任如何處理？
(A) 傷病患死亡時仍應負過失致死罪責　(B) 適用民法、刑法緊急避難免責之規定
(C) 僅於傷病患為直系血親時得以免責　(D) 僅免除行政責任，民事與刑事仍須負責

007. 救護技術員無故洩漏因業務知悉或持有的他人秘密，依《緊急醫療救護法》第35條及第45條的罰則為何？
(A) 處新臺幣五千元以上二萬五千元以下罰鍰　(B) 處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰
(C) 處新臺幣二萬元以上十萬元以下罰鍰　(D) 處新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰

008. 依《緊急醫療救護法》第29條，救護人員應將緊急傷病患送達何處？
(A) 距離最近之醫學中心　(B) 傷病患指定之醫療機構
(C) 就近適當之醫療機構　(D) 衛生局指定之責任醫院

009. 依《緊急醫療救護法》第18條，救護車於救護傷病患及運送病人時，至少要有幾名救護人員出勤？
(A) 救護人員一名以上　(B) 救護人員二名以上
(C) 救護人員三名以上　(D) 救護人員四名以上

010. 病患意識清醒且具有完全行為能力，但堅決拒絕救護人員處置與送醫，救護員的適當處置為何？
(A) 說明風險並記錄其拒絕意願　(B) 約束病患後強制送往醫院
(C) 通報警察到場後強制帶離　(D) 不作說明直接收隊離開現場

011. 救護車開啟警示燈及警鳴器執行緊急任務時，關於行駛的規定，下列敘述何者錯誤？
(A) 得不受標誌、標線及號誌之限制
(B) 得不受行車速度之限制
(C) 肇事時得免除刑事與民事責任
(D) 仍應注意其他車輛及行人安全

012. 依現行《救護技術員管理辦法》，協助使用吸入型支氣管擴張劑、自備腎上腺素注射筆或硝化甘油舌下含片，最低須為哪一級救護技術員才得施行？
(A) 初級救護技術員
(B) 中級救護技術員
(C) 高級救護技術員
(D) 各級均不得施行

013. 下列何者不屬於救護常規所稱的生命徵象？
(A) 瞳孔
(B) 膚色
(C) 尿量
(D) 體溫

014. 健康成年人安靜休息時，正常脈搏是每分鐘幾次？
(A) 60～100 次
(B) 80～120 次
(C) 100～140 次
(D) 120～160 次

015. 健康成年人安靜休息時，正常呼吸是每分鐘幾次？
(A) 6～10 次
(B) 8～12 次
(C) 12～20 次
(D) 20～30 次

016. 格拉斯哥昏迷指數評估哪三個面向？滿分與最低分各是幾分？
(A) 睜眼、語言、瞳孔；滿分 12 分，最低 3 分
(B) 睜眼、語言、動作；滿分 15 分，最低 0 分
(C) 瞳孔、語言、動作；滿分 15 分，最低 3 分
(D) 睜眼、語言、動作；滿分 15 分，最低 3 分

017. 病患對呼喚沒有反應，給予痛刺激時能準確抬手撥開痛源，昏迷指數的動作反應應評為幾分？
(A) 2 分
(B) 3 分
(C) 4 分
(D) 5 分

018. 傷患經叫喚才睜眼（E3）、只能說出不成句的單字（V3）、對痛刺激只有肢體縮回（M4），昏迷指數總分是幾分？
(A) 9 分
(B) 10 分
(C) 11 分
(D) 12 分

019. 評估微血管充填時間時，正常應在幾秒內恢復血色？
(A) 2 秒
(B) 3 秒
(C) 4 秒
(D) 5 秒

020. 評估意識清醒且呼吸正常的成年傷病患時，通常優先觸摸哪一條動脈的脈搏？
(A) 股動脈
(B) 頸動脈
(C) 橈動脈
(D) 肱動脈

021. 成人突然倒地、呼喚無反應且沒有呼吸，救護員應在幾秒內觸摸哪一條動脈確認脈搏？
(A) 30 秒內觸摸頸動脈
(B) 10 秒內觸摸頸動脈
(C) 10 秒內觸摸橈動脈
(D) 30 秒內觸摸橈動脈

022. 評估未滿一歲嬰兒的脈搏時，建議觸摸哪一條動脈？
(A) 橈動脈
(B) 肱動脈
(C) 顳動脈
(D) 頸動脈

023. 檢查瞳孔時發現兩側大小不等，其中一側放大且對光沒有反應，最可能代表什麼狀況？
(A) 低血糖反應　(B) 有機磷中毒
(C) 顱內壓升高　(D) 鴉片類中毒

024. 成人收縮壓低於多少毫米汞柱時，通常視為低血壓或休克的警訊？
(A) 70　(B) 80
(C) 90　(D) 100

025. 調控呼吸、心跳與血管張力等基本生命機能的「生命中樞」，位於中樞神經系統的哪個部位？
(A) 大腦　(B) 腦幹
(C) 小腦　(D) 脊髓

026. 簡易意識評估 AVPU 中的 P 代表什麼？
(A) 對痛刺激有反應　(B) 對聲音有反應
(C) 對刺激沒有反應　(D) 清醒可以對答

027. 懷疑頸椎受傷的病患，暢通呼吸道應優先採用哪一種徒手方法？
(A) 頸部後仰法　(B) 推下顎法
(C) 壓額抬顎法　(D) 頭部側轉法

028. 口咽呼吸道的尺寸怎麼量？
(A) 嘴角到耳垂　(B) 鼻尖到耳垂
(C) 嘴角到喉結　(D) 鼻尖到嘴角

029. 口咽呼吸道適用於哪一種病患？
(A) 意識清醒但是咳嗽無力　(B) 意識清醒而且呼吸急促
(C) 意識不清但是仍有嘔吐反射　(D) 意識不清而且沒有嘔吐反射

030. 成人口咽呼吸道凹面朝上置入後，接近軟硬顎交界時應如何操作？
(A) 旋轉 360 度後繼續置入　(B) 不旋轉，直接推到定位
(C) 旋轉 90 度後繼續置入　(D) 旋轉 180 度後繼續置入

031. 鼻咽呼吸道的長度怎麼量？
(A) 鼻尖到嘴角　(B) 鼻尖到喉結
(C) 鼻尖到耳垂　(D) 嘴角到耳垂

032. 下列哪一種情況不可使用鼻咽呼吸道？
(A) 懷疑頸椎受傷　(B) 牙關緊閉不開
(C) 仍有嘔吐反射　(D) 懷疑顱底骨折

033. 為成人抽吸口咽部的分泌物時，單次抽吸時間最長不可超過幾秒？
(A) 5 秒　(B) 10 秒
(C) 15 秒　(D) 20 秒

034. 使用抽吸管清除口腔分泌物時，正確的操作原則是什麼？
(A) 放到定位後，固定不動持續抽吸　(B) 放入與退出時，全程都持續抽吸
(C) 放到定位後，邊抽吸邊旋轉退出　(D) 放入時就開始抽吸，直到定位

035. 使用鼻導管給氧時，氧氣流量通常設定在每分鐘幾公升？
(A) 1～6 公升　(B) 6～10 公升
(C) 10～15 公升　(D) 15～25 公升

036. 使用非再吸入型面罩給氧時，流量設定與使用前的準備何者正確？
(A) 每分鐘 10～15 公升，先把儲氣袋壓扁
(B) 每分鐘 1～6 公升，先讓儲氣袋充滿
(C) 每分鐘 1～6 公升，先把儲氣袋壓扁
(D) 每分鐘 10～15 公升，先讓儲氣袋充滿

037. 用袋瓣罩甦醒球為沒有呼吸的成人通氣時，面罩應如何放置？
(A) 尖端朝向鼻樑，輕放面罩不必提下顎
(B) 尖端朝向鼻樑，扣緊面罩並提起下顎
(C) 尖端朝向下巴，輕放面罩不必提下顎
(D) 尖端朝向下巴，扣緊面罩並提起下顎

038. 袋瓣罩甦醒球接上氧氣與儲氣袋時，氧氣流量通常設定為每分鐘幾公升？
(A) 6 公升
(B) 8 公升
(C) 10 公升
(D) 15 公升

039. D 型攜帶式氧氣鋼瓶的換算常數與安全殘壓各是多少？
(A) 常數 0.16，安全殘壓 500 psi
(B) 常數 0.16，安全殘壓 200 psi
(C) 常數 0.28，安全殘壓 200 psi
(D) 常數 0.28，安全殘壓 500 psi

040. D 型氧氣鋼瓶壓力表顯示 1200 psi（換算常數 0.16，安全殘壓 200 psi），以每分鐘 10 公升給氧，大約還能用幾分鐘？
(A) 約 8 分鐘
(B) 約 16 分鐘
(C) 約 19 分鐘
(D) 約 28 分鐘

041. 成人有脈搏但呼吸不足，以袋瓣罩甦醒球給予人工呼吸時，多久給一口氣？
(A) 每 2～3 秒一次
(B) 每 6 秒一次
(C) 每 10 秒一次
(D) 每 15 秒一次

042. 成人院外心臟停止生存之鏈中，高品質心肺復甦術之後接著是哪個環節？
(A) 高級心肺復甦
(B) 復甦後的照護
(C) 儘早電擊去顫
(D) 啟動緊急應變

043. 成人高品質 CPR 的按壓深度與速率各是多少？
(A) 深度 4～5 公分，每分鐘 80～100 下
(B) 深度 4～5 公分，每分鐘 100～120 下
(C) 深度 5～6 公分，每分鐘 100～120 下
(D) 深度 5～6 公分，每分鐘 80～100 下

044. 成人 CPR 不論單人或雙人施救，壓胸與人工呼吸的比例是多少？
(A) 15：1
(B) 15：2
(C) 30：1
(D) 30：2

045. 兩名救護員為兒童或嬰兒施行 CPR 時，壓胸與人工呼吸的比例是多少？
(A) 3：1
(B) 5：1
(C) 15：2
(D) 30：2

046. AED 語音提示「建議電擊」，表示傷患的心律最可能是哪一種？
(A) 心室纖維顫動或無脈性心室頻脈
(B) 竇性心搏過緩或房室傳導阻滯
(C) 正常竇性心律或心房顫動
(D) 心搏停止或無脈性電氣活動

047. AED 顯示「不建議電擊」後，救護員應立即做什麼？
（A）立即繼續胸外按壓　（B）先檢查脈搏一分鐘
（C）再按一次電擊按鈕　（D）撕除貼片關閉電源

048. AED 成人電擊貼片的標準黏貼位置在哪裡？
（A）右鎖骨下方與左胸外下方　（B）兩側鎖骨下方各貼一片
（C）左鎖骨下方與右胸外下方　（D）胸骨正中與左側上腹部

049. AED 充電完成、準備電擊時，按下電擊鈕前必須先確認什麼？
（A）貼片已經撕下來　（B）沒有人碰觸傷患
（C）傷患已恢復脈搏　（D）氧氣面罩已戴好

050. AED 完成電擊後，救護員應立刻做什麼？
（A）立即繼續胸外按壓　（B）立即檢查頸動脈脈搏
（C）等待機器再次分析　（D）先給兩次人工呼吸

051. 心室纖維顫動的傷患如果沒有接受 CPR，電擊每延遲 1 分鐘，存活率大約下降多少？
（A）1～2%　（B）3～4%
（C）7～10%　（D）15～20%

052. 清醒的成年男性用餐時突然雙手掐住喉嚨、發不出聲音也無法咳嗽，應優先採取哪一種處置？
（A）用手指伸進口腔深處挖取　（B）站到身後實施腹部推擠
（C）讓他喝水把異物沖下去　（D）讓他平躺後開始胸外按壓

053. 異物哽塞的病患是懷孕後期的孕婦或過度肥胖者時，應改用哪一種方法？
（A）胸部推擠法　（B）背部拍擊法
（C）腹部推擠法　（D）手指挖除法

054. 異物哽塞的病患在處置中失去意識倒地，施救者接下來應怎麼做？
（A）扶起病患，繼續腹部推擠　（B）讓病患平躺，開始胸外按壓
（C）讓病患側躺，等待自行清醒　（D）讓病患平躺，改做背部拍擊

055. 未滿 1 歲的清醒嬰兒發生嚴重異物哽塞時，應如何處置？
（A）拍背 5 下與壓腹 5 下交替　（B）拍背 2 下與壓胸 15 下交替
（C）拍背 5 下與壓胸 5 下交替　（D）壓腹 5 下與壓胸 5 下交替

056. 傷患胸前皮下有心律調節器的凸起時，AED 貼片應怎麼貼？
（A）直接貼在凸起處的上方　（B）不貼貼片，只做胸外按壓
（C）兩片都改貼在背部　（D）避開凸起處，貼在旁邊

057. 外傷初級評估 XABCDE 中的 X 代表什麼？
（A）檢查瞳孔反應　（B）測量血氧濃度
（C）處置大量出血　（D）評估頸椎損傷

058. 四肢動脈大量出血，直接加壓無法止血時，應採取哪一種方法？
（A）在傷口遠心端綁止血帶　（B）用清水持續沖洗傷口
（C）抬高患肢並持續冰敷　（D）在傷口近心端綁止血帶

059. 為傷患綁上止血帶之後，應遵守哪一項原則？
（A）用衣物蓋住止血帶保持清潔　（B）綁到遠端仍摸得到脈搏即可
（C）記錄使用時間，不自行鬆開　（D）每 15 分鐘鬆開一次再綁緊

060. 頭部外傷病患出現雙眼眶周圍瘀青（熊貓眼）或耳後瘀斑，最可能是哪一種骨折？
(A) 頸椎骨折　(B) 顴骨骨折
(C) 顱底骨折　(D) 鼻骨骨折

061. 胸部穿刺傷造成開放性氣胸時，敷料應如何固定？
(A) 三邊貼緊，留一邊不貼　(B) 只貼一邊，其餘不貼
(C) 兩邊貼緊，留兩邊不貼　(D) 四邊貼緊，完全密封

062. 腹部外傷造成腸子等臟器外露時，現場應如何處置？
(A) 用乾的紗布直接加壓　(B) 戴手套把臟器推回腹腔
(C) 用彈性繃帶緊緊纏住　(D) 用濕的無菌敷料覆蓋

063. 異物刺入傷患體內並留在傷口上時，現場應如何處置？
(A) 固定異物，不要拔除　(B) 輕輕轉動以確認深度
(C) 立即拔除後加壓止血　(D) 往內推入以減少晃動

064. 手指完全截斷時，斷肢應如何保存後送？
(A) 乾紗布包裹後裝袋，保持常溫　(B) 濕紗布包裹後裝袋，再放入冰水
(C) 直接浸泡在生理食鹽水或冰水　(D) 濕紗布包裹後，直接埋進冰塊

065. 以夾板固定長骨骨折時，固定範圍應包含哪些部位？
(A) 骨折處與下方一個關節　(B) 骨折處與上下兩個關節
(C) 骨折處與上方一個關節　(D) 只需固定骨折處本身

066. 夾板固定之前與之後，都要評估肢體末端的哪三項？
(A) 脈搏、血壓與體溫　(B) 膚色、瞳孔與意識
(C) 循環、感覺與運動　(D) 疼痛、腫脹與變形

067. 量測硬式頸圈尺寸時，要量病患哪一段的距離？
(A) 下顎到肩膀的距離　(B) 耳垂到肩膀的距離
(C) 後腦到肩膀的距離　(D) 喉結到鎖骨的距離

068. 用長背板固定傷患時，軀幹與頭部的固定順序為何？
(A) 先固定雙腳，最後固定軀幹　(B) 先固定頭部，最後固定雙腳
(C) 先固定頭部，最後固定軀幹　(D) 先固定軀幹，最後固定頭部

069. 高處墜落的清醒傷患主訴頸部劇痛，救護員接觸傷患的第一個動作是什麼？
(A) 先量血壓與脈搏　(B) 扶傷患坐起檢查
(C) 用雙手固定頭頸部　(D) 請傷患轉動頸部

070. 在狹窄的公寓樓梯間搬運清醒、呼吸困難且沒有頸椎外傷的病患，最適合用哪一種器材？
(A) 長背板　(B) 鏟式擔架
(C) 籃式擔架　(D) 樓梯椅

071. 車禍現場車輛起火，單一救護員必須立刻把失去意識的傷患移出車外，應採用哪一種方式？
(A) 緊急拖拉法移出　(B) 等支援到場再移出
(C) 上頸圈固定後移出　(D) 穿脫困背心後移出

072. 辛辛那提到院前腦中風評估包含哪三項？
(A) 瞳孔大小、對光反射、眼球偏移　(B) 劇烈頭痛、噴射嘔吐、頸部僵硬
(C) 意識程度、肢體感覺、步態平衡　(D) 臉部下垂、手臂無力、言語異常

073. 急性心肌梗塞最典型的胸痛表現是什麼？
(A) 胸口刺痛，深呼吸或按壓時加劇
(B) 胸背撕裂痛，兩手血壓相差很大
(C) 上腹灼熱感，進食後會明顯緩解
(D) 胸口悶壓感，可延伸到左臂或下顎

074. 糖尿病病患低血糖但意識清楚、能吞嚥時，現場應先如何處置？
(A) 給予口服糖水或含糖食物
(B) 讓病患平躺並抬高下肢
(C) 協助施打自備的胰島素
(D) 禁食並給予大量白開水

075. 糖尿病病患意識昏迷、呼喚沒有反應時，下列哪一項處置不可以做？
(A) 由口餵食糖水或食物
(B) 監測血糖與生命徵象
(C) 採復甦姿勢儘速送醫
(D) 維持呼吸道並給氧

076. 氣喘或慢性阻塞性肺病急性發作時，聽診最常聽到哪一種呼吸音？
(A) 哮鳴音
(B) 摩擦音
(C) 打鼾音
(D) 濕囉音

077. 嚴重過敏性休克合併喉頭水腫與低血壓時，首選的救命藥物是什麼？
(A) 硝化甘油
(B) 抗組織胺
(C) 阿斯匹靈
(D) 腎上腺素

078.「休克」指的是什麼？
(A) 腦部的血流突然增加
(B) 心跳的速率低於正常
(C) 血液中的含氧量過高
(D) 組織的血液灌流不足

079. 出血性休克的傷患，如果沒有頭部、胸部或脊椎外傷，現場通常採取哪一種姿勢？
(A) 平躺並抬高下肢
(B) 半坐臥並屈膝
(C) 俯臥並墊高胸部
(D) 側躺採復甦姿勢

080. 疑似急性心肌梗塞併發肺水腫、呼吸困難的病患，不適合採取哪一種姿勢？
(A) 病患自覺舒適的坐姿
(B) 平躺並抬高下肢
(C) 半坐臥並墊高背部
(D) 坐姿並身體前傾

081. 依成人九則計算法，整個頭頸部與單側下肢各占體表面積多少？
(A) 頭頸部 18%，單側下肢 18%
(B) 頭頸部 18%，單側下肢 9%
(C) 頭頸部 9%，單側下肢 9%
(D) 頭頸部 9%，單側下肢 18%

082. 燒燙傷部位紅腫、劇痛並起水泡，深度屬於哪一級？
(A) 一度
(B) 二度
(C) 三度
(D) 四度

083. 燙傷處理口訣「沖、脫、泡、蓋、送」中的「沖」，正確做法是什麼？
(A) 用溫熱的清水沖洗傷處
(B) 用流動的冷水沖洗傷處
(C) 用冰塊直接敷在傷處
(D) 用生理食鹽水擦拭傷處

084. 區分熱衰竭與熱中暑，最關鍵的指標是什麼？
(A) 是否有心跳加快
(B) 是否有肌肉抽筋
(C) 是否仍大量流汗
(D) 是否有意識改變

085. 熱中暑昏迷的傷患，現場最重要的處置是什麼？
(A) 儘快為身體降溫
(B) 先測量血糖數值
(C) 蓋毛毯避免失溫
(D) 由口補充電解質水

086. 遭毒蛇咬傷時，下列哪一項處置是錯誤的？
(A) 保持冷靜減少活動
(B) 取下患肢的戒指手錶
(C) 記下蛇的外觀特徵
(D) 切開傷口吸出毒液

087. START 檢傷分類的第一步是請能自行走動的傷患到指定區域集合，這些傷患歸為哪一種顏色？
(A) 綠色
(B) 紅色
(C) 黑色
(D) 黃色

088. START 檢傷分類中，傷患沒有呼吸，暢通呼吸道後仍然沒有呼吸，應歸為哪一種顏色？
(A) 黃色
(B) 黑色
(C) 綠色
(D) 紅色

089. START 檢傷分類中，原本沒有呼吸的傷患在暢通呼吸道後恢復呼吸，應歸為哪一種顏色？
(A) 黃色
(B) 綠色
(C) 黑色
(D) 紅色

090. START 檢傷分類中，不能走動的傷患呼吸速率每分鐘超過幾次，就直接歸為紅色？
(A) 10 次
(B) 20 次
(C) 30 次
(D) 40 次

091. START 檢傷分類中，傷患呼吸每分鐘 22 次，但摸不到橈動脈脈搏，應歸為哪一種顏色？
(A) 黃色
(B) 綠色
(C) 紅色
(D) 黑色

092. START 檢傷分類中，傷患呼吸每分鐘 20 次、橈動脈脈搏明顯、微血管充填時間少於 2 秒，但無法聽從簡單指令，應歸為哪一種顏色？
(A) 綠色
(B) 黃色
(C) 紅色
(D) 黑色

093. 傷患大腿骨折無法行走，呼吸每分鐘 18 次、橈動脈脈搏正常、微血管充填時間 1.5 秒、能聽從指令，START 檢傷應歸為哪一種顏色？
(A) 紅色
(B) 黑色
(C) 黃色
(D) 綠色

094. 大量傷病患現場以 START 檢傷時，每位傷患的評估時間原則上應在多久以內？
(A) 1 分鐘
(B) 3 分鐘
(C) 5 分鐘
(D) 10 分鐘

095. 救護技術員抵達事故現場，接近傷患之前的第一件事是什麼？
(A) 確認現場環境安全
(B) 回報指揮中心到達
(C) 準備急救器材下車
(D) 確認傷患人數多寡

096. 依《緊急醫療救護法》第32條，直轄市、縣（市）政府遇大量傷病患或野外緊急救護時，應依災害規模及種類建立什麼，以施行救護有關工作？
(A) 災害物資調度系統
(B) 現場指揮協調系統
(C) 現場傷病登錄系統
(D) 後送醫院轉診系統

答案速查

「—」表示舊制或條件衝突，不作現行計分；「†」表示答案尚待完整核實，請以當梯授課與現行法規為準。

001	D	002	A	003	B	004	D	005	D	006	B	007	B	008	C	009	B	010	A†
011	C†	012	B	013	C†	014	A†	015	C†	016	D†	017	D†	018	B†	019	A†	020	C†
021	B†	022	B†	023	C†	024	C†	025	B†	026	A†	027	B†	028	A†	029	D†	030	D†
031	C†	032	D†	033	C†	034	C†	035	A†	036	D†	037	B†	038	D†	039	B†	040	B†
041	B†	042	C†	043	C†	044	D†	045	C†	046	A†	047	A†	048	A†	049	B†	050	A†
051	C†	052	B†	053	A†	054	B†	055	C†	056	D†	057	C†	058	D†	059	C†	060	C†
061	A†	062	D†	063	A†	064	B†	065	B†	066	C†	067	A†	068	D†	069	C†	070	D†
071	A†	072	D†	073	D†	074	A†	075	A†	076	A†	077	D†	078	D†	079	A†	080	B†
081	D†	082	B†	083	B†	084	D†	085	A†	086	D†	087	A†	088	B†	089	D†	090	C†
091	C†	092	C†	093	C†	094	A†	095	A†	096	B								