9장 정책효과의 인과추정

> - 실습 결과로 인용한 숫자는 모두 `lecture_practice/chapter9/code/`의 코드를 실제로 실행해 화면에 찍힌 값임
> - 원리를 설명하려고 만든 숫자는 **예시 숫자**라고 따로 표시함

0. 이 장에서 배우는 것

□ 산업단지가 들어선 A읍의 밤 불빛이 4년 뒤 더 밝아졌음. **이 사업 덕분이라고 말할 수 있을까?**

  ○ 그렇게 말하려면 "산업단지가 **없었다면** 같은 해 A읍이 얼마나 밝았을지"를 알아야 함

  ○ 그런데 A읍에는 산업단지가 이미 들어섰으므로 그 값은 영원히 관측되지 않음. 이 관측되지 않는 값을 **반사실**이라 부름

  ○ 반사실을 다른 자료로 대신 채워 넣는 작업이 **인과추정**임

□ 이 장의 원리는 세 가지임

1. **비교 대상을 잘못 고르면 효과가 엉뚱하게 나옴** — 사업 지역은 원래부터 다른 지역과 달랐음(1~2절)
2. **수준이 아니라 변화량끼리 비교함** — 이중차분법(3절)
3. **비교 대상을 제대로 고름** — 원래 다른 만큼은 공변량으로 통제하고(5절), 이미 처치받은 지역은 비교 대상에서 뺌(6절)

□ 실습은 코드 세 개로 진행함

순서	실행할 파일	확인할 것	걸리는 시간
1	`9-0-simdata-prep.py`	실습 자료 만들기(정답 효과를 미리 심어 둠)	수 초
2	`9-1-nightlight-did-dml.py`	단순 비교 → 이중차분 → 공변량 통제로 오차가 줄어드는 과정	약 10초
3	`9-2-staggered-did.py`	지역마다 사업 시작 시점이 다를 때 생기는 오차	수 초

1. 단순 비교가 틀리는 이유

1.1 흔히 쓰는 두 가지 비교

□ 사업 효과를 재려고 할 때 흔히 쓰는 비교는 둘임. 둘 다 틀릴 수 있음

○ **전후 비교** — 같은 지역의 사업 전과 사업 후를 비교함. 그 사이 경기가 좋아졌다면 경기 변화까지 사업 효과로 계산됨

○ **지역 간 비교** — 사업 지역과 사업이 없는 지역을 비교함. 두 지역이 원래부터 달랐다면 그 차이까지 사업 효과로 계산됨

□ 산업단지는 아무 곳에나 짓지 않음. 교통이 좋고 성장 가능성이 높은 곳을 골라 지정함

○ 그러면 사업 지역이 더 밝은 이유가 사업 때문인지, 원래 좋은 곳을 골랐기 때문인지 구별되지 않음

○ 원래 다른 대상을 골라 처치했기 때문에 생기는 오차를 **선택 편향**이라 부름

1.2 예시: 보충수업을 스스로 신청한 학생

○ 지역 대신 학생을, 사업 대신 방과후 보충수업을, 야간조명 대신 시험 점수를 넣어 봄(아래 표는 **예시 숫자**)

○ 학생 6명 중 A·B·C는 보충수업을 **스스로 신청**했고 D·E·F는 신청하지 않았음

○ 한 학생이 보충수업을 "들은 세계"와 "안 들은 세계"를 동시에 살 수는 없음. 그래서 **굵은 숫자만 실제로 관측됨**

학생	보충수업	들었을 때 점수	안 들었을 때 점수	개인 효과
A	들음	**80**	70	+10
B	들음	**75**	67	+8
C	들음	**70**	64	+6
D	안 들음	85	**83**	+2
E	안 들음	90	**89**	+1
F	안 들음	60	**57**	+3




그림 1 표를 그림으로 옮김. 학생마다 점이 둘인데 실제로 보이는 것은 속이 찬 점 하나뿐임. 보충수업을 들은 A·B·C는 안 들었을 때의 점(속이 빈 빨간 점)이, 안 들은 D·E·F는 들었을 때의 점(속이 빈 파란 점)이 보이지 않음

□ 관측된 굵은 숫자만으로 평균을 비교해 봄

○ 들은 학생 평균 (80+75+70)/3 = 75, 안 들은 학생 평균 (83+89+57)/3 ≈ 76.3

○ 차이 ≈ **−1.3점**. "보충수업을 들으면 점수가 떨어진다"는 결론이 나옴

□ 표의 모든 칸을 아는 우리는 이 결론이 틀렸다는 것을 앎. 들은 학생 셋은 모두 점수가 올랐음

○ 들은 학생은 수업을 **안 들었어도** 평균 (70+67+64)/3 = 67점이었음. 안 들은 학생 평균 76.3점보다 원래 9.3점 낮았음

○ 이 **원래 차이 −9.3점이 선택 편향**임. 점수가 낮아 걱정인 학생이 보충수업을 신청했기 때문에 생김

> **원리 1.** 단순 비교 값 = 진짜 효과 + 선택 편향. 이 예시에서는 −1.3 ≈ (+8) + (−9.3)

2. 무엇의 평균인가: ATT·ATE·ATU

□ 1.2의 표에서 "개인 효과"를 평균하는 방법은 **누구를 모아 평균하는가**에 따라 셋임

이름	누구를 평균하는가	예시 계산	답하는 질문
ATT(처치집단 평균 효과)	실제로 처치를 받은 사람	(10+8+6)/3 = **+8점**	보충수업을 계속 운영할까?
ATE(평균 처치 효과)	전체	(10+8+6+2+1+3)/6 = **+5점**	전교생에게 의무화하면?
ATU(비처치집단 평균 효과)	처치를 안 받은 사람	(2+1+3)/3 = **+2점**	안 들은 학생까지 넓히면?

□ 세 값이 다른 이유는 **효과가 큰 학생이 스스로 신청했기 때문임**

○ ATT가 +8점이라고 "전교생에게 시키면 8점 오른다"고 말하면 틀림. 전교생 기준은 +5점, 안 들은 학생 기준은 +2점임

○ 개인 효과가 모두 같거나 대상을 **추첨**으로 정하면, 효과가 큰 학생이 한쪽에 몰리지 않으므로 세 값이 기댓값으로 같아짐

○ 이 장의 실습 코드는 모두 **ATT**를 추정함. 다음 절의 이중차분법이 추정하는 값이 ATT이기 때문임

○ 정책 지역에 적용하면 — "사업을 계속할까"에는 ATT를, "아직 안 받은 지역으로 확대할까"에는 ATU를 써야 함

3. 이중차분법의 원리

3.1 예시: 두 동네의 지역화폐 도입 전후 매출

○ 이번에는 개인이 아니라 동네 평균으로 봄. A동은 올해 지역화폐를 도입했고 B동은 도입하지 않았음. 숫자는 점포 한 곳의 월평균 매출(만원)임(**예시 숫자**)

동네	도입 전	도입 후	변화량(도입 후 − 도입 전)
A동(도입)	100	130	30
B동(미도입)	90	105	15
동네끼리 차이(A동 − B동)	10	25	**15**




그림 2 파란 실선이 A동의 실제 변화(100 → 130), 빨간 선이 B동의 변화(90 → 105)임. 파란 점선은 "A동도 도입하지 않고 B동처럼 15만 올랐다면"의 경로(100 → 115)이고, 도입 후에 실제값(130)과 점선(115)이 벌어진 **15**가 이중차분임

□ 세 가지 계산을 나란히 놓음

- ○ **도입 후끼리 비교**: 130 − 105 = 25. A동이 도입 전부터 10 높았던 차이가 섞여 효과가 부풀려짐
- ○ **A동의 전후 비교**: 130 − 100 = 30. B동도 도입 없이 15 올랐으므로, 두 동네가 함께 오른 몫 15가 섞였음
- ○ **이중차분**: A동 변화량 − B동 변화량 = 30 − 15 = **15**

□ 이중차분은 차이를 두 번 뺌

- ○ 첫 번째 뺄셈(도입 후 − 도입 전)으로 동네마다 원래 매출 수준을 지움
- ○ 두 번째 뺄셈(A동 − B동)으로 두 동네가 함께 오른 몫을 지움
- ○ 표의 맨 아랫줄로 계산해도 같음: 도입 후 차이 25 − 도입 전 차이 10 = 15. **어느 방향으로 빼도 같은 값이 나오므로 검산에 씀**

3.2 평행추세 가정

□ 이중차분이 맞으려면 가정이 하나 필요함 — **"지역화폐가 없었다면 A동도 B동처럼 15 올랐을 것"**

- ○ 이것을 **평행추세** 가정이라 부름. 처치가 없었다면 두 집단의 변화량이 같았을 것이라는 가정임
- ○ A동의 "지역화폐가 없었던 세계"는 관측되지 않으므로 **이 가정은 자료로 직접 확인할 수 없음**

○ 대신 **도입 전 여러 시점**에서 두 집단이 나란히 움직였는지는 볼 수 있음. 도입 전에 나란했다면 도입 후에도 나란했을 것이라고 **추정**함




그림 3 도입 전 세 시점의 변화를 그림. 왼쪽은 두 동네가 매번 15씩 올라 간격이 10으로 일정하므로, A동이 도입하지 않았어도 B동처럼 15 올랐을 것이라는 가정이 그럴듯함. 오른쪽은 A동이 도입 전부터 25씩 올라 B동보다 빨랐으므로, 도입하지 않았어도 25 올랐을 가능성이 큼(**예시 숫자**). 다만 도입 후의 점선은 어느 경우에도 관측되지 않으므로, 도입 전 추세가 나란한 것은 가정이 맞기 위한 필요조건일 뿐 보증은 아님

□ 가정이 깨지는 예

○ A동이 도입 전부터 상권이 빠르게 살아나던 동네여서, 지역화폐가 없었어도 B동보다 많이 올랐을 것이라면 A동의 변화량 30에는 그 몫이 섞임

○ 이때 이중차분 15는 진짜 효과보다 큼

○ 5절 실습 1에서 실제로 이 일이 일어남




그림 4 두 칸에서 실제로 관측된 값(파란 실선 A동, 빨간 선 B동)은 같고 달라지는 것은 A동의 "도입하지 않았다면" 경로뿐임. 왼쪽은 A동이 B동처럼 15 올랐을 경우라 이중차분 15가 진짜 효과와 같음. 오른쪽은 A동이 원래 25 올랐을 경우(**예시 숫자**)라 진짜 효과는 5인데 이중차분은 그대로 15로 나옴. 두 경우를 관측값만으로는 구별할 수 없으므로 이 가정은 자료로 확인할 수 없음

3.3 이중차분 계산 순서(매뉴얼)

1. 자료에 **네 칸**이 다 있는지 확인함 — 처치집단의 사전·사후, 비교집단의 사전·사후. 하나라도 없으면 이중차분을 쓸 수 없음
2. 각 집단의 사전 평균과 사후 평균을 구함
3. 각 집단의 변화량(사후 − 사전)을 구함
4. 두 변화량의 차를 구함. 이 값이 ATT 추정치임

4. 실습 준비

□ 저장소 루트에서 패키지를 설치함. 이 장은 GPU와 인터넷이 필요 없음

```
cd geoai_public   # 저장소 루트 – 이 장의 명령은 모두 여기서 실행함
pip install -r lecture_practice/requirements-student.txt
```

□ 실습 자료를 만듦. 다른 코드는 모두 이 코드가 만든 파일을 읽으므로 **반드시 먼저 실행함**

```
python lecture_practice/chapter9/code/9-0-simdata-prep.py
```

○ 성공하면 마지막 줄에 다음이 찍힘

```
[완료] 실습 데이터를 data/ 폴더에 저장했다.
```

□ 실습 자료는 **시뮬레이션**임. 진짜 효과를 미리 정해 두고 자료를 만들었음

○ 실제 정책 자료에서는 진짜 효과를 아무도 모름. 시뮬레이션에서는 정답을 알기 때문에 **각 방법이 정답에 얼마나 가까운지 채점할 수 있음**

○ 실제 평가에는 이 정답지가 없다는 점을 기억해 둠. 그래서 7절의 점검표가 필요함

5. 실습 1: 산업단지 사업과 야간조명

□ 상황 설정

○ 격자(지도를 같은 크기로 나눈 칸) 300개, 2016~2023년 8년 자료, 2020년에 일부 격자에서 사업 시작

○ 결과변수는 위성이 잰 **야간조명**(밤 불빛 밝기, 로그값). 불빛이 밝아지면 공장·상점이 늘었다고 봄

○ 미리 심어 둔 **진짜 ATT는 +0.50**

○ 사업 지역은 일부러 성장 가능성이 높은 격자를 골라 정했음(1.1의 선택 편향을 재현함)

```
python lecture_practice/chapter9/code/9-1-nightlight-did-dml.py
```

5.1 단순 비교와 이중차분

○ 화면 윗부분에 집단별 평균이 찍힘

```
=== [1층] 처치/대조 평균 야간조명(로그 radiance) ===
           사전(2016-2019)  사후(2020-2023)
대조(사업 없음)          2.617          2.509
처치(사업)             3.229          4.140

단순 사후 비교(처치-대조): +1.632  ← 선택 편향 포함

=== [3층] DID 추정 ===
DID(treated:post): +1.019 (SE=0.029, p=0.0000)
```

□ 3.3의 순서대로 직접 계산해 봄

집단	사전	사후	변화량
처치(사업)	3.229	4.140	+0.911
대조(사업 없음)	2.617	2.509	−0.108
차이	+0.612	+1.632	**+1.019**




그림 5 위 표의 값을 그린 것임. 이중차분은 처치집단이 대조집단처럼 움직였을 경로(하늘색 점선, 3.121)와 실제값(4.140)의 차이 +1.019를 효과로 읽음. 그런데 이 자료의 진짜 효과는 +0.50이라 진짜 반사실은 3.640(초록 점선)임. 사업 지역이 원래 더 빨리 성장할 곳이어서 두 경로 사이에 약 +0.52의 차이가 남았음

○ **사후끼리 비교**: +1.632. 진짜값 +0.50의 약 3배임. 사업 전부터 있던 차이 +0.612가 그대로 섞였음

○ **이중차분**: 0.911 − (−0.108) = +1.019. 거꾸로 빼도 1.632 − 0.612 = 1.020으로 같음(표시된 값을 소수 셋째 자리에서 반올림했기 때문에 끝자리가 0.001 다름)

○ 이중차분으로 오차가 줄었지만 **여전히 진짜값의 약 2배**임. 3.2에서 말한 평행추세 위반 때문임 — 사업 지역은 사업이 없었어도 더 빨리 성장할 곳이었음

5.2 사전추세 확인

□ 평행추세는 직접 확인할 수 없지만, **사업 전 기간**에 두 집단이 나란히 움직였는지는 볼 수 있음

○ 사업 시작 전 각 연도에 "처치집단과 대조집단의 차이가 얼마나 달라졌나"를 계산하고, 그 값이 0 근처인지 봄(**사전추세 검정**, event-study라고도 부름)

```
event-study 사전(pre-treatment) 상호작용 계수 최대 ¦값¦: 0.451 (평행추세 의심)
```




그림 6 가로축은 사업 시작 연도를 0으로 둔 경과 연도, 세로축은 처치집단과 대조집단의 차이가 기준 연도보다 얼마나 달라졌는지임. 시작 전(−3~−1)에도 차이가 해마다 벌어져 0.14, 0.29, 0.45로 커지고 시작 해에 약 1.05가 됨(그림 안 글자는 영어로 되어 있음)

○ 사업 전인데도 차이가 해마다 벌어져 최대 0.451이 되었음. 사업이 시작되기 전부터 두 집단이 나란히 움직이지 않았다는 뜻임

○ **이것이 이중차분이 진짜값의 2배인 이유임.** 사업 지역은 사업이 없었어도 더 빨리 성장할 곳이었고, 그 차이가 사업 전 자료에 이미 나타나 있음

> **원리 2.** 사전추세에서 차이가 보이면 단순 이중차분을 그대로 쓰지 않음. 다만 사전추세가 나란해도 사업 이후에 생긴 차이는 걸러내지 못하므로, 이 검정은 필요조건일 뿐임

5.3 공변량을 통제하면

□ 남은 오차를 줄이려면 성장 가능성과 관련된 정보(도시화 정도, 교통 등)를 **공변량**으로 넣어 통제함

  ○ "도시화 정도가 같은 격자끼리 비교하면 사업 효과만 남는다"는 생각임

  ○ 5.2에서 사업 전부터 벌어진 차이도 성장 가능성이 높은 격자를 골랐기 때문에 생겼으므로, 같은 정보를 통제하면 줄어들 것으로 기대함

○ 화면 아래쪽 통제 방법별 결과에서 다음 세 줄을 봄

```
방법                          ATT 추정       진짜값과 오차
naive(통제 없음)                1.019        +0.519
OLS(선형 통제)                  0.506        +0.006
DML(무작위 KFold CV)           0.512        +0.012
```

> - DML 줄의 셋째 자리는 실행 환경에 따라 0.511~0.512로 달라질 수 있음
> - 화면에는 Moran's I 진단과 DML(공간 블록 CV) 줄도 찍히지만 이 장에서는 다루지 않음

□ 결과 읽기

○ 통제하지 않은 값(naive) 1.019가 통제 후 0.51 근처로 내려왔음. **진짜값 +0.50에 거의 도달함**

○ 1.019 − 0.506 = 0.513이 공변량이 설명하던 선택 편향의 크기임

□ **DML**(이중기계학습)은 머신러닝으로 공변량을 통제하는 방법임. 원리는 "공변량으로 설명되는 몫을 결과와 처치 양쪽에서 빼고, 남은 부분끼리 비교한다"임

1. 공변량으로 야간조명 변화를 예측하고, 실제값 − 예측값(**결과 잔차**)을 구함
2. 공변량으로 "사업을 받았을 확률"을 예측하고, 실제 처치 여부 − 예측값(**처치 잔차**)을 구함
3. 결과 잔차를 처치 잔차에 회귀한 기울기가 효과 추정치임

○ 예: 도시화가 많이 된 격자는 사업도 잘 받고 불빛도 잘 늘어남. 1·2단계에서 도시화로 설명되는 몫을 지우면, 3단계에는 "도시화 수준을 감안하고도 사업을 더 받은 격자가 불빛도 더 늘었나"만 남음

□ 이 자료에서는 선형 회귀(OLS)만으로도 진짜값에 도달했음

○ 결론은 "DML이 필요했다"가 아니라 "**공변량 통제가 필요했고, 이 자료에서는 선형 통제로 충분했다**"임

○ DML은 공변량이 많고 결과와의 관계가 곡선·상호작용 형태일 때 씀. 실무에서는 두 방법을 모두 돌려 결과가 가까우면 이해하기 쉬운 쪽을 보고함

○ 두 방법 모두 "관측하지 못한 다른 원인은 없다"는 가정 위에서만 맞음. **예측을 잘하는 모형이라고 인과효과를 옳게 잡는다는 보장은 없음**

6. 실습 2: 지역마다 시작 시점이 다를 때

6.1 원리: group-time ATT

□ 실제 정책은 지역마다 시작 시점이 다른 경우가 많음. 올해 일부 시군, 2년 뒤 다른 시군이 시작하는 식임

○ 이때는 효과 하나를 한 번에 구하지 않음. **3절의 작은 이중차분을 여러 번 계산한 뒤 평균함**

○ 이 방법이 **CS group-time ATT**임(Callaway와 Sant'Anna, 2021). group은 시작 시점이 같은 지역 묶음, time은 시점을 뜻함

□ 계산 순서(매뉴얼)

1. 시작 시점이 같은 지역끼리 묶음. 3기에 시작한 묶음을 g=3, 5기에 시작한 묶음을 g=5로 부름
2. 묶음 g의 시점 t마다 이중차분을 한 번 계산함. 기준 시점은 시작 직전(g−1)이고, 비교 대상은 **한 번도 시작하지 않은 지역**임
    - ATT(g,t) = (묶음 g의 t 시점 값 − g−1 시점 값) − (미도입 지역의 t 시점 값 − g−1 시점 값)
3. 이렇게 얻은 ATT(g,t)를 모아 평균함. 전부 평균하면 **전체 ATT**, 시작 후 경과기간이 같은 것끼리 평균하면 **경과기간별 효과**가 됨

□ 비교 대상을 미도입 지역으로만 제한하는 이유

○ 예시: 세 학교의 이번 학기 점수 변화(**예시 숫자**). 모든 학교가 공통으로 2점씩 오르고, 보충수업 효과는 첫 학기 +3점, 다음 학기에 +2점이 더 붙음

학교	보충수업 시작	이번 학기 점수 변화	변화의 구성
가	지난 학기(먼저 시작)	+4	공통 +2, 효과 증가분 +2
나	이번 학기(나중 시작)	+5	공통 +2, 첫 학기 효과 +3
다	안 함	+2	공통 +2




그림 7 표의 "변화의 구성"을 쌓은 막대로 그림. 회색은 모든 학교가 공통으로 오른 몫이고 파란색이 보충수업 효과임. 가 학교의 파란 부분에는 효과가 계속 커지는 몫(+2)이 들어 있어서, 가를 비교 대상으로 쓰면 나의 효과가 5 − 4 = +1로 작게 계산됨

○ 나 학교의 이번 학기 진짜 효과는 +3임

○ **안 한 학교(다)와 비교**하면 5 − 2 = **+3**. 정답임. group-time ATT는 이 비교만 씀

○ **먼저 시작한 학교(가)와 비교**하면 5 − 4 = **+1**. 가 학교의 변화에는 효과가 계속 커지는 몫 +2가 들어 있어서, 그만큼 효과가 작게 계산됨

> **비교: TWFE.** 지역과 연도를 함께 통제하는 표준 회귀(TWFE, 양방향 고정효과 회귀)를 한 번 돌려 계수 하나를 얻는 방법도 있음. 이 회귀는 계산 중에 위 표의 "가와 나의 비교"를 섞어 쓰므로, 효과가 시간이 지날수록 커지는 정책에서는 효과를 작게 추정함

6.2 실행과 결과 읽기

```
python lecture_practice/chapter9/code/9-2-staggered-did.py
```

○ 자료는 3기에 시작한 지역 100개(g=3), 5기에 시작한 지역 100개(g=5), 시작하지 않은 지역 100개, 0~7기 8개 기간이며, **진짜 ATT는 0.7875**

□ 먼저 6.1의 2단계 결과인 ATT(g,t) 여덟 줄을 봄

```
[CS] group-time ATT(g,t) (미도입 통제군, 기준기 g-1)
  g=3 t=3 (event +0): ATT(g,t) = 0.2897
  g=3 t=4 (event +1): ATT(g,t) = 0.5519
  g=3 t=5 (event +2): ATT(g,t) = 0.8219
  g=3 t=6 (event +3): ATT(g,t) = 1.1031
  g=3 t=7 (event +4): ATT(g,t) = 1.4770
  g=5 t=5 (event +0): ATT(g,t) = 0.1724
  g=5 t=6 (event +1): ATT(g,t) = 0.4879
  g=5 t=7 (event +2): ATT(g,t) = 0.7982
```

○ 첫 줄 `g=3 t=3`은 "3기에 시작한 묶음의 3기 효과"임. 2기(시작 직전)에서 3기까지의 변화량을 미도입 지역의 같은 기간 변화량과 비교한 값임

○ `event +0`은 시작한 바로 그 시점, `event +1`은 1기 뒤라는 뜻임. g=3 묶음은 3~7기 다섯 줄, g=5 묶음은 5~7기 세 줄이 나옴

○ 같은 묶음 안에서 값이 0.29 → 0.55 → 0.82 → 1.10 → 1.48로 커짐. 시작 후 시간이 지날수록 효과가 커지는 자료임

□ 다음은 6.1의 3단계, ATT(g,t)를 모아 평균한 결과임

```
[CS] overall ATT (처치 관측 가중) = 0.7128
  진짜값(0.7875)과 오차 = -0.0747

[CS] 이벤트-스터디 (경과기간별 동적 효과)
  event +0: 0.2311  (설계 기대 = 0.3000)
  event +1: 0.5199  (설계 기대 = 0.6000)
  event +2: 0.8101  (설계 기대 = 0.9000)
  event +3: 1.1031  (설계 기대 = 1.2000)
  event +4: 1.4770  (설계 기대 = 1.5000)
```

○ **전체 ATT 0.7128**은 여덟 줄의 평균임. 두 묶음 모두 지역이 100개라 각 줄을 같은 비중으로 평균함: (0.2897+0.5519+0.8219+1.1031+1.4770+0.1724+0.4879+0.7982) ÷ 8 ≈ 0.7128

○ **경과기간별 효과**는 event 번호가 같은 줄끼리 평균함. event +0은 (0.2897 + 0.1724) ÷ 2 ≈ 0.2311

○ event +3·+4는 g=3 묶음에만 있으므로 그 묶음의 값이 그대로 나옴

□ 마지막으로 TWFE와 나란히 봄

```
요약: 추정량별 overall ATT (진짜값 = 0.7875)
  TWFE (양방향고정효과)              0.5203  (오차 -0.2672)
  CS group-time ATT           0.7128  (오차 -0.0747)
```

○ 같은 자료인데 CS는 0.7128, TWFE는 0.5203임. TWFE는 진짜값의 약 34%(0.2672 ÷ 0.7875)를 놓쳤음

○ 실행하면 `lecture_practice/chapter9/data/fig_9_2_staggered_did.png`에 두 추정을 비교한 그림이 저장됨




그림 8 파란 실선이 CS의 경과기간별 효과, 회색 점선이 설계상 진짜 효과, 빨간 점선이 TWFE가 내놓은 값 하나(0.520), 초록 점선이 진짜 전체 ATT(0.787)임. 진짜 효과는 시간이 지날수록 커지는데 TWFE는 수평선 하나만 내놓아, 진짜 전체 ATT보다 낮음(그림 안 글자는 영어로 되어 있음)

> **매뉴얼.** 시작 시점이 지역마다 다르면 group-time ATT로 계산하고, 전체 ATT와 경과기간별 효과를 함께 보고함. TWFE 계수 하나를 최종 값으로 쓰지 않음

7. 결과를 보고하기 전 점검표

7.1 먼저: 인과추정이 필요한 질문인가

□ 우산을 챙길지는 비가 올지 **예측**만 정확하면 되고, 기우제를 지낼지는 "기우제가 비를 부르는가"라는 **인과**에 달려 있음(Kleinberg 외, 2015)

- ○ "취약 지역을 어디부터 지원할까"처럼 **어디에 배분할지**를 묻는 질문은 대체로 예측으로 충분함
- ○ "이 사업이 효과가 있었나"처럼 **이미 한 일의 효과**를 묻는 질문에서만 인과추정이 필요함
- ○ 인과추정에는 처치 여부가 결과와 무관하게 정해진 부분(추첨, 기준점수, 외부에서 정한 시작 시점 등)이 자료에 있어야 함. 없으면 "인과효과"라고 말하지 말고 **예측·우선순위까지만 보고하는 것이 정직한 결론임**

7.2 분석 점검표

점검 항목	확인 방법	이 장의 어디서
비교 대상이 원래 달랐나	사업 전 평균을 처치·비교 집단끼리 비교함	1절, 5.1
평행추세	사업 전 기간의 추세 차이가 0 근처인지 봄(통과해도 충분조건 아님)	3.2, 5.2
공변량 통제	통제 전후 추정치를 나란히 보고함	5.3
시작 시점	지역마다 다르면 group-time ATT로 계산	6절
결과변수	정책이 바꾸려는 것을 재는 변수인가	아래 □

□ 결과변수는 **정책이 바꾸려는 대상을 직접 재는 변수**여야 함

○ 산업단지 효과는 야간조명, 대기오염 규제 효과는 이산화질소(NO_2) 농도, 산림보호 효과는 산림 면적 변화로 봄

○ 야간조명은 원래 불빛이 거의 없는 농촌·산림에서는 경제활동을 잘 재지 못함. 이런 곳에서 효과가 0으로 나오면 "효과 없음"이 아니라 "변수가 맞지 않음"일 수 있음

7.3 보고서에 넣을 다섯 항목

항목	담는 내용	실습 1의 예
추정치	숫자와 단위, 어떤 방법으로 얻었나	로그 야간조명 +0.512(DML)
불확실성	표준오차 또는 신뢰구간	표준오차 0.032
민감도	방법·설정을 바꿨을 때 값이 움직인 범위	0.506~0.512(OLS·DML 두 방식)
정책 함의	이 값이 어떤 결정에 쓰이나	기존 사업 지역의 사업 유지 판단(ATT)
보류 조건	이 결론을 쓰면 안 되는 상황	아래 ○

○ 가장 자주 빠지는 항목이 **보류 조건**임. 실습 1의 보류 조건은 셋임

– 불빛이 거의 없는 농촌 지역에는 이 결과를 쓰지 않음(7.2 결과변수)

– 아직 사업을 받지 않은 지역으로 넓힐 때는 ATT가 아니라 ATU가 필요함(2절)

– 관측하지 못한 다른 원인이 의심되면 결론을 보류함(5.3)

8. 핵심 요약

○ **효과를 재려면 "처치가 없었다면"의 값(반사실)이 필요하고, 그 값은 관측되지 않음.** 인과추정은 그 값을 다른 자료로 대신 채우는 작업임 (0절)

○ **단순 비교 값 = 진짜 효과 + 선택 편향.** 보충수업 예시에서 진짜 효과 +8점이 단순 비교로는 −1.3점이 됨 (1.2)

○ **ATT·ATE·ATU는 누구를 평균하느냐가 다르고, 답하는 질문도 다름.** ATT가 크다고 확대 효과도 크지는 않음 (2절)

○ **이중차분은 변화량끼리 비교해 원래 수준 차이와 공통 변화를 함께 지움.** 실습 1에서 사후 비교 +1.632이 이중차분으로 +1.019가 됨 (3절, 5.1)

○ **사전추세에서 차이가 보이면(최대 0.451) 단순 이중차분을 그대로 쓰지 않음.** 공변량을 통제하자 0.506으로 진짜값 0.50에 도달함 (5.2, 5.3)

○ **시작 시점이 지역마다 다르면 시작 시점별 작은 이중차분(group-time ATT)을 계산해 평균함.** CS 0.7128, TWFE 0.5203, 진짜값 0.7875 (6절)

○ **보고서에는 추정치와 함께 보류 조건을 적음** (7.3)

9. 과제

```
python scripts/submit.py 9 --id 학번 --name 이름
```

□ 실행하면 `submissions/` 폴더에 `제출_9장_학번.md`가 생성되고 실행 결과가 붙어 있음

○ **눈여겨볼 곳은 단순 비교 추정치와 이중차분·공변량 통제(OLS·DML) 추정치의 격차**

- **막혀도 제출함**
- 실행이 실패하면 오류 메시지가 파일에 담기고, 질문이 "어디서 막혔나"로 바뀜
- 실행 성공 여부로 점수를 매기지 않음