

1. 에너지 및 다량영양소

성별		영아		유아		남자									여자									임신부 ¹⁾			수유부 ¹⁾	비고·주석표기	변동여부	
연령		0-5(개월)	6-11(개월)	1-2(세)	3-5(세)	6-8(세)	9-11	12-14	15-18	19-29	30-49	50-64	65-74	75 이상	6-8(세)	9-11	12-14	15-18	19-29	30-49	50-64	65-74	75 이상	1분기	2분기	3분기				
에너지(kcal/일) (2020)	필요추정량	500	600	900	1,400	1,700	2,000	2,500	2,700	2,600	2,500	2,200	2,000	1,900	1,500	1,800	2,000	2,000	2,000	1,900	1,700	1,600	1,500	+0	+340	+450	+340	¹임신부 1,2,3 분기별 부가량		유지
에너지(kcal/일) (2025)	필요추정량	500	600	900	1,400	1,700	2,000	2,500	2,700	2,600	2,500	2,200	2,000	1,900	1,500	1,800	2,000	2,000	2,000	1,900	1,700	1,600	1,500	+0	+340	+450	+340			
탄수화물(g/일) (2020)	평균필요량			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		+35		+60	¹임신부·수유부 부가량		변동(근거자료 변경) *수유부 하향조정
	관장섭취량			130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130		+45		+80				
	충분섭취량	60	90																											
평균필요량			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		+35		+55				
탄수화물(g/일) (2025)	관장섭취량			130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130		+45		+70	¹임신부·수유부 부가량		변동(산출식 변경)
	충분섭취량	55	85																											
	평균필요량			15	20	25	25	30	30	30	30	30	25	25	20	25	25	20	20	20	20	20		+5		+5				
관장섭취량			10	15	20	20	25	25	30	30	30	30	30	30	15	20	20	20	20	25	25	25		+5		+5				
단백질 (g/일) (2020)	평균필요량		12	15	20	30	40	50	55	50	50	50	50	50	30	40	45	45	45	40	40	40	40		+12	+25	+20	¹임신부 2, 3 분 기별 부가량		변동(근거자료 변경) * 임신 2분기 하향 조정
	관장섭취량		15	20	25	35	50	60	65	65	65	60	60	60	35	45	55	55	55	50	50	50		+15	+30	+25				
	충분섭취량	10																												
평균필요량		12	15	20	30	40	50	55	50	50	50	50	50	30	40	45	45	45	40	40	40	40		+8	+25	+20				
단백질 (g/일) (2025)	관장섭취량		15	20	25	35	50	60	65	65	65	60	60	60	35	45	55	55	55	50	50	50	50		+10	+30	+25	¹임신부 2, 3 분 기별 부가량		변동(근거자료 변경) * 임신 2분기 하향 조정
	충분섭취량	10																												
	평균필요량		0.3	0.3	0.3	0.5	0.7	1	1.2	1	1.1	1.1	1	0.9	0.5	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7		1.1		1.1			
관장섭취량		0.4	0.4	0.4	0.6	0.8	1.2	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.1	0.6	0.7	1	1.1	1	1	1	0.9	0.9		1.4		1.5				
메티오닌+시스테인 (g/일) (2020)	충분섭취량	0.4																												
	평균필요량		0.3	0.3	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.1	1.1	1	0.9	0.4	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7		1.1		1.1			
	관장섭취량		0.4	0.4	0.4	0.6	0.8	1.2	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.1	0.6	0.8	1	1.1	1	1	1	0.9	0.9		1.4		1.5			
메티오닌+시스테인 (g/일) (2025)	충분섭취량	0.4																												
	평균필요량		0.6	0.6	0.7	1.1	1.5	2.2	2.6	2.4	2.4	2.3	2.2	2.1	1	1.5	1.9	2	2	1.9	1.9	1.8	1.6		2.5		2.8			
	관장섭취량		0.8	0.8	1.0	1.3	1.9	2.7	3.2	3.1	3.1	2.8	2.8	2.7	1.3	1.8	2.4	2.4	2.5	2.4	2.3	2.2	2		3.1		3.5			
류신 (g/일) (2020)	충분섭취량	1.0																												
	평균필요량		0.6	0.6	0.7	1.1	1.5	2.1	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	2.1	1	1.5	1.8	1.9	2	1.9	1.9	1.8	1.7		2.5		3			
	관장섭취량		0.8	0.8	0.8	1.3	1.9	2.6	3	3.1	3.1	2.8	2.8	2.7	1.3	1.8	2.3	2.4	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1		3.1		3.7			
류신 (g/일) (2025)	충분섭취량	1.1																												
	평균필요량		0.3	0.3	0.3	0.5	0.7	1	1.2	1	1.1	1.1	1	0.9	0.5	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7		1.1		1.3			
	관장섭취량		0.4	0.4	0.4	0.6	0.8	1.2	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.1	0.6	0.7	1	1.1	1.1	1	1.1	0.9	0.9		1.4		1.7			
이소류신 (g/일) (2020)	충분섭취량	0.6																												
	평균필요량		0.3	0.3	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.1	1.1	1	0.9	0.4	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7		1.1		1.3			
	관장섭취량		0.4	0.4	0.4	0.6	0.8	1.2	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.1	0.6	0.8	1	1.1	1.1	1	1.1	0.9	0.9		1.4		1.7			
이소류신 (g/일) (2025)	충분섭취량	0.6																												
	평균필요량		0.3	0.4	0.4	0.6	0.9	1.2	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.1	0.6	0.9	1.2	1.2	1.1	1	1	0.9	0.9		1.4		1.6			
	관장섭취량		0.5	0.5	0.5	0.7	1.1	1.6	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.4	0.7	1.1	1.4	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.1		1.7		1.9			
발린 (g/일) (2020)	충분섭취량	0.6																												
	평균필요량		0.3	0.3	0.4	0.6	0.9	1.2	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.1	0.6	0.8	1	1.1	1.1	1	1	0.9	0.9		1.4		1.6			
	관장섭취량		0.5	0.5	0.5	0.7	1.1	1.6	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.4	0.7	1.1	1.4	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.1		1.7		1.9			
발린 (g/일) (2025)	충분섭취량	0.6																												
	평균필요량		0.3	0.3	0.4	0.6	0.9	1.2	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.1	0.6	0.8	1	1.1	1.1	1	1	0.9	0.9		1.4		1.6			
	관장섭취량		0.5	0.5	0.5	0.8	1.1	1.5	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	0.7	1	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.1		1.7		1.9			
라이신 (g/일) (2020)	충분섭취량	0.6																												
	평균필요량		0.6	0.6	0.6	1	1.4	2.1	2.3	2.5	2.4	2.1	2.2	2.2	0.9	1.3	1.8	1.8	2.1	2	1.9	1.8	1.7		2.3		2.5			
	관장섭취량		0.8	0.7	0.8	1.2	1.8	2.5	2.9	3.1	3.1	2.6	2.9	2.7	1.3	1.6	2.2	2.2	2.6	2.5	2.4	2.3	2.1		2.9		3.1			
라이신 (g/일) (2025)	충분섭취량	0.7																												
	평균필요량		0.6	0.6	0.7	1.1	1.6	2.1	2.5	2.5	2.4	2.3	2.2	2.2	1	1.5	1.9	2	2.1	2	1.9	1.8	1.7		2.3		2.7			
	관장섭취량		0.8	0.8	0.8	1.4	1.9	2.6	3.1	3.1	3.1	2.9	2.9	2.7	1.3	1.9	2.4	2.5	2.6	2.5	2.4	2.3	2.1		2.9		3.4			
페닐알라닌+티로신 (g/일) (2020)	충분섭취량	0.8																												
	평균필요량		0.5	0.5	0.6	0.9	1.3	1.8	2.1	2.8	2.9	2.7	2.5	2.5	0.8	1.2	1.6	1.6	2.3	2.3	2.2	2.1	2		3		3.7			
	관장섭취량		0.7	0.7	0.7	1	1.6	2.3	2.6	3.6	3.5	3.4	3.3	3.1	1	1.5	1.9	2	2.9	2.8	2.7	2.6	2.4		3.8		4.7			
페닐알라닌+티로신 (g/일) (2025)	충분섭취량	0.9																												
	평균필요량		0.5	0.6	0.8	1.2	1.7	2.4	2.8	2.8	2.7	2.7	2.5	2.5	1.1	1.7	2.1	2.2	2.3	2.3	2.2	2.1	2		3		3.7			
	관장섭취량		0.7	0.8	0.9	1.5	2.2	3	3.5	3.6	3.5	3.4	3.3	3.1	1.4	2.1	2.7	2.8	2.9	2.8	2.7	2.6	2.4		3.8		4.7			
트레오닌 (g/일) (2020)	충분섭취량	0.9																												
	평균필요량		0.3	0.3	0.3	0.5	0.7	1	1.2	1.1	1.2	1.1	1	1	0.5	0.6	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7		1.2		1.3			
	관장섭취량		0.4	0.4	0.4	0.6	0.9	1.3	1.5	1.5	1.5	1.4	1.2	1.2	0.6	0.9	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1	1	0.9		1.5		1.7			
트레오닌 (g/일) (2025)	충분섭취량	0.5																												
	평균필요량		0.3	0.3	0.3	0.5	0.7	1	1.2	1.1	1.2	1.1	1	1	0.5	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7		1.2		1.3			
	관장섭취량		0.4	0.4	0.4	0.6	0.9	1.2	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	0.6	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1	0.9							

칼륨 (mg/일) (2025)		충분 섭취량	400	700	1,500	2,300	2,600	3,100	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	+0	+400	
마그네슘 (mg/일) (2020)	평균 필요량				60	90	130	190	260	340	300	310	310	310	130	180	240	290	340	280	240	240	240	240	240	+30	+0	
	권장 섭취량				70	110	150	220	320	410	360	370	370	370	150	220	290	340	280	240	280	280	280	280	+40	+0		
	충분 섭취량	25	55																									
마그네슘 (mg/일) (2025)	상한 섭취량				60	90	130	190	250	350	350	350	350	350	130	190	250	350	350	350	350	350	350	350	350	350		350
	평균 필요량				60	90	130	190	260	340	300	310	310	310	130	180	240	290	340	280	240	240	240	240	240	+30	+0	
	권장 섭취량				70	110	150	220	320	410	360	380	380	380	150	220	290	340	280	280	280	280	280	280	280	+40	+0	
	충분 섭취량	25	55																									
	식물 및 급성 상한 섭취량				60	90	130	190	270	330	350	350	350	350	130	190	270	330	350	350	350	350	350	350	350	350		350
	평균 필요량		4	4.5	5	7	8	11	11	8	8	8	8	7	7	8	12	11	11	11	6	6	5		+8	+0		
철 (mg/일) (2020)	권장 섭취량		6	6	7	9	11	14	14	10	10	10	9	9	9	10	16	14	14	14	8	8	7		+10	+0		
	충분 섭취량	0.3																										
	상한 섭취량	40	40	40	40	40	40	40	45	45	45	45	45	45	40	40	40	45	45	45	45	45	45	45	45	45		45
철 (mg/일) (2025)	평균 필요량		4	4	4	5	6	8	8	6	6	6	6	5	5	6	8	7	7	7	7	5	4	4	4	4	+8	+0
	권장 섭취량		6	6	6	7	8	11	11	8	8	8	8	7	7	8	13	12	12	12	7	6	6		+9	+0		
	충분 섭취량	0.3																										
	상한 섭취량	40	40	40	40	40	40	40	45	45	45	45	45	45	40	40	40	45	45	45	45	45	45	45	45	45		45
	평균 필요량		2	2	3	5	7	7	8	9	8	8	8	7	4	7	6	7	7	7	6	6	6	6	6	+2.5	+4	
	권장 섭취량		3	3	4	5	8	8	10	10	10	10	9	9	5	8	8	9	8	8	8	7	7	7	7	+2.5	+5	
아연 (mg/일) (2020)	충분 섭취량	2																										
	상한 섭취량				6	9	13	19	27	33	35	35	35	35	13	19	27	33	35	35	35	35	35	35	35	35		35
	평균 필요량		2	2	3	4	7	7	8	9	8	8	8	7	4	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	+2	+4	
아연 (mg/일) (2025)	권장 섭취량		3	3	4	5	8	8	10	10	10	10	9	9	5	8	8	9	8	8	8	7	7	7	7	+2.5	+5	
	충분 섭취량	2																										
	상한 섭취량				6	9	13	19	27	33	35	35	35	35	13	19	27	33	35	35	35	35	35	35	35	35		35
구리 (μg/일) (2020)	평균 필요량				220	270	360	470	600	700	650	650	650	600	600	310	420	500	550	500	500	500	460	460	+100	+370		
	권장 섭취량				290	350	470	600	800	900	850	850	850	800	800	400	550	650	700	650	650	600	600	+130	+480			
	충분 섭취량	240	330																									
	상한 섭취량				1,700	2,600	3,700	5,500	7,500	9,500	10,000	10,000	10,000	10,000	3,700	5,500	7,500	9,500	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
	평균 필요량				220	270	360	470	600	700	650	650	650	600	600	310	420	500	550	500	500	460	460	+100	+370			
	권장 섭취량				290	350	460	600	800	900	850	850	850	800	800	410	550	650	750	650	650	600	600	+130	+480			
구리 (μg/일) (2025)	충분 섭취량	240	330																									
	상한 섭취량				1,700	2,600	3,700	5,500	7,500	9,500	10,000	10,000	10,000	10,000	3,700	5,500	7,500	9,500	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
	평균 필요량				220	270	360	470	600	700	650	650	650	600	600	310	420	500	550	500	500	460	460	+100	+370			
불소 (mg/일) (2020)	권장 섭취량				290	350	460	600	800	900	850	850	850	800	800	410	550	650	750	650	650	600	600	+130	+480			
	충분 섭취량	240	330																									
	상한 섭취량				1,700	2,600	3,700	5,500	7,500	9,500	10,000	10,000	10,000	10,000	3,700	5,500	7,500	9,500	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
불소 (mg/일) (2025)	평균 필요량				220	270	360	470	600	700	650	650	650	600	600	310	420	500	550	500	500	460	460	+100	+370			
	권장 섭취량				290	350	460	600	800	900	850	850	850	800	800	410	550	650	750	650	650	600	600	+130	+480			
	충분 섭취량	240	330																									
망간 (mg/일) (2020)	상한 섭취량				6	9	13	19	27	33	35	35	35	35	13	19	27	33	35	35	35	35	35	35	35	35		35
	평균 필요량				220	270	360	470	600	700	650	650	650	600	600	310	420	500	550	500	500	460	460	+100	+370			
	권장 섭취량				290	350	470	600	800	900	850	850	850	800	800	400	550	650	700	650	650	600	600	+130	+480			
망간 (mg/일) (2025)	충분 섭취량	240	330																									
	상한 섭취량				6	9	13	19	27	33	35	35	35	35	13	19	27	33	35	35	35	35	35	35	35	35		35
	평균 필요량				220	270	360	470	600	700	650	650	650	600	600	310	420	500	550	500	500	460	460	+100	+370			
요오드 (μg/일) (2020)	권장 섭취량				290	350	460	600	800	900	850	850	850	800	800	410	550	650	750	650	650	600	600	+130	+480			
	충분 섭취량	240	330																									
	상한 섭취량				1,700	2,600	3,700	5,500	7,500	9,500	10,000	10,000	10,000	10,000	3,700	5,500	7,500	9,500	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
폴소 (mg/일) (2020)	평균 필요량				220	270	360	470	600	700	650	650	650	600	600	310	420	500	550	500	500	460	460	+100	+370			
	권장 섭취량				290	350	460	600	800	900	850	850	850	800	800	410	550	650	750	650	650	600	600	+130	+480			
	충분 섭취량	240	330																									
폴소 (mg/일) (2025)	상한 섭취량				1,700	2,600	3,700	5,500	7,500	9,500	10,000	10,000	10,000	10,000	3,700	5,500	7,500	9,500	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
	평균 필요량				220	270	360	470	600	700	650	650	650	600	600	310	420	500	550	500	500	460	460	+100	+370			
	권장 섭취량				290	350	460	600	800	900	850	850	850	800	800	410	550	650	750	650	650	600	600	+130	+480			
망간 (mg/일) (2020)	충분 섭취량	240	330																									
	상한 섭취량				6	9	13	19	27	33	35	35	35	35	13	19	27	33	35	35	35	35	35	35	35	35		35
	평균 필요량				220	270	360	470	600	700	650	650	650	600	600	310	420	500	550	500	500	460	460	+100	+370			
망간 (mg/일) (2025)	권장 섭취량				290	350	460	600	800	900	850	850	850	800	800	410	550	650	750	650	650	600	600	+130	+480			
	충분 섭취량	240	330																									
	상한 섭취량				6	9	13	19	27	33	35	35	35	35	13	19	27	33	35	35	35	35	35	35	35	35		35
요오드 (μg/일) (2020)	평균 필요량				220	270	360	470	600	700	650	650	650	600	600	310	420	500	550	500	500	460	460	+100	+370			
	권장 섭취량				290	350	460	600	800	900	850	850	850	800	800	410	550	650	750	650	650	600	600	+130	+480			
	충분 섭취량	240	330																									
요오드 (μg/일) (2025)	상한 섭취량				1,700	2,600	3,700	5,500	7,500	9,500	10,000	10,000	10,000	10,000	3,700	5,500	7,500	9,500	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
	평균 필요량				220	270	360	470	600	700	650	650	650	600	600	310	420	5										