

### Aufgabe 1: Phasenverschiebung durch Gravitation (6 Punkte)

Ein Teilchen mit Energie  $E = \hbar^2 k^2 / 2m$  bewege sich im Gravitationspotential  $V(z) = mgz$  von einem Punkt A bei  $x = 0, z = 0$  zu einem Punkt D bei  $x = l$  und  $z = h$  auf jeweils geraden Wegen entweder über den Punkt B mit  $x = 0, z = h$  oder über den Punkt C bei  $x = l, z = 0$ .

- a) Berechnen Sie den Unterschied  $\varphi_{BD} - \varphi_{AC}$  in der Phasendifferenz  $\varphi_{BD}$  bzw.  $\varphi_{AC}$  der stationären Wellenfunktion  $\psi(x) = |\psi| \exp i\varphi(x)$  bei der Bewegung entlang der Wege BD und AC als Funktion von  $m, g, l, h$  und dem Wellenvektor  $k = 2\pi/\lambda$  in  $x$ -Richtung des bei A einfallenden Teilchens unter der Annahme, dass die Wellenfunktion jeweils eine ebene Welle ist und  $E \gg mgh$  gilt.

Hinweis: Beachten Sie, dass der Wellenvektor bei fester Gesamtenergie  $E$  von  $z$  abhängt. Die Phasendifferenz  $\varphi_{BD}$  ist definiert durch  $\varphi_{BD} = [\varphi(x = l) - \varphi(x = 0)]_{z=h}$  und analog für  $\varphi_{AC}$  bei  $z = 0$ .

- b) Bestimmen Sie die Periodizität  $\Delta h$  in der Höhendifferenz  $h$ , nach der sich das am Punkt D ergebende Interferenzmuster proportional zu  $\cos(\varphi_{ABD} - \varphi_{ACD})$  wiederholt. Wie gross ist  $\Delta h$  für Neutronen mit Wellenlänge  $\lambda = 1.4 \text{ \AA}$  und  $l = 5 \text{ cm}$ ? (Verwenden Sie  $(2\pi\hbar)/m_n \approx 4 \cdot 10^{-3} \text{ cm}^2/\text{sec}$ ).

Hinweis: Da die Gesamtenergie  $E$  und das Potential auf den Abschnitten AB und CD identisch sind, fallen die Änderungen der Phase auf diesen Abschnitten in der gesamten Phasendifferenz  $\varphi_{ABD} - \varphi_{ACD}$  der beiden Wege heraus.

Bemerkung: Die Rechnung ist die Grundlage für das berühmte, sogenannte 'COW'-Experiment von Colella, Overhauser und Werner, Phys. Rev. Lett. **34**, 1472 (1975).

### Aufgabe 2: GHZ-Zustände, reduzierte Dichtematrix (6 Punkte)

Ein einfaches Beispiel für einen maximal verschränkten Zustand von  $N \geq 2$  Spins ist der sogenannte Greenberger-Horne-Zeilinger (GHZ)-Zustand

$$|\text{GHZ}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\rangle^{\otimes N} + |\downarrow\rangle^{\otimes N}) \quad \text{mit} \quad |\uparrow\rangle^{\otimes N} = |\uparrow\uparrow \dots \uparrow\rangle$$

- a) Weisen Sie für den konkreten Fall  $N = 2$  explizit nach, dass  $|\text{GHZ}\rangle$  ein Eigenzustand von  $\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2$  ist. Folgern Sie daraus, dass der GHZ-Zustand auch ein Eigenzustand von  $\vec{S}_{tot}^2$  des totalen Spins  $\vec{S}_{tot} = \hbar(\vec{\sigma}_1 + \vec{\sigma}_2)/2$  mit Spin  $S = N/2 = 1$  ist. Ist  $|\text{GHZ}\rangle$  auch ein Eigenzustand von  $S_{z,tot}$ ?

Hinweis: Verwenden Sie die Beziehungen  $\sigma_x|\uparrow\rangle = |\downarrow\rangle$ ,  $\sigma_x|\downarrow\rangle = |\uparrow\rangle$  sowie  $\sigma_y|\uparrow\rangle = i|\downarrow\rangle$ ,  $\sigma_y|\downarrow\rangle = -i|\uparrow\rangle$  und  $\sigma_z|\uparrow\rangle = |\uparrow\rangle$ ,  $\sigma_z|\downarrow\rangle = -|\downarrow\rangle$ .

- b) Berechnen Sie die reduzierte Dichtematrix

$$\rho_1 = \text{Sp}_1 |\text{GHZ}\rangle \langle \text{GHZ}|$$

bei der Bildung der Spur über einen der beiden Spins. Beschreibt  $\rho_1$  einen reinen Zustand?

### Aufgabe 3: Zweidimensionales Wasserstoffatom (8 Punkte)

Die Bindung zwischen einem Elektron und einem Loch ('Exziton') in einem Halbleiter 'quantum-well' kann man in guter Näherung durch die Relativbewegung zweier Teilchen mit Ladung  $q_{1,2} = \pm e/\sqrt{\epsilon}$  ( $\epsilon$  ist die statische Dielektrizitätskonstante des Trägermaterials) und üblicher Coulomb-Wechselwirkung  $V(r) = q_1 q_2 / r$  beschreiben, wobei die Bewegung nun aber in einer Ebene stattfindet. Die reduzierte Masse  $\mu$  definiert einen effektiven Bohr-Radius  $a_B = \epsilon \hbar^2 / \mu e^2$ .

- a) Wie lautet die stationäre Schrödingergleichung für die Wellenfunktion  $\psi(r, \varphi)$  gebundener Zustände im Potential  $V(r)$  mit Energien  $E = -E_b = -\hbar^2 \kappa^2 / 2\mu$ ?

Hinweis: Verwenden Sie  $a_B$  und  $\kappa$  als Parameter und die Darstellung

$$\nabla^2 \psi = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2}$$

des Laplace-Operators in Polarkoordinaten  $r, \varphi$ .

- b) Welche Werte kann die Quantenzahl  $m$  im Separationsansatz  $\psi(r, \varphi) = \psi(r) \cdot \exp(im\varphi)$  annehmen und was ist ihre physikalische Bedeutung?
- c) Machen Sie für die (nichtnormierte und  $\varphi$ -unabhängige) Wellenfunktion des Grundzustands den Ansatz  $\psi_0(r) = \exp(-r/l)$  und verifizieren Sie, dass dies für ein geeignetes  $l$  tatsächlich eine Lösung ist.

Hinweis: Einsetzen in die Schrödingergleichung legt aus der Identität von rechter und linker Seite für alle  $r$  sowohl  $l$  als auch die Energie fest.

- d) Wie gross ist die Bindungsenergie des Grundzustands in Einheiten der effektiven Rydberg-Energie  $Ry = \hbar^2 / 2\mu a_B^2$ ?