

Ferienkurs Analysis 1 für Physik (MA9202)

Probeklausur

18. März 2022

Arbeitszeit: 90 Minuten

Name: _____

Punkteverteilung

Aufgabe	Punkte	Erreicht
1	16	
2	7	
3	14	
4	9	
5	15	
6	10	
7	12	
Gesamt:	83	

Note: _____

Bestätigung der Verhaltensregeln

Hiermit versichere ich, dass ich diese Klausur ausschließlich unter Verwendung der unten aufgeführten Hilfsmittel selbst löse und unter meinem Namen abgebe.

Unterschrift: _____

Bearbeitungshinweise:

- Diese Klausur enthält 14 Seiten (Einschließlich dieses Deckblatts) und 7 Aufgaben. Bitte kontrollieren Sie jetzt, dass Sie eine vollständige Angabe erhalten haben.
- Die Gesamtpunktzahl in dieser Prüfung beträgt 83 Punkte.
- Das Heraustrennen von Seiten aus der Prüfung ist untersagt.
- Erlaubte Hilfsmittel: Ein (1) selbsterstelltes, einseitig beschriftetes DIN A4-Blatt.
- **Es werden nur solche Ergebnisse bewertet, bei denen der Lösungsweg erkennbar ist.** Alle Antworten sind **grundsätzlich zu begründen**, sofern es in der jeweiligen Teilaufgabe nicht anders vermerkt ist.
- Schreiben Sie weder mit roter/grüner Farbe noch mit Bleistift.

1. (16 Punkte) **Gemischtes**

In den folgenden Teilaufgaben sind **keine** Begründungen gefordert und werden auch nicht zur Bewertung herangezogen. Gewertet werden ausschließlich die Ergebnisse in den dafür vorgesehenen Kästen. Sollte der Platz in den besagten Kästen nicht ausreichen, so sollten Sie in eindeutiger Weise kennzeichnen, wo Sie die Aufgabe bearbeitet haben.

- (a) (4 Punkte) Geben Sie Real- und Imaginärteil sowie Betrag und Phase der komplexen Zahl $z = (1 + i)^{100}$ an.

$\operatorname{Re}(z)=$	$\operatorname{Im}(z)=$	$ z =$	$\arg(z)=$
-------------------------	-------------------------	--------	------------

☐0
☐1
☐2
☐3
☐4

- (b) (2 Punkte) Geben Sie eine beschränkte Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ an, die divergiert.

$a_n =$

☐0
☐1
☐2

- (c) (3 Punkte) Geben Sie den Grenzwert der Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln(2))^n}{n!}$ an.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln(2))^n}{n!} =$

☐0
☐1
☐2
☐3

- (d) (2 Punkte) Geben Sie das Ergebnis des Grenzwerts $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{x}$ an.

$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{x} =$

☐0
☐1
☐2

- (e) (2 Punkte) Wie lautet das Taylorpolynom $T_7 f(x; 0)$ für $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \cos(x^2)$?

$T_7 f(x; 0) =$

☐0
☐1
☐2

- (f) (3 Punkte) Wie lautet die reelle Partialbruchzerlegung von

$$f : \mathbb{R} \setminus \{0, 1\} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2(x - 1)}?$$

$f(x) =$

☐0
☐1
☐2
☐3

Platz für Notizen:

2. (7 Punkte) **Vollständige Induktion**

Zeigen Sie, dass für $n \in \mathbb{N}$ gilt:

$$\sum_{k=1}^n k \cdot k! = (n+1)! - 1.$$

<input type="checkbox"/> 0
<input type="checkbox"/> 1
<input type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/> 3
<input type="checkbox"/> 4
<input type="checkbox"/> 5
<input type="checkbox"/> 6
<input type="checkbox"/> 7

3. (14 Punkte) **Konvergenz von Folgen und Reihen**

(a) (4 Punkte) Berechnen Sie nachvollziehbar den Grenzwert

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{n(n+1)} - \sqrt{n(n-1)} \right).$$

<input type="checkbox"/> 0
<input type="checkbox"/> 1
<input type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/> 3
<input type="checkbox"/> 4

--

(b) (2 Punkte) Sei für jedes $n \in \mathbb{N}$

$$a_n := \sin\left(n + \frac{1}{n}\right).$$

Zeigen Sie, dass $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mindestens einen Häufungspunkt besitzt.

<input type="checkbox"/> 0
<input type="checkbox"/> 1
<input type="checkbox"/> 2

--

(c) (8 Punkte) Bestimmen Sie alle $x \in \mathbb{R}$, für welche die Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x}{2n}\right)^{n^2} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^{n^2}$$

konvergiert.

- ☐ 0
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ 6
- ☐ 7
- ☐ 8

4. (9 Punkte) **Konvexität**

- (a) (3 Punkte) Geben Sie die Definition wieder, dass eine Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ konvex ist.

☐0
☐1
☐2
☐3

- (b) (6 Punkte) Sei nun $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$. Zeigen Sie, dass wenn der Graph von f nie unterhalb seiner Tangenten liegt, dann ist f konvex, also in Formeln:

$$\forall a, b \in \mathbb{R} : f(b) \geq f(a) + (b - a)f'(a) \Rightarrow f \text{ ist konvex.}$$

Hinweis: Setzen Sie $a = (1 - \lambda)x + \lambda y, \lambda \in [0, 1]$.

☐0
☐1
☐2
☐3
☐4
☐5
☐6

5. (15 Punkte) **Integration**

Seien $I_1 := \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx$ und $I_2 := \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos x) dx$.

(a) (2 Punkte) Zeigen Sie, dass

$$\sin\left(z + \frac{\pi}{2}\right) = \cos(z), z \in \mathbb{R}.$$

☐0
☐1
☐2

☐0
☐1
☐2
☐3
☐4
☐5

(b) (5 Punkte) Zeigen Sie nun unter Verwendung der Substitutionsregel, dass $I_1 = I_2$.

- (c) (2 Punkte) Zeigen Sie unter Verwendung der Substitution $x = u + \frac{\pi}{2}$, dass

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \ln(\sin x) dx = I_1.$$

☐0
☐1
☐2

☐0
☐1
☐2
☐3
☐4
☐5
☐6

- (d) (6 Punkte) Berechnen Sie nun $I_1 + I_2$ und folgern Sie daraus den Wert von I_1 .

Hinweis: $\sin(2x) = 2 \sin x \cos x, x \in \mathbb{R}$.

6. (10 Punkte) **Matrixexponential**

Gegeben ist das Differentialgleichungssystem

$$\begin{aligned}\dot{x}_1(t) &= x_1(t) - x_2(t), \\ \dot{x}_2(t) &= -x_1(t) + x_2(t).\end{aligned}$$

- (a) (2 Punkte) Schreiben Sie das System in der Form $\dot{x}(t) = Ax(t)$ mit einer 2×2 -Matrix A und der vektorwertigen Funktion $x(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$.

☐0
☐1
☐2

- (b) (1 Punkt) Welche Dimension hat der Lösungsraum von $\dot{x} = Ax$?

☐0
☐1

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

- (c) (7 Punkte) Bestimmen Sie die Lösung $x(t)$ des Anfangswertproblems

$$\dot{x} = Ax, \quad x(0) = v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

☐0
☐1
☐2
☐3
☐4
☐5
☐6
☐7

7. (12 Punkte) **Kurze Fragen**

Im Folgenden sind einige Aussagen gegeben, deren Wahrheitsgehalt Sie überprüfen müssen. Kreuzen Sie jeweils an, ob die Aussage wahr oder falsch ist und geben Sie auch eine Begründung für Ihre Entscheidung an.

Antworten ohne Begründung werden nicht bewertet!

- (a) (3 Punkte) Jeder angeordnete Körper ist überabzählbar.

☐ Wahr; Begründung: ☐ Falsch; Begründung/Gegenbeispiel:

- (b) (3 Punkte) Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ mit $D \subseteq \mathbb{R}$ und $a \in D$. Ist f in a stetig, so gilt

$$\forall \delta > 0 \exists \varepsilon > 0 \forall x \in D : |x - a| < \varepsilon \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \delta.$$

☐ Wahr; Begründung: ☐ Falsch; Begründung/Gegenbeispiel:

☐0
☐1
☐2
☐3

☐0
☐1
☐2
☐3

(c) (3 Punkte) Ist $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$, so ist $g(x) = xf(x)$ bei $x = 0$ differenzierbar.

☐ Wahr; Begründung: ☐ Falsch; Begründung/Gegenbeispiel:

☐0
☐1
☐2
☐3

(d) (3 Punkte) Das uneigentliche Integral $\int_0^{\pi} \cos\left(\frac{1}{x}\right) dx$ konvergiert.

☐ Wahr; Begründung: ☐ Falsch; Begründung/Gegenbeispiel:

☐0
☐1
☐2
☐3

Platz für Notizen:

Platz für Notizen: