

Hilfreiche Formeln für die DVP-Klausur, Elektrodynamik, Freitag 19.09.2008

Maxwell-Gleichungen:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho_{\text{frei}}, \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0, \quad \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \quad \vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j}_{\text{frei}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

Felder: $\vec{D} = \epsilon \epsilon_0 \vec{E}$, $\vec{B} = \mu \mu_0 \vec{H}$. Lichtgeschwindigkeit: $c_0^2 = 1/(\epsilon_0 \mu_0)$.

Darstellung durch Potentiale: $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$, $\vec{E} = -\vec{\nabla} \Phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$

Felder aus statischen Ladungs- und Stromverteilungen:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r}')(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} d^3r', \quad \vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{j}(\vec{r}') \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} d^3r'$$

Lorentz-Transformation für den Spezialfall, dass K' sich mit Geschwindigkeit v in x -Richtung relativ zu K bewegt:

$$\begin{pmatrix} c_0 t' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma(c_0 t - \beta x) \\ \gamma(x - \beta c_0 t) \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c_0^2}}, \quad \beta = \frac{v}{c_0}$$

Transformation der Felder in diesem Spezialfall:

$$\begin{aligned} E'_x &= E_x & B'_x &= B_x \\ E'_y &= \gamma(E_y - v B_z) & B'_y &= \gamma(B_y + E_z v / c_0^2) \\ E'_z &= \gamma(E_z + v B_y) & B'_z &= \gamma(B_z - E_y v / c_0^2) \end{aligned}$$

Dispersionsrelation: $\sum_{\mu=0}^3 k_\mu k^\mu = 0$ bzw. $\left(\frac{\omega}{c_0}\right)^2 - \vec{k} \cdot \vec{k} = 0$

Vektorrechnung: $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$, $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c}) \vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b}) \vec{c}$

Laplace-Operator in Kugelkoordinaten:

$$\Delta f(\vec{r}) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \phi^2}$$

Integrale: $\int_0^\infty e^{-\alpha x} dx = \frac{1}{\alpha}$, $\int_0^\infty x e^{-\alpha x} dx = \frac{1}{\alpha^2}$, $\int_0^\infty x^2 e^{-\alpha x} dx = \frac{2}{\alpha^3}$,

$$\int_0^R \frac{s^2}{(s^2 + z^2)^{3/2}} ds = \frac{|z|}{z} \operatorname{arcsinh} \left(\frac{R}{z} \right) - \frac{R}{\sqrt{R^2 + z^2}}, \quad \int_0^R \frac{s^3}{(s^2 + z^2)^{3/2}} ds = \frac{2z^2 + R^2}{\sqrt{z^2 + R^2}} - 2|z|$$