

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Matrikel-Nr.

Aufgabe/Punkte

--	--	--	--	--	--

Σ
Punkte

Note:

Klausur

zur Vorlesung Theoretische Physik 2 Quantenmechanik I

Prof. Dr. P. Ring, Physik-Department, Technische Universität München 12.06.002

Aufgabe 1 (26 Punkte)

Bestimmen Sie die Wellenfunktionen und Energieniveaus für die Bewegung eines Teilchens in einem unendlich hohen Potentialtopf, der durch das Potential

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x \in (-a, a) \\ \infty & \text{für } x \notin (-a, a) \end{cases}$$

gegeben ist.

- (a) Geben Sie die Bedingung für die möglichen Energien E_n an!
 (b) Bestimmen Sie die Normierung der zugehörigen Wellenfunktionen!
 (c) Welche Parität besitzen die Lösungen?
 (d) Wie groß ist die Grundzustandsenergie?

Aufgabe 2 (42 Punkte)

In der Mitte eines unendlich hohen Potentialtopfs der Breite $2a$ befindet sich eine δ -Barriere

$$V(x) = \lambda \cdot \delta(x) \text{ mit } \lambda > 0.$$

- (a) Betrachten Sie den Ansatz

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$$

jeweils in den Gebieten links und rechts von der Barriere!

- (b) Stellen Sie die Randbedingungen bei $x = \pm a$ und die Anschlussbedingungen bei $x = 0$ auf!
- (c) Bestimmen Sie die Koeffizienten der Wellenfunktionen!
- (d) Leiten Sie die Bedingungen für die möglichen k -Werte ab!
- (e) Welche Parität besitzen die Wellenfunktionen?
- (f) Geben Sie die Normierung der Wellenfunktionen an!

Aufgabe 3 (12 Punkte) (Quickies)

- (a) Wie lautet die Grundzustands-Wellenfunktion des harmonischen Oszillators?
 (b) Wie lautet die Unschärferelation für zwei hermitesche Operatoren A und B ?
 (c) Wie lauten die Eigenfunktionen und Energieeigenwerte des eindimensionalen Systems mit dem Potential

$$V(x) = \frac{m}{2} \omega^2 (x^2 + bx)$$

Drücken Sie die Eigenfunktionen dieses Systems durch die des harmonischen Oszillators aus, die mit $\psi_n(x)$ bezeichnet werden!

Aufgabe 4: Multiple Choice (8 Punkte)

A und B seien hermitesche Operatoren. Dann gelten folgende Aussagen (falsches Ankreuzen führt zu Punkteabzug):

Ja	Nein	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Falls A und B kommutieren, ist auch AB hermitesch
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Der Kommutator $[A, B] = AB - BA$ ist hermitesch
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Der Antikommutator $AB + BA$ ist hermitesch
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	$\exp(A)$ ist hermitesch

Eventuell benötigte Integrale:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-ax^2} = \sqrt{\pi/a}$$

$$\int dx \cos^2 ax = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4a} \sin 2ax$$

$$\int dx \sin^2 ax = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4a} \sin 2ax$$