

# Tarea2

November 5, 2025

Tarea N2

Métodos Numéricos

Nombre: Lenin Amangandi

[Enlace GitHub](#)

## 0.1 Pregunta N1

Calcule los errores absoluto y relativo en las aproximaciones de  $\pi$  por  $\frac{22}{7}$ .

```
[17]: import math

def error_absoluto(p, p_aprox):
    return abs(p - p_aprox)

def error_relativo(p, p_aprox):
    return error_absoluto(p, p_aprox) / abs(p)

def mostrar_resultados(p, p_aprox):
    ea = error_absoluto(p, p_aprox)
    er = error_relativo(p, p_aprox)
    print(f"Valor real (p): {p}")
    print(f"Aproximación (p*): {p_aprox}")
    print(f"Error absoluto: {ea}")
    print(f"Error relativo: {er}")
    print()

def intervalo_error(p, error_max):
    inferior = p * (1 - error_max)
    superior = p * (1 + error_max)
    return inferior, superior
```

a)

$$p = \pi, \quad p^* = \frac{22}{7}$$

```
[18]: mostrar_resultados(math.pi, 22/7)
```

Valor real (p): 3.141592653589793  
Aproximación (p\*): 3.142857142857143  
Error absoluto: 0.0012644892673496777  
Error relativo: 0.0004024994347707008

b)

$$p = \pi, \quad p^* = 3.1416$$

```
[19]: mostrar_resultados(math.pi, 3.1416)
```

Valor real (p): 3.141592653589793  
Aproximación (p\*): 3.1416  
Error absoluto: 7.346410206832132e-06  
Error relativo: 2.3384349967961744e-06

```
[ ]:
```

c)

$$p = e, \quad p^* = 2.718$$

```
[20]: mostrar_resultados(math.e, 2.718)
```

Valor real (p): 2.718281828459045  
Aproximación (p\*): 2.718  
Error absoluto: 0.0002818284590451192  
Error relativo: 0.00010367889601972718

d)

$$p = \sqrt{2}, \quad p^* = 1.414$$

```
[21]: mostrar_resultados(math.sqrt(2), 1.414)
```

Valor real (p): 1.4142135623730951  
Aproximación (p\*): 1.414  
Error absoluto: 0.00021356237309522186  
Error relativo: 0.00015101140222192286

## 0.2 Pregunta N2

Calcule los errores absoluto y relativo en las aproximaciones de  $e$  por  $*$ .

a)

$$p = e^{10}, \quad p^* = 22000$$

```
[22]: mostrar_resultados(math.e**10, 22000)
```

Valor real (p): 22026.465794806703  
 Aproximación (p\*): 22000  
 Error absoluto: 26.465794806703343  
 Error relativo: 0.0012015452253326688

b)

$$p = 10^\pi, \quad p^* = 1400$$

```
[23]: mostrar_resultados(10**math.pi, 1400)
```

Valor real (p): 1385.4557313670107  
 Aproximación (p\*): 1400  
 Error absoluto: 14.544268632989315  
 Error relativo: 0.010497822704619136

c)

$$p = 8!, \quad p^* = 39900$$

```
[ ]: mostrar_resultados(math.factorial(8), 39900)
```

Valor real (p): 40320  
 Aproximación (p\*): 39900  
 Error absoluto: 420  
 Error relativo: 0.010416666666666666

d)

$$p = 9!, \quad p^* = \sqrt{18\pi} \left(\frac{9}{e}\right)^9$$

```
[27]: p_real = math.factorial(9)
p_aprox = math.sqrt(18 * math.pi) * ((9 / math.e) ** 9)
mostrar_resultados(p_real, p_aprox)
```

Valor real (p): 362880  
 Aproximación (p\*): 359536.87284194835  
 Error absoluto: 3343.1271580516477  
 Error relativo: 0.009212762230080598

### 0.3 Pregunta N3

Encuentre el intervalo más largo en el que se debe encontrar  $x$  para aproximarse a  $e$  con error relativo máximo de  $10^{-4}$  para cada valor de  $n$ .

```
[38]: import math
def redondear_3_digitos(x):
    if x == 0:
        return 0
```

```

    else:
        return round(x, 3 - int(math.floor(math.log10(abs(x)))) - 1)

def error_absoluto(p, p_aprox):
    return abs(p - p_aprox)

def error_relativo(p, p_aprox):
    return error_absoluto(p, p_aprox) / abs(p)

def mostrar_resultados(p, p_aprox):
    ea = error_absoluto(p, p_aprox)
    er = error_relativo(p, p_aprox)
    print(f"Valor real (p): {p}")
    print(f"Aproximado (p*): {p_aprox}")
    print(f"Error absoluto: {ea}")
    print(f"Error relativo: {er}\n")

```

a)

$$\pi$$

```

[39]: error_max = 1e-4

a_inf, a_sup = intervalo_error(math.pi, error_max)
print(f"3.a    [{a_inf}, {a_sup}]")

```

```
3.a    [3.141278494324434, 3.141906812855152]
```

b)

$$e$$

```

[40]: b_inf, b_sup = intervalo_error(math.e, error_max)
print(f"3.b e    [{b_inf}, {b_sup}]")

```

```
3.b e    [2.718010000276199, 2.718553656641891]
```

c)

$$\sqrt{2}$$

```

[31]: c_inf, c_sup = intervalo_error(math.sqrt(2), error_max)
print(f"3.c √2    [{c_inf}, {c_sup}]")

```

```
3.c √2    [1.4140721410168577, 1.4143549837293325]
```

d)

$$\sqrt[3]{7}$$

```

[32]: d_inf, d_sup = intervalo_error(7**(1/3), error_max)
print(f"3.d 7    [{d_inf}, {d_sup}]")

```

```
3.d 7    [1.9127398896541117, 1.9131224758906662]
```

## 0.4 Pregunta N4

Use la aritmética de redondeo de tres dígitos para realizar lo siguiente. Calcule los errores absoluto y relativo con el valor exacto determinado para por lo menos cinco dígitos.

a)

$$\frac{\frac{13}{14} - \frac{5}{7}}{2e - 5.4}$$

```
[41]: num = redondear_3_digitos(13/14)
num = redondear_3_digitos(num - redondear_3_digitos(5/7))
den = redondear_3_digitos((2 * math.e) - 5.4)
aprox_a = redondear_3_digitos(num / den)
exact_a = (13/14 - 5/7) / ((2 * math.e) - 5.4)
mostrar_resultados(exact_a, aprox_a)
```

Valor real (p): 5.860620417858059  
Aproximado (p\*): 5.87  
Error absoluto: 0.009379582141940901  
Error relativo: 0.0016004418428738562

b)

$$-10\pi + 6e - \frac{3}{61}$$

```
[42]: aprox_b = redondear_3_digitos(-10 * math.pi)
aprox_b = redondear_3_digitos(aprox_b + redondear_3_digitos(6 * math.e))
aprox_b = redondear_3_digitos(aprox_b - redondear_3_digitos(3/61))
exact_b = -10*math.pi + 6*math.e - 3/61
mostrar_resultados(exact_b, aprox_b)
```

Valor real (p): -15.155415893012512  
Aproximado (p\*): -15.1  
Error absoluto: 0.05541589301251193  
Error relativo: 0.003656507574830839

c)

$$\left(\frac{2}{9}\right) \cdot \left(\frac{9}{11}\right)$$

```
[43]: aprox_c = redondear_3_digitos(2/9)
aprox_c = redondear_3_digitos(aprox_c * redondear_3_digitos(9/11))
exact_c = (2/9)*(9/11)
mostrar_resultados(exact_c, aprox_c)
```

Valor real (p): 0.18181818181818182  
Aproximado (p\*): 0.182  
Error absoluto: 0.0001818181818181719  
Error relativo: 0.0009999999999999454

d)

$$\frac{\sqrt{13} + \sqrt{11}}{\sqrt{13} - \sqrt{11}}$$

```
[45]: aprox_d = redondear_3_digitos(math.sqrt(13))
      aprox_d = redondear_3_digitos((aprox_d + redondear_3_digitos(math.sqrt(11))) /
                                     (math.sqrt(13) - math.sqrt(11)))
      exact_d = (math.sqrt(13) + math.sqrt(11)) / (math.sqrt(13) - math.sqrt(11))
      mostrar_resultados(exact_d, aprox_d)
```

Valor real (p): 23.95826074310141  
Aproximado (p\*): 24.0  
Error absoluto: 0.04173925689859104  
Error relativo: 0.0017421655664470355

## 0.5 Pregunta N5

Los primeros tres términos diferentes a cero de la serie de Maclaurin para la función arcotangente son:

$$x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5$$

Calcule los errores absoluto y relativo en las siguientes aproximaciones de  $\pi$  mediante el polinomio en lugar del arcotangente:

a)

$$4 \left[ \arctan\left(\frac{1}{2}\right) + \arctan\left(\frac{1}{3}\right) \right]$$

```
[48]: def arctan_aprox(x):
      return x - (x**3)/3 + (x**5)/5
      real_a5 = 4 * (math.atan(1/2) + math.atan(1/3))
      aprox_a5 = 4 * (arctan_aprox(1/2) + arctan_aprox(1/3))
      mostrar_resultados(real_a5, aprox_a5)
```

Valor real (p): 3.141592653589793  
Aproximado (p\*): 3.1455761316872426  
Error absoluto: 0.003983478097449478  
Error relativo: 0.0012679804598147663

b)

$$16 \arctan\left(\frac{1}{5}\right) - 4 \arctan\left(\frac{1}{239}\right)$$

```
[50]: real_b5 = 16 * math.atan(1/5) - 4 * math.atan(1/239)
      aprox_b5 = 16 * arctan_aprox(1/5) - 4 * arctan_aprox(1/239)
      mostrar_resultados(real_b5, aprox_b5)
```

Valor real (p): 3.1415926535897936  
 Aproximado (p\*): 3.1416210293250346  
 Error absoluto: 2.837573524105963e-05  
 Error relativo: 9.032277054963067e-06

## 0.6 Pregunta N6

El número  $e$  se puede definir por medio de

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$$

donde

a)

$$\sum_{n=0}^5 \frac{1}{n!}$$

```
[52]: aprox_a6 = sum(1 / math.factorial(i) for i in range(6))
      mostrar_resultados(math.e, aprox_a6)
```

Valor real (p): 2.718281828459045  
 Aproximado (p\*): 2.7166666666666667  
 Error absoluto: 0.0016151617923783057  
 Error relativo: 0.0005941848175815963

b)

$$\sum_{n=0}^{10} \frac{1}{n!}$$

```
[53]: aprox_b6 = sum(1 / math.factorial(i) for i in range(11))
      mostrar_resultados(math.e, aprox_b6)
```

Valor real (p): 2.718281828459045  
 Aproximado (p\*): 2.7182818011463845  
 Error absoluto: 2.7312660577649694e-08  
 Error relativo: 1.0047766310211053e-08

## 0.7 Pregunta N7

Suponga que dos puntos se encuentran en línea recta con Existen dos fórmulas para encontrar la intersección de la línea:

$$x = \frac{x_0 y_1 - x_1 y_0}{y_1 - y_0} \quad \text{y} \quad x = x_0 - \frac{(x_1 - x_0) y_0}{y_1 - y_0}$$

a) Use los datos

$$(x_0, y_0) = (1.31, 3.24) \quad \text{y} \quad (x_1, y_1) = (1.93, 5.76)$$

y la aritmética de redondeo de tres dígitos para calcular la intersección con de ambas maneras. ¿Cuál método es mejor y por qué?

```
[60]: import math

def round_sig(x, sig=3):
    if x == 0:
        return 0.0
    else:
        return float(round(x, sig - int(math.floor(math.log10(abs(x)))) - 1))

x0, y0 = 1.31, 3.24
x1, y1 = 1.93, 5.76

x_exact = (x0*y1 - x1*y0) / (y1 - y0)

print("Exacto:", x_exact)
```

Exacto: 0.5128571428571429

- Primer Metodo

```
[61]: a = round_sig(x0 * y1)
b = round_sig(x1 * y0)
numer = round_sig(a - b)
denom = round_sig(y1 - y0)
xA = round_sig(numer / denom)

print("Metodo A:", xA)
```

Metodo A: 0.516

- Segundo Metodo

```
[62]: dx = round_sig(x1 - x0)
mult = round_sig(dx * y0)
denom = round_sig(y1 - y0)
div = round_sig(mult / denom)
xB = round_sig(x0 - div)
print("Metodo B:", xB)
```

Metodo B: 0.512