

In Bezug auf die Rangreduzierung sind wir in der Einleitung auf das Paper von Gravish und Donoho [4] eingegangen. In dem Paper wird erwähnt, dass in

$$X_\eta := X_\eta^{\text{echt}} + \gamma X_\eta^{\text{rauschen}}$$

der durch $\frac{\sigma_{\text{med},\eta}}{\sqrt{n}}$ normierte Median der Singulärwerte von X_n fast sicher gegen den Median der Marčenko-Pastur-Verteilung μ_y konvergiert [4, S. 11]. Daraus ergibt sich dann, dass der Schwellenwert für die Dimensionsreduktion

$$\hat{\tau}_*(y, X) = \lambda_*(y) \frac{\sigma_{\text{med},\eta}}{\sqrt{\mu_y}}$$

fast sicher gegen

$$\lim_{\eta \rightarrow \infty} \lambda_*(y) \frac{\sigma_{\text{med},\eta}}{\sqrt{\mu_y}} \stackrel{\text{f.s.}}{=} \lambda_*(y) = \sqrt{2(y+1) + \frac{8y}{(y+1) + \sqrt{y^2 + 14y + 1}}}$$

konvergiert.

Um die Notation im Folgenden zu vereinfachen, bezeichnen wir die Rauschmatrix X_η^{rauschen} mit $\mathbf{X}_\eta$.

Die Marčenko-Pastur-Verteilung (kurz M-P-Verteilung) beschreibt die asymptotische Verteilung der Eigenwerte von großen Zufallsmatrizen der Form $\frac{1}{n} \mathbf{X}_\eta \mathbf{X}_\eta^H$. Die genauen Anforderungen an $\mathbf{X}_\eta$, stellen wir im kommenden Unterkapitel. Eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die angibt wie die Eigenwerte einer Matrix verteilt sind, ist die empirische Spektralverteilung.

Ziel dieses Kapitels ist es, die schwache Konvergenz der empirischen Spektralverteilung gegen die Marčenko-Pastur-Verteilung zu zeigen. Die Herleitung orientiert sich dabei an dem Buch „Spectral Analysis of Large Dimensional Random Matrices“ von Zhidong Bai und Jack W. Silverstein [3].

0.1 Vorbereitung

Wir beginnen damit die empirische Spektralverteilung einmal konkret zu definieren.

Definition 0.1. [3, S. 4, 10] Sei B eine $p \times p$ hermitesche Matrix mit Eigenwerten λ_i mit $i = 1, \dots, p$. Dann ist auf dem Ereignisraum $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ mit $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ als borelsche σ -Algebra

durch

$$F^B(x) := \frac{1}{p} |A_x| \quad \text{mit } A_x := \{i \in \{1, \dots, p\} : \lambda_i \leq x\}$$

die *empirische Spektralverteilung* $F^B: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ definiert. Ihre k -ten Momente sind durch

$$\beta_k(B) = \int_{-\infty}^{\infty} x^k \, dF^B(x) = \frac{1}{p} \operatorname{tr}(B^k)$$

gegeben.

Die Konvergenz der empirischen Spektralverteilung betrachten wir in dem Sinne, dass wir analysieren, wie sich die Verteilung verhält, wenn wir immer größere Matrizen betrachten, also p und n gegen unendlich laufen lassen.

Definition 0.2. Sei $\mathbf{X}$ eine $p \times n$ Matrix, dessen Elemente unabhängig und identisch verteilte komplexe Zufallsvariablen sind. Dabei sind ihre Erwartungswerte 0 und ihre Varianz bezeichnen wir mit σ^2 . Weiter sind $x_m = (x_{1m}, \dots, x_{pm})^\top$, $\mathbf{X} = (x_1, \dots, x_n)$ und $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{m=1}^n x_m$.

Für die Folge an Zufallsmatrizen $\{\mathbf{X}_\eta\}$ laufen also p und n so gegen unendlich, dass das Dimeniosn-Stichproben-Verhältnis

$$\lim_{\eta \rightarrow \infty} \frac{p_\eta}{n_\eta} = y \in (0, \infty)$$

nicht divergiert.

Definition 0.3. Wir bezeichnen die durch

$$S = \frac{1}{n} \sum_{m=1}^n (x_m - \bar{x})(x_m - \bar{x})^H \in \mathbb{R}^{p \times p} \tag{0.1}$$

gegebene Matrix S als *Stichproben-Kovarianzmatrix*.

mehr zu Stichproben-Kovarianzmatrix?

Durch folgenden Satz können wir die Stichproben-Kovarianzmatrix noch weiter vereinfachen.

Satz 0.4 ([3, S. 503]). Seien $A, B \in \mathbb{C}^{p \times n}$. Dann gilt

$$\left\| F^{AA^H} - F^{BB^H} \right\|_\infty \leq \frac{1}{p} \operatorname{rang}(A - B).$$

Schreiben wir S als

$$\begin{aligned}
S &= \frac{1}{n} \sum_{m=1}^n (x_m - \bar{x})(x_m - \bar{x})^H \\
&= \frac{1}{n} \left(\sum_{m=1}^n x_m x_m^H - \sum_{m=1}^n x_m \bar{x}^H - \sum_{m=1}^n x_m^H \bar{x} + \sum_{m=1}^n \bar{x} \bar{x}^H \right) \\
&= \frac{1}{n} \left(\sum_{m=1}^n x_m x_m^H - n \bar{x} \bar{x}^H \right) \\
&= \frac{1}{n} \mathbf{X} \mathbf{X}^H - \bar{x} \bar{x}^H
\end{aligned}$$

und beschreiben $\mathbf{S}$ durch

$$\begin{aligned}
\mathbf{S} &= \frac{1}{n} \sum_{m=1}^n x_m x_m^H \\
&= \frac{1}{n} \mathbf{X} \mathbf{X}^H .
\end{aligned} \tag{0.2}$$

Mit Satz 0.4 können wir durch

$$\begin{aligned}
\|F^S - F^{\mathbf{S}}\|_{\infty} &\leq \frac{1}{p} \text{rang}(\mathbf{X} - \bar{x} \bar{x}^H - \mathbf{X}) \\
&= \frac{1}{p} \text{rang}(\bar{x} \bar{x}^H) \\
&= \frac{1}{p}
\end{aligned}$$

zeigen, dass $\bar{x} \bar{x}^H$ keinen Einfluss auf die Konvergenz von F^S hat.

Bemerkung 0.5. Wir verwenden daher die vereinfachte Form $\mathbf{S}$ für die Stichproben-Kovarianzmatrix. Für den Konvergenzfall betrachten wir entsprechend

$$\mathbf{S}_{\eta} = \frac{1}{n} \mathbf{X}_{\eta} \mathbf{X}_{\eta}^H .$$

0.2 Marčenko-Pastur-Momente

Mit dem Dimensions-Stichproben-Verhältnis $y = \frac{p}{n}$ wird die Marčenko-Pastur-Verteilung durch das Wahrscheinlichkeitsmaß F_y auf $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ beschrieben. Für $y, \sigma^2 \in (0, \infty)$ und

$x \in \mathbb{R}$ sind

$$a = \sigma^2 (1 - \sqrt{y})^2 \quad \text{und} \quad b = \sigma^2 (1 + \sqrt{y})^2 .$$

Die Dichtefunktion der Marčenko-Pastur-Verteilung ist dann durch

$$p_y(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi xy\sigma^2} \sqrt{(b-x)(x-a)}, & \text{wenn } a \leq x \leq b \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad (0.3)$$

definiert. Die Verteilungsfunktion ergibt sich dann durch

$$F_y(t) = \int_a^t p_y(x) \, dx .$$

Wenn $\sigma^2 = 1$ ist, dann sprechen wir von der Standard-M-P-Verteilung. Die k -ten Momente der M-P-Verteilung sind durch

$$\beta_k(y, \sigma^2) := \int_a^b x^k p_y(x) \, dx \quad (0.4)$$

definiert. Wir können die Momente der M-P-Verteilung durch ihren Standardfall beschreiben, was wir im folgenden Lemma zeigen.

Lemma 0.6. Für alle $k \geq 1$ gilt

$$\beta_k(y, \sigma^2) = \sigma^{2k} \beta_k(y, 1) =: \beta_k .$$

Beweis. Nach 0.3 und (0.4) haben wir

$$\begin{aligned} \beta_k(y, \sigma^2) &= \int_a^b x^k p_y(x) \, dx \\ &= \int_{\sigma^2(1-\sqrt{y})^2}^{\sigma^2(1+\sqrt{y})^2} x^k \frac{1}{2\pi xy\sigma^2} \sqrt{(\sigma^2(1+\sqrt{y})^2 - x)(x - \sigma^2(1-\sqrt{y})^2)} \, dx . \end{aligned}$$

Substituieren wir x mit $u\sigma^2$ erhalten wir

$$\begin{aligned}
\beta_k(y, \sigma^2) &= \int_{(1-\sqrt{y})^2}^{(1+\sqrt{y})^2} (u\sigma^2)^k \frac{1}{2\pi u y \sigma^2} \sqrt{(\sigma^2(1+\sqrt{y})^2 - u\sigma^2)(u\sigma^2 - \sigma^2(1-\sqrt{y})^2)} du \\
&= \int_{(1-\sqrt{y})^2}^{(1+\sqrt{y})^2} u^k \sigma^{2k} \frac{1}{2\pi u y \sigma^2} \sqrt{\sigma^4((1+\sqrt{y})^2 - u)(u - (1-\sqrt{y})^2)} du \\
&= \sigma^{2k} \int_{(1-\sqrt{y})^2}^{(1+\sqrt{y})^2} u^k \frac{1}{2\pi u y} \sqrt{((1+\sqrt{y})^2 - u)(u - (1-\sqrt{y})^2)} du \\
&= \sigma^{2k} \beta_k(y, 1) .
\end{aligned}$$

Die Momente lassen sich also durch σ^{2k} skaliert über die Standard-M-P-Verteilung beschreiben. $\square$

Damit können wir dann zeigen, dass die Marčenko-Pastur-Verteilung eindeutig durch die Momente β_k bestimmt wird und wie die Momente explizit bestimmt aussehen.

Lemma 0.7 (Carleman [3, S. 509]). Sei $\{\beta_k = \beta_k(F)\}_{k \in \mathbb{N}_0}$ die Folge von Momenten der Verteilungsfunktion F . Ist die *Carleman-Bedingung*

$$\sum_{k=1}^{\infty} \beta_{2k}^{-\frac{1}{2k}} = \infty$$

erfüllt, dann wird die Verteilung F durch $\{\beta_k\}_{k \in \mathbb{N}_0}$ eindeutig bestimmt.

Lemma 0.8. Die Momente β_k der Marčenko-Pastur-Verteilung erfüllen die Carleman-Bedingung.

Beweis. Wir sehen einmal nach (0.3) und (0.4), dass wir β_{2k} durch

$$\begin{aligned}
\beta_{2k} &= \frac{1}{2\pi y} \int_a^b x^{2k-1} \sqrt{(b-x)(x-a)} dx \\
&\leq \frac{1}{2\pi y} \int_a^b x^{2k-1} \sqrt{(b-a)(b-a)} dx \\
&= \frac{1}{2\pi y} \int_a^b x^{2k-1} (b-a) dx \\
&= \frac{1}{4k\pi y} (b^{2k} - a^{2k})(b-a) \\
&= \frac{1}{k\pi\sqrt{y}} (b^{2k} - a^{2k}) \\
&\leq \frac{1}{k\pi\sqrt{y}} b^{2k} \\
&\leq b^{2k} = (1 + \sqrt{y})^{4k}
\end{aligned} \tag{0.5}$$

abschätzen können. Mit Lemma 0.7 und der Abschätzung (0.5) haben wir durch

$$\sum_{k=1}^{\infty} \beta_{2k}^{-\frac{1}{2k}} \geq \sum_{k=1}^{\infty} (1 + \sqrt{y})^{-2} = \infty$$

die Carleman-Bedingung erfüllt. □

Damit haben wir gezeigt, dass die Marčenko-Pastur-Verteilung durch die Momente β_k eindeutig bestimmt ist. Die explizite Darstellung der Momente zeigen wir im Folgenden Lemma.

Lemma 0.9. Die Momente k -ter Ordnung der Marčenko-Pastur-Verteilung haben die Form

$$\beta_k = \sum_{r=0}^{k-1} \frac{1}{r+1} \binom{k}{r} \binom{k-1}{r} y^r. \tag{0.6}$$

Beweis. Nach (0.3) und (0.4) gilt

$$\beta_k = \frac{1}{2\pi y} \int_a^b x^{k-1} \sqrt{(b-x)(x-a)} dx.$$

Substituieren wir x mit $1 + y + z$ und setzen $(1 - \sqrt{y})^2$ für a und $(1 + \sqrt{y})^2$ für b ein,

erhalten wir

$$\begin{aligned}\beta_k &= \frac{1}{2\pi y} \int_{-2\sqrt{y}}^{2\sqrt{y}} (1+y+z)^{k-1} \sqrt{\left((1+\sqrt{y})^2 - 1 - y - z\right) \left(1+y+z - (1-\sqrt{y})^2\right)} dz \\ &= \frac{1}{2\pi y} \int_{-2\sqrt{y}}^{2\sqrt{y}} (1+y+z)^{k-1} \sqrt{4y - z^2} dz.\end{aligned}$$

Durch Einsetzen des Binomischen Lehrsatzes lässt sich das Integral zu

$$\begin{aligned}\beta_k &= \frac{1}{2\pi y} \int_{-2\sqrt{y}}^{2\sqrt{y}} \sum_{\ell=0}^{k-1} \binom{k-1}{\ell} (1+y)^{k-1-\ell} z^\ell \sqrt{4y - z^2} dz \\ &= \frac{1}{2\pi y} \sum_{\ell=0}^{k-1} \binom{k-1}{\ell} (1+y)^{k-1-\ell} \int_{-2\sqrt{y}}^{2\sqrt{y}} z^\ell \sqrt{4y - z^2} dz\end{aligned}$$

umformen. Um das Integral weiter zu vereinfachen, substituieren wir z mit $2\sqrt{y}u$ und erhalten

$$\begin{aligned}\beta_k &= \frac{1}{2\pi y} \sum_{\ell=0}^{k-1} \binom{k-1}{\ell} (1+y)^{k-1-\ell} \int_{-1}^1 2\sqrt{y} (2\sqrt{y}u)^\ell \sqrt{4y - 4yu^2} du \\ &= \frac{1}{2\pi y} \sum_{\ell=0}^{k-1} \binom{k-1}{\ell} (1+y)^{k-1-\ell} (2\sqrt{y})^\ell 4y \int_{-1}^1 u^\ell \sqrt{1 - u^2} du.\end{aligned}$$

Hier ist unser Integrand ungerade, sofern ℓ ungerade ist. Da die Integralgrenzen symmetrisch um den Nullpunkt liegen, ist das Integral für alle ungeraden ℓ gleich 0. Dadurch ist jeder zweite Summand 0. Dafür lassen wir die Summe bis zur Hälfte von $k-1$ laufen und summieren über 2ℓ statt ℓ . Für den Fall, dass $k-1$ ungerade ist, runden wir ab, weil es dann nur $\frac{k-2}{2}$ Summanden gibt, die ungleich 0 sind. Wir haben also

$$\begin{aligned}\beta_k &= \frac{1}{2\pi y} \sum_{\ell=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \binom{k-1}{2\ell} (1+y)^{k-1-2\ell} (2\sqrt{y})^{2\ell} 4y \int_{-1}^1 u^{2\ell} \sqrt{1 - u^2} du \\ &= \frac{1}{2\pi y} \sum_{\ell=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \binom{k-1}{2\ell} (1+y)^{k-1-2\ell} (4y)^{\ell+1} \int_{-1}^1 u^{2\ell} \sqrt{1 - u^2} du.\end{aligned}$$

Da die Integralgrenzen symmetrisch um den Nullpunkt liegen und der Integrand gerade ist, können wir zweimal über das halbe Intervall integrieren. Zur Übersicht betrachten

wir vorerst nur noch das Integral und fügen später wieder alles zusammen. Folglich gilt

$$\int_{-1}^1 u^{2\ell} \sqrt{1-u^2} \, du = 2 \int_0^1 u^{2\ell} \sqrt{1-u^2} \, du.$$

Wenn wir jetzt u mit $\sqrt{w}$ substituieren,

$$\begin{aligned} 2 \int_0^1 u^{2\ell} \sqrt{1-u^2} \, du &= \int_0^1 w^\ell \sqrt{1-w} \frac{1}{\sqrt{w}} \, dw \\ &= \int_0^1 w^{\ell-\frac{1}{2}} \sqrt{1-w} \, dw \end{aligned}$$

erhalten wir ein Integral, dass wir mittels Eulerschen Betafunktion [2, S. 19] lösen können. Die Eulersche Betafunktion ist durch

$$\int_0^1 t^{p-1} (1-t)^{q-1} \, dt = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$$

gegeben. Wir können also mit $p = \ell + \frac{1}{2}$ und $q = 1 + \frac{1}{2}$ das Integral durch die Gammafunktionen

$$\begin{aligned} \int_0^1 w^{\ell-\frac{1}{2}} \sqrt{1-w} \, dw &= \frac{\Gamma(\ell + \frac{1}{2})\Gamma(1 + \frac{1}{2})}{\Gamma(\ell + 2)} \\ &= \frac{1}{(\ell + 1)!} \left(\frac{(2\ell)! \sqrt{\pi}}{\ell! 4^\ell} \frac{2! \sqrt{\pi}}{4} \right) \\ &= \frac{1}{(\ell + 1)!} \left(\frac{(2\ell)!}{2\ell! 4^\ell} \pi \right) \end{aligned} \tag{0.7}$$

beschreiben. Nach Einsetzen von (0.7) in die wieder zusammengefügte Gleichung, erhalten wir

$$\begin{aligned} \beta_k &= \frac{1}{2\pi y} \sum_{\ell=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \binom{k-1}{2\ell} (1+y)^{k-1-2\ell} (4y)^{\ell+1} \frac{1}{(\ell+1)!} \left(\frac{(2\ell)!}{2\ell! 4^\ell} \pi \right) \\ &= \sum_{\ell=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \frac{1}{2\pi y} \frac{(k-1)!}{(2\ell)!(k-1-2\ell)!} (1+y)^{k-1-2\ell} (4y)^{\ell+1} \frac{1}{(\ell+1)!} \left(\frac{(2\ell)!}{2\ell! 4^\ell} \pi \right). \end{aligned}$$

Nach dem Kürzen der Brüche, erhalten wir

$$\beta_k = \sum_{\ell=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \frac{(k-1)!}{\ell!(\ell+1)!(k-1-2\ell)!} y^\ell (1+y)^{k-1-2\ell}.$$

Wenn wir den Binomischen Lehrsatz mit

$$\begin{aligned} (1+y)^{k-1-2\ell} &= \sum_{s=0}^{k-1-2\ell} \binom{k-1-2\ell}{s} y^s \\ &= \sum_{s=0}^{k-1-2\ell} \frac{(k-1-2\ell)!}{s!(k-1-2\ell-s)!} y^s \end{aligned}$$

einsetzen, haben wir

$$\begin{aligned} \beta_k &= \sum_{\ell=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \sum_{s=0}^{k-1-2\ell} \frac{(k-1)!}{\ell!(\ell+1)!(k-1-2\ell)!} y^\ell \frac{(k-1-2\ell)!}{s!(k-1-2\ell-s)!} y^s \\ &= \sum_{\ell=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \sum_{s=0}^{k-1-2\ell} \frac{(k-1)!}{\ell!(\ell+1)!s!(k-1-2\ell-s)!} y^{\ell+s}. \end{aligned}$$

Jetzt wollen wir den Term wieder vereinfachen. Dafür setzen wir $s = r - \ell$

$$\beta_k = \sum_{\ell=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \sum_{r=\ell}^{k-1-\ell} \frac{(k-1)!}{\ell!(\ell+1)!(r-\ell)!(k-1-\ell-r)!} y^r$$

und erweitern mit zwei Einsen

$$\begin{aligned} \beta_k &= \sum_{\ell=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \sum_{r=\ell}^{k-1-\ell} \frac{(k-1)!}{\ell!(\ell+1)!(r-\ell)!(k-1-\ell-r)!} \frac{r!}{r!} \frac{(k-r)!}{(k-r)!} y^r \\ &= \sum_{\ell=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \sum_{r=\ell}^{k-1-\ell} \frac{(k-1)!}{r!(k-r)!} \frac{r!}{\ell!(r-\ell)!} \frac{(k-r)!}{(k-r-\ell-1)!(\ell+1)!} y^r \\ &= \sum_{\ell=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \sum_{r=\ell}^{k-1-\ell} \frac{1}{k} \frac{k!}{r!(k-r)!} \frac{r!}{\ell!(r-\ell)!} \frac{(k-r)!}{(\ell+1)!(k-r-(\ell+1))!} y^r \\ &= \sum_{\ell=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \sum_{r=\ell}^{k-1-\ell} \frac{1}{k} \binom{k}{r} \binom{r}{\ell} \binom{k-r}{\ell+1} y^r. \end{aligned}$$

Für den nächsten Schritt müssen wir die Laufvariablen von 0 starten lassen. Momentan haben wir erst das ℓ und ermitteln damit, inwieweit das r eingeschränkt ist. Für ein festes aber beliebiges k liegen unsere Laufvariablen in

$$A = \left\{ (\ell, r) \in \mathbb{N}^2 \mid 0 \leq \ell \leq \left\lfloor \frac{k-1}{2} \right\rfloor, \ell \leq r \leq k-1-\ell \right\}.$$

Daraus wissen wir, dass

$$0 \leq \ell, r \leq k-1-\ell$$

gilt, woraus wir

$$\ell \leq k-1-r$$

folgern können. Damit erhalten wir

$$\begin{aligned} 0 \leq \ell \leq r \leq k-1-\ell \leq k-1 \\ \implies 0 \leq r \leq k-1, \quad 0 \leq \ell \leq \min(r, k-1-r) \end{aligned}$$

damit können wir also die Summen äquivalent über

$$A = \{ (\ell, r) \in \mathbb{N}^2 \mid 0 \leq r \leq k-1, 0 \leq \ell \leq \min(r, k-1-r) \} \quad (0.8)$$

laufen lassen.

Wir erhalten also mit (0.8)

$$\begin{aligned} \beta_k &= \sum_{r=0}^{k-1} \sum_{\ell=0}^{\min(r, k-1-r)} \frac{1}{k} \binom{k}{r} \binom{r}{\ell} \binom{k-r}{\ell+1} y^r \\ &= \sum_{r=0}^{k-1} \frac{1}{k} \binom{k}{r} y^r \sum_{\ell=0}^{\min(r, k-1-r)} \binom{r}{\ell} \binom{k-r}{\ell+1}. \end{aligned}$$

Das Minimum können wir noch weiter vereinfachen, da die Summanden gleich 0 sind, sobald $\ell > r$ oder $\ell > k-1-r$ ist. Wenn wir die Summe also bis r laufen lassen, ändern wir nichts am Ergebnis.

$$\beta_k = \sum_{r=0}^{k-1} \frac{1}{k} \binom{k}{r} y^r \sum_{\ell=0}^r \binom{r}{\ell} \binom{k-r}{\ell+1}.$$

An diesem Punkt müssen wir nur noch die innere Summe vereinfachen. Dafür machen

wir eine Indexverschiebung und formen die Binomialkoeffizienten um. Wir haben also

$$\begin{aligned}
\beta_k &= \sum_{r=0}^{k-1} \frac{1}{k} \binom{k}{r} y^r \sum_{\ell=1}^{r+1} \binom{r}{\ell-1} \binom{k-r}{\ell} \\
&= \sum_{r=0}^{k-1} \frac{1}{k} \binom{k}{r} y^r \sum_{\ell=1}^{r+1} \binom{r}{r-(\ell-1)} \binom{k-r}{\ell} \\
&= \sum_{r=0}^{k-1} \frac{1}{k} \binom{k}{r} y^r \sum_{\ell=1}^{r+1} \binom{r}{(r+1)-\ell} \binom{k-r}{\ell}.
\end{aligned}$$

Hier nutzen wir die Vandermonde Identität [1, S. 16]

$$\sum_{\ddot{o}=0}^{\ddot{u}} \binom{n}{\ddot{o}} \binom{m}{\ddot{u}-\ddot{o}} = \binom{n+m}{\ddot{u}} \quad (0.9)$$

Dafür lassen wir die Summe von $\ell = 0$ beginnen, da der zusätzliche Summand das Ergebnis nicht ändert. Mit der Identität (0.9) erhalten wir

$$\begin{aligned}
\beta_k &= \sum_{r=0}^{k-1} \frac{1}{k} \binom{k}{r} y^r \sum_{\ell=0}^{r+1} \binom{r}{(r+1)-\ell} \binom{k-r}{\ell} \\
&= \sum_{r=0}^{k-1} \frac{1}{k} \binom{k}{r} \binom{k}{r+1} y^r \\
&= \sum_{r=0}^{k-1} \frac{1}{k} \frac{r+1}{r+1} \binom{k}{r} \binom{k}{r+1} y^r \\
&= \sum_{r=0}^{k-1} \frac{1}{r+1} \binom{k}{r} \binom{k-1}{r} y^r.
\end{aligned}$$

□

0.3 Marčenko-Pastur-Verteilung

Im Beweis über die Konvergenz der empirischen Spektralverteilung benutzen wir Elemente aus der Graphentheorie und der Stochastik, die wir vorher noch einführen.

Dafür definieren wir eine Klasse von *gerichteten Graphen*. Wir weisen den Kanten also eine Richtung zu.

Die Graphen haben die folgenden Eigenschaften.

Sei k die Anzahl an $\mathbf{i}/\mathbf{j}$ -Knoten mit der Gestalt $\mathbf{i} = \{i_1, \dots, i_k\}$ beziehungsweise $\mathbf{j} =$

$\{j_1, \dots, j_k\}$. Wobei die i -Knoten Werte in $\{0, \dots, p\}$ und j -Knoten Werte in $\{0, \dots, n\}$ annehmen können. Wenn unterschiedliche i/j -Knoten den gleichen Wert annehmen, bezeichnen wir sie als *koinzident*. Wir betrachten koinzidente Knoten als *einen* Knoten mit mehreren Namen. Nehmen zum Beispiel für die Knoten i_2 und i_5 den gleichen Wert x an, haben wir einen Knoten, welchen wir sowohl i_2 als auch i_5 nennen was für die Eigenschaften der Kanten wichtig wird. Zusätzlich gilt, wenn zum Beispiel alle i -Knoten den Wert p und alle j -Knoten den Wert n annehmen, dass wie entsprechend $2k$ Kanten zwischen den zwei Knoten gibt, da wir je k koinzidente i/j -Knoten haben.

Alle Kanten unterliegen den folgenden Regeln. Die Kanten laufen von Knoten i_m zu j_m und von j_m zu i_{m+1} mit $m = 1, \dots, k$ und der Konvention, dass es einen weiteren Knoten i_{k+1} gibt, der den Graphen abschließt und für den $i_{k+1} = i_1$ gilt.


Sei $\hat{r}$ die Anzahl nicht koinzidenter i -Knoten, dann ist $r = \hat{r} - 1$ und s die Anzahl nicht koinzidenter j -Knoten. Da k die Anzahl an i/j -Knoten ist, ist k auch die Anzahl an Kanten, die auf i -Knoten zeigen.

Diese Graphen Bezeichnen wir dann als $\Delta(k, r, s)$. Für den Beweis teilen wir die Graphen in drei Kategorien ein.

$\Delta_1(k, r, s)$: Diese Kategorie fasst alle Graphen zusammen, die zu jeder Kante von i nach j genau eine Kante vom gleichen j -Knoten zum gleichen i -Knoten haben. Hier gilt $r + s = k$.


$\Delta_2(k, r, s)$: Diese Kategorie beinhaltet alle Graphen, die mindestens einmal zwischen zwei Knoten genau eine Kante besitzen, also Graphen, die mindestens eine *Einzelkante* besitzen.

$\Delta_3(k, r, s)$: Die letzte Kategorie $\Delta_3(k, r, s)$ sind alle Graphen die weder in $\Delta_1(k, r)$ noch in $\Delta_2(k, r, s)$ gehören.



Beispiel für Graphen(Platzhalter)

Für bessere Lesbarkeit schreiben wir für die Kategorien $\Delta_{1,2,3}(k, r, s)$ nur noch $\Delta_{1,2,3}$. Wir bezeichnen zwei Graphen als isomorph, wenn wir für die i/j -Knoten eine geeignete Zuweisung von Werten finden so, dass die Graphen identisch sind. Dazu machen wir ein Beispiel:



Platzhalter

Graph a) ist isomorph zu b), da wir die Werte von zwei Knoten ändern können und einen identischen Graphen erhalten. Graph c) ist aber nicht isomorph zu a) da wir zusätzlich noch die Indices der Knotennamen tauschen müssten was aber nicht geht da der Knoten fest ist.

Für die Graphen haben wir noch ein paar Lemmata.

Lemma 0.10 ([3, S. 43]). Die Anzahl der Graphen in jeder Isomorphismenklasse von $\Delta(k, r, s)$ Graphen, mit festen k , r und s ist

$$\alpha = p(p-1) \cdots (p-r)n(n-1) \cdots (n-s+1) = p^{r+1}n^s \left(1 + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right)\right).$$

Lemma 0.11 ([3, S. 43]). Die Anzahl nicht koinzidenter Knoten von $\Delta_3(k, r, s)$ Graphen also $r+s$ ist kleiner gleich k .

Lemma 0.12 ([3, S. 43]). Die Anzahl nicht-isomorpher $\Delta_1(k, r, s)$ Graphen für festes g und r beträgt

$$\frac{1}{r+1} \binom{k}{r} \binom{k-1}{r}.$$

Aus der Stochastik benötigen wir einmal das Starke Gesetz der großen Zahlen und eine Metrik für Wahrscheinlichkeitsverteilungen.

Satz 0.13 (Starkes Gesetz der großen Zahlen [5, S. 139]). Seien $\{\mathcal{Z}_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ unabhängige und identisch verteilte Zufallsvariablen und besitzen ein Moment erster Ordnung, dann

gilt

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathcal{Z}_i \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{f.s.}} \mathbb{E}(\mathcal{Z}_1).$$

Definition 0.14 (Lévy-Metrik [5, S. 164]). Seien F_1 und F_2 Wahrscheinlichkeitsmaße auf $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ und zugehörigen Verteilungsfunktionen $\mathbf{F}_1$ und $\mathbf{F}_2$. Dann ist die *Lévy-Metrik* definiert durch

$$\mathcal{L}(F_1, F_2) = \inf\{\varepsilon > 0, x \in \mathbb{R}: \mathbf{F}_1(x - \varepsilon) - \varepsilon \leq \mathbf{F}_2(x) \leq \mathbf{F}_1(x + \varepsilon) + \varepsilon\}.$$

Für den Beweis Benutzen wir dann die Eigenschaft aus dem folgenden Lemma.

Lemma 0.15 ([3, S. 502]). Seien $A, B \in \mathbb{C}^{p \times n}$ und $S = AA^H$, $\bar{S} = BB^H$. Dann gilt für die Lévy-Metrik

$$\mathcal{L}^4(F^S, F^{\bar{S}}) \leq \frac{2}{p^2} \text{tr}(AA^H + BB^H) \text{tr}((A - B)(A - B)^H).$$

Satz 0.16. Seien $\{\mathbf{X}_\eta\}$ eine Folge an $p_\eta \times n_\eta$ Zufallsmatrizen wie in Definition 0.2 beschrieben und ihre Einträge $\{x_{ij}\}$ mit $i = 1, \dots, p_\eta$ und $j = 1, \dots, n_\eta$ unabhängig und identisch verteilte komplexe Zufallsvariablen mit Erwartungswert 0 und Varianz σ^2 . Sei weiter p_η und n_η monoton mit η steigend und $\lim_{\eta \rightarrow \infty} \frac{p_\eta}{n_\eta} = y \in (0, \infty)$.

Dann konvergiert die empirische Spektralverteilung der Stichproben-Kovarianzmatrix F^{S_η} mit $n \rightarrow \infty$ fast sicher gegen die Marčenko-Pastur-Verteilung F_y wie sie in Kapitel 0.2 beschrieben wurde.

Im folgenden Beweis nehmen wir mit Lemma 0.6 ohne Beschränkung der Allgemeinheit an, dass die Varianz $\sigma^2 = 1$ ist, wir also den Standardfall betrachten.

Wir zeigen die schwache Konvergenz der empirischen Spektralverteilung gegen die Marčenko-Pastur-Verteilung mithilfe der Momentmethode. Nach der Momentmethode konvergiert eine Folge an Wahrscheinlichkeitsverteilung $\{F_n\}$, wenn ihre Momente $\beta_{n,k}$ jeder Ordnung $k \geq 0$ endlich sind und gegen einen Grenzwert β_k konvergieren, schwach gegen eine Wahrscheinlichkeitsverteilung die eindeutig von ihren Momenten β_k bestimmt sein muss [3, S. 507]. Dass die Momente der Marčenko-Pastur-Verteilung die Eindeutigkeit erfüllen, haben wir bereits mit Lemma ... gezeigt.

Beweis. Die Momentmethode verlangt, dass die Momente jeder Ordnung der Verteilung endlich sind. Um das garantieren zu können, müssen wir dafür sorgen, dass die Zufallsvariablen $\{x_{ij}\}$ nicht unendlich groß werden können.

Seien $C \in \mathbb{R}_+$ und $\mathbf{1}$ die Indikatorfunktion auf $\mathbb{R}$, dann beschränken wir $\{x_{ij}\}$ und definieren die beschränkte Stichproben-Kovarianzmatrix $\hat{\mathbf{S}}_\eta$ durch

$$\begin{aligned}\hat{x}_{ij} &:= x_{ij} \mathbf{1}(|x_{ij}| \leq C), \\ \hat{x}_i &:= (\hat{x}_{i1}, \dots, \hat{x}_{ip})^\top, \\ \hat{\mathbf{S}}_\eta &:= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \hat{x}_i \hat{x}_i^H = \frac{1}{n} \hat{\mathbf{X}}_\eta \hat{\mathbf{X}}_\eta^H.\end{aligned}$$

Da das Beschränken die Erwartungswerte verändert hat, müssen wir $\hat{x}_{ij}$ noch zentralisieren, indem wir die Erwartungswerte von den Zufallsvariablen abziehen. Wir erhalten für die Zentralisierten Zufallsvariablen und die entsprechende Stichproben-Kovarianzmatrix erhalten wir durch

$$\begin{aligned}\tilde{x}_{ij} &:= \hat{x}_{ij} - \mathbb{E}(\hat{x}_{11}) \\ \tilde{x}_i &:= (\tilde{x}_{i1}, \dots, \tilde{x}_{ip})^\top \\ \tilde{\mathbf{S}}_\eta &:= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \tilde{x}_i \tilde{x}_i^H = \frac{1}{n} \tilde{\mathbf{X}}_\eta \tilde{\mathbf{X}}_\eta^H.\end{aligned}$$

Wir bezeichnen ab hier alle $\mathbf{X}_\eta$ als $\mathbf{X}$. Mit $\hat{\mathbf{S}}_\eta$ und $\tilde{\mathbf{S}}_\eta$ haben wir die beschränkte und zentralisierte Stichproben Kovarianzmatrix.

Im Folgenden wollen wir zeigen, dass sich durch das Beschränken und Zentralisieren der Grenzwert nicht ändert. Nach Lemma 0.15 erhalten wir

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^4(F^{\mathbf{S}}, F^{\hat{\mathbf{S}}_\eta}) &\leq \frac{2}{np} \operatorname{tr}(\mathbf{X} \mathbf{X}^H + \hat{\mathbf{X}} \hat{\mathbf{X}}^H) \operatorname{tr}((\mathbf{X} - \hat{\mathbf{X}})(\mathbf{X} - \hat{\mathbf{X}})^H) \\ &= \left(\frac{2}{np} \sum_{i,j} x_{ij} \bar{x}_{ij} + \hat{x}_{ij} \bar{\hat{x}}_{ij} \right) \left(\frac{1}{np} \sum_{i,j} (x_{ij} - \hat{x}_{ij}) \overline{(x_{ij} - \hat{x}_{ij})} \right) \\ &= \left(\frac{2}{np} \sum_{i,j} |x_{ij}|^2 + |\hat{x}_{ij}|^2 \right) \left(\frac{1}{np} \sum_{i,j} |x_{ij} - \hat{x}_{ij}|^2 \right) \\ &\leq \left(\frac{4}{np} \sum_{i,j} |x_{ij}|^2 \right) \left(\frac{1}{np} \sum_{i,j} |x_{ij}|^2 \mathbf{1}(|x_{ij}| > C) \right) \\ &\stackrel{(0.13) \text{ f.s.}}{\longrightarrow} 4 \mathbb{E}(|x_{ij}|^2) \mathbb{E}(|x_{ij}|^2 \mathbf{1}(|x_{ij}| > C)) \\ &\stackrel{\text{f.s.}}{\longrightarrow} 4 \mathbb{E}(|x_{ij}|^2 \mathbf{1}(|x_{ij}| > C)) \\ &\stackrel{C \rightarrow \infty}{\longrightarrow} 0.\end{aligned}$$

Der Abstand der empirischen Spektralverteilung und ihrer beschränkten Version ist also für ein hinreichend großes C vernachlässigbar klein. Nach Satz 0.4

$$\begin{aligned} \left\| F\hat{\mathbf{S}}_\eta - F\tilde{\mathbf{S}}_\eta \right\|_\infty &\leq \frac{1}{p} \text{rang}(\hat{\mathbf{X}} - \tilde{\mathbf{X}}) \\ &= \frac{1}{p} \text{rang}(\mathbb{E}(\hat{x}_{11})) \\ &= \frac{1}{p} \end{aligned}$$

können wir sehen, dass das Entfernen des Erwartungswertes, also die Zentralisierung der Zufallsvariablen, auch keinen Einfluss auf die Konvergenz hat.

Wir haben jetzt die Verteilung so modifiziert, dass die Zufallsvariablen nicht mehr unendlich groß werden können und den Erhalt des Erwartungswertes garantiert, ohne die Konvergenz zu beeinträchtigen.

Wir müssen aber noch dafür sorgen, dass die Varianz erhalten bleibt. Dafür müssen wir zeigen, dass durch Skalierung von $\tilde{\mathbf{S}}_\eta$ mit $\tilde{\sigma}^2 = \mathbb{E}(|\tilde{x}_{ij}|^2) \rightarrow 1$, wenn $C \rightarrow \infty$ gilt, der Abstand zu $\tilde{\mathbf{S}}_\eta$ wieder vernachlässigbar klein wird.

Es gilt wieder mit Lemma 0.15

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^4(F\tilde{\mathbf{S}}_\eta, F\tilde{\sigma}^{-2}\tilde{\mathbf{S}}_\eta) &\leq \frac{2}{n} \text{tr} \left(\tilde{\mathbf{X}}\tilde{\mathbf{X}}^H + \frac{1}{\tilde{\sigma}^2} \tilde{\mathbf{X}}\tilde{\mathbf{X}}^H \right) \text{tr} \left(\left(1 - \frac{1}{\tilde{\sigma}} \right)^2 \tilde{\mathbf{X}}\tilde{\mathbf{X}}^H \right) \\ &= \left(\frac{2}{np} \sum_{i,j} \tilde{x}_{ij}\tilde{x}_{ij}^H + \frac{\tilde{x}_{ij}\tilde{x}_{ij}^H}{\tilde{\sigma}^2} \right) \left(\frac{1}{np} \sum_{i,j} \tilde{x}_{ij}\tilde{x}_{ij}^H - \frac{2\tilde{x}_{ij}\tilde{x}_{ij}^H}{\tilde{\sigma}} + \frac{\tilde{x}_{ij}\tilde{x}_{ij}^H}{\tilde{\sigma}^2} \right) \\ &= \left(\frac{2}{np} \sum_{i,j} |\tilde{x}_{ij}|^2 + \frac{|\tilde{x}_{ij}|^2}{\tilde{\sigma}^2} \right) \left(\frac{1}{np} \sum_{i,j} |\tilde{x}_{ij}|^2 - \frac{2|\tilde{x}_{ij}|^2}{\tilde{\sigma}} + \frac{|\tilde{x}_{ij}|^2}{\tilde{\sigma}^2} \right) \\ &= \left(\frac{2}{np} \sum_{i,j} \frac{\tilde{\sigma}^2|\tilde{x}_{ij}|^2 + |\tilde{x}_{ij}|^2}{\tilde{\sigma}^2} \right) \left(\frac{1}{np} \sum_{i,j} \frac{\tilde{\sigma}^2|\tilde{x}_{ij}|^2 - \tilde{\sigma}2|\tilde{x}_{ij}|^2 + |\tilde{x}_{ij}|^2}{\tilde{\sigma}^2} \right) \\ &= 2 \left(\frac{\tilde{\sigma}^2 + 1}{np\tilde{\sigma}^2} \sum_{i,j} |\tilde{x}_{ij}|^2 \right) \left(\frac{(\tilde{\sigma} - 1)^2}{np\tilde{\sigma}^2} \sum_{i,j} |\tilde{x}_{ij}|^2 \right) \\ &\xrightarrow{\text{f.s.}} 2 \frac{\tilde{\sigma}^2 + 1}{\tilde{\sigma}^2} \mathbb{E}(|\tilde{x}_{ij}|^2) \frac{(\tilde{\sigma} - 1)^2}{\tilde{\sigma}^2} \mathbb{E}(|\tilde{x}_{ij}|^2) \\ &\xrightarrow{C \rightarrow \infty} 0. \end{aligned}$$

Damit haben wir die Endlichkeit der Momente aller Ordnungen garantiert. Für einen

besseren Überblick verwenden wir weiterhin die Notation von $\mathbf{S}_\eta$ und $\mathbf{X}$, verwenden aber die modifizierten Matrizen. Wir haben also eine gleichmäßig durch C beschränkte Zufallsvariable x_{ij} mit Erwartungswert 0 und Varianz 1.

Nach Definition 0.1 erhalten wir

$$\begin{aligned}\beta_k(\mathbf{S}_\eta) &= \int_{-\infty}^{\infty} x^k dF^{\mathbf{S}_\eta}(x) \\ &= \frac{1}{p} \operatorname{tr}(\mathbf{S}_\eta^k) \\ &= \frac{1}{pn^k} \operatorname{tr}((\mathbf{X}\mathbf{X}^H)^k) \\ &= \frac{1}{pn^k} \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^n (x_{ij} \bar{x}_{ij})^k\end{aligned}$$

für die Momente der empirischen Spektralverteilung. Da die Dimensionen p und n von $\mathbf{X}$ gegen unendlich laufen, läuft auch die Anzahl der Summanden der Spur gegen unendlich.

Hier verwenden wir die oben eingeführte Klasse von Graphen. Wir können die Spur nämlich mit $\mathbf{i} = \{i_1, \dots, i_k\}$ und $\mathbf{j} = \{j_1, \dots, j_k\}$, wobei die Elemente von $\mathbf{i}$ in $\{1, \dots, p\}$ und $\mathbf{j}$ in $\{1, \dots, n\}$ liegen, durch

$$\frac{1}{pn^k} \operatorname{tr}((\mathbf{X}\mathbf{X}^H)^k) = \frac{1}{pn^k} \sum_{\mathbf{i}} \sum_{\mathbf{j}} x_{i_1 j_1} \bar{x}_{i_2 j_1} x_{i_2 j_2} \bar{x}_{i_3 j_2} \cdots x_{i_k j_k} \bar{x}_{i_1 j_k}$$

beschreiben. Hier sind $x_{i_1 j_1} \bar{x}_{i_2 j_1} \dots$ die Faktoren der einzelnen Summanden der Spur und wir summieren über alle Permutationen von $\mathbf{i}$ und $\mathbf{j}$. Die Zufallsvariablen x_{ij} stellen die Kanten von $\mathbf{i}$ -Knoten zu $\mathbf{j}$ -Knoten und $\bar{x}_{ij}$ Kanten von $\mathbf{j}$ - zu $\mathbf{i}$ -Knoten dar. Wir definieren dann

$$\frac{1}{pn^k} \sum_{\mathbf{i}} \sum_{\mathbf{j}} x_{i_1 j_1} \bar{x}_{i_2 j_1} x_{i_2 j_2} \bar{x}_{i_3 j_2} \cdots x_{i_k j_k} \bar{x}_{i_1 j_k} := \frac{1}{pn^k} \sum_{\mathbf{i}, \mathbf{j}} \mathbf{X}_{\Delta(k, r, s)}.$$

Nach der Momentmethode konvergiert die empirische Spektralverteilung schwach gegen die Marčenko-Pastur-Verteilung, wenn die Momente der empirische Spektralverteilung gegen die der Marčenko-Pastur-Verteilung konvergieren. Das zeigen wir, indem wir den Erwartungswert und die Varianz der Momente der empirische Spektralverteilung bestimmen. Sie konvergieren, wenn der Erwartungswert $\mathbb{E}(\beta_k(\mathbf{S}_\eta))$ gegen die Momente der Marčenko-Pastur-Verteilung läuft und die Varianz gegen null geht.

Fangen wir an mit dem Erwartungswert. Es gilt

$$\mathbb{E}(\beta_k(S_n)) = \frac{1}{pn^k} \sum_{i,j} \mathbb{E}(\mathbf{X}_{\Delta(k,r,s)}).$$

Teilen wir die Graphen in ihre Kategorien ein, erhalten wir mit Lemma 0.10

$$\mathbb{E}(\beta_k(S_n)) = \frac{1}{pn^k} \left(\overbrace{\sum_{\Delta_1} \alpha \mathbb{E}(\mathbf{X}_{\Delta_1})}^{W_1:=} + \overbrace{\sum_{\Delta_2} \alpha \mathbb{E}(\mathbf{X}_{\Delta_2})}^{W_2:=} + \overbrace{\sum_{\Delta_3} \alpha \mathbb{E}(\mathbf{X}_{\Delta_3})}^{W_3:=} \right).$$

Für W_1 erhalten wir mit $s = k - r$ und nach Lemma 0.10 und Lemma 0.11

$$W_1 = \frac{1}{n^k p} \sum_{\Delta_1} \frac{1}{r+1} \binom{k}{r} \binom{k-1}{r} p^{r+1} n^{k-r} \left(1 + \mathcal{O}\left(\frac{1}{p}\right) \right) \mathbb{E}(\mathbf{X}_{\Delta_1})$$

Da es zu jeder Kante genau eine Kante in die entgegengesetzte Richtung gibt, gilt $\mathbb{E}(|x_{ij}|^2) = 1$. Wir können also schreiben

$$\begin{aligned} W_1 &= \frac{1}{n^k p} \sum_{\Delta_1} \frac{1}{r+1} \binom{k}{r} \binom{k-1}{r} p^{r+1} n^{k-r} \left(1 + \mathcal{O}\left(\frac{1}{p}\right) \right) \\ &= \sum_{\Delta_1} \frac{1}{r+1} \binom{k}{r} \binom{k-1}{r} \frac{p^{r+1} n^{k-r}}{n^k p} \left(1 + \mathcal{O}\left(\frac{1}{p}\right) \right) \\ &= \sum_{\Delta_1} \frac{1}{r+1} \binom{k}{r} \binom{k-1}{r} y^r \left(1 + \mathcal{O}\left(\frac{1}{p}\right) \right) \\ &= \sum_{r=0}^{k-1} \frac{1}{r+1} \binom{k}{r} \binom{k-1}{r} y^r + \mathcal{O}\left(\frac{1}{p}\right). \end{aligned} \tag{0.10}$$

Für W_2 können wir sehen, dass

$$W_2 = \frac{1}{n^k p} \sum_{\Delta_2} \alpha \mathbb{E}(\mathbf{X}_{\Delta_2}) = 0 \tag{0.11}$$

gilt, da wir den Erwartungswert auf Kanten aufteilen können, und es in Kategorie Δ_2 mindestens eine Einzelkante gibt. Es gibt demnach mindestens ein ω_i in

$$\mathbb{E}(\mathbf{X}_{\Delta_2}) = \mathbb{E}(x_{i_1 j_1}^{\omega_1}) \mathbb{E}(x_{i_2 j_1}^{\omega_2}) \cdots$$

welches gleich 1 ist, woraus folgt, dass $\mathbb{E}(x_{i_k j_k}^1) = 0 = \mathbb{E}(\mathbf{X}_{\Delta_2})$ ist.

Für W_3 erhalten wir wieder mit Lemma 0.10, dass

$$W_3 = \frac{1}{n^k p} \sum_{\Delta_3} \alpha(\mathbf{X}_{\Delta_3})$$

gilt. Weiter oben haben wir gezeigt, dass x_{ij} gleichmäßig durch ein $C > 0$ beschränkt ist. Daraus erhalten wir, dass $|X_{\Delta(k,r,s)}| \leq C^{2k}$ gilt. Mit Lemma 0.11 wissen wir, dass die Anzahl nicht koinzidenter Knoten maximal k betragen kann. Dadurch ist die Anzahl unterschiedlicher Δ_3 Graphen in $\mathcal{O}(n^k)$. Wir haben also

$$\begin{aligned} \frac{1}{n^k p} \sum_{\Delta_3} \alpha(\mathbf{X}_{\Delta_3}) &= \frac{C^{2k}}{n^k p} \mathcal{O}(n^k) \\ &= \mathcal{O}\left(\frac{1}{p}\right). \end{aligned} \quad (0.12)$$

Mit (0.10), (0.11) und (0.12) erhalten wir dann

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\beta_k(S_n)) &= \sum_{r=0}^{k-1} \frac{1}{r+1} \binom{k}{r} \binom{k-1}{r} y^r + \mathcal{O}\left(\frac{1}{p}\right) \\ &= \beta_k(y, \sigma^2) + o(1) \end{aligned} \quad (0.13)$$

Jetzt fehlt noch die Varianz. Für diese gilt

$$\text{Var}(\beta_k(S_n)) := \frac{1}{pn^k} \sum_{i,j} (\mathbb{E}(\mathbf{X}_{\Delta_a(k,r,s)} \mathbf{X}_{\Delta_b(k,r,s)}) - \mathbb{E}(\mathbf{X}_{\Delta_a(k,r,s)}) \mathbb{E}(\mathbf{X}_{\Delta_b(k,r,s)})).$$

Dabei sind Δ_a und Δ_b verschiedene Permutationen i und j . Wie für den Erwartungswert suchen wir uns Kategorien, um die Varianz stückweise zu beschreiben.

Als Erstes betrachten wir alle Graphen Δ_a und Δ_b so, dass Δ_a und Δ_b unabhängig sind, sich also keine Kanten teilen. Daraus folgt direkt durch Rechenregeln von Erwartungswerten, dass

$$\mathbb{E}(\mathbf{X}_{\Delta_a(k,r,s)} \mathbf{X}_{\Delta_b(k,r,s)}) = \mathbb{E}(\mathbf{X}_{\Delta_a(k,r,s)}) \mathbb{E}(\mathbf{X}_{\Delta_b(k,r,s)})$$

gilt. Das heißt, für unabhängige Graphen ist die Varianz gleich 0.

Als Nächstes betrachten wir alle Graphen $\Delta_a \cup \Delta_b$, die mindestens eine Einzelkante

besitzen. Damit erhalten wir durch Δ_2 Eigenschaften wieder

$$\mathbb{E}(\mathbf{X}_{\Delta_a(k,r,s)}\mathbf{X}_{\Delta_b(k,r,s)}) = 0 = \mathbb{E}(\mathbf{X}_{\Delta_a(k,r,s)})\mathbb{E}(\mathbf{X}_{\Delta_b(k,r,s)}).$$

In allen anderen Möglichkeiten haben die Graphen keine Einzelkante und Δ_a und Δ_b teilen sich Kanten. Analog zu W_3 können wir sagen, dass die Anzahl möglicher Graphen in $\mathcal{O}(n^k)$ liegt. Da wir zwei Graphen haben ist die Anzahl also in $\mathcal{O}(n^{2k})$. Durch die gleichmäßige Beschränkung von x_{ij} durch C können wir die Varianz durch

$$\begin{aligned}\text{Var}(\beta_k(S_n)) &\leq \frac{1}{p^2 n^{2k}} C \mathcal{O}(n^{2k}) \\ &= \mathcal{O}\left(\frac{1}{p^2}\right)\end{aligned}\tag{0.14}$$

abschätzen.

Mit dem Erwartungswert (0.13) und der Varianz (0.14) können wir darauf schließen, dass die empirische Spektralverteilung fast sicher gegen die Marčenko-Pastur-Verteilung konvergiert. $\square$