



## 第七章 群环域

大连理工大学软件学院  
陈志奎 教授

办公室：综合楼405，Tel: 62274392

实验室：综合楼

Mobile: 13478461921

Email: [zkchen@dlut.edu.cn](mailto:zkchen@dlut.edu.cn)  
[zkchen00@hotmail.com](mailto:zkchen00@hotmail.com)



# 回 顾

- 半群和独异点的定义及性质
- 半群和独异点的同态与同构
- 积半群

## 7.2.1 群的概念

- **定义7.7** 给定代数系统  $V = \langle G, \odot \rangle$ , 若  $\langle G, \odot \rangle$  是独异点并且每个元素均存在逆元, 或满足  $\odot$  是可结合的并且关于  $\odot$  存在幺元并且  $G$  中每个元素关于  $\odot$  是可逆的, 则称  $\langle G, \odot \rangle$  是群, 记为  $G$ 。
  - 群比独异点具有更强的条件。
  - 在半群、独异点、群这些概念中, 由于只含有一个二元运算, 所以在不发生混淆的情况下, 可以将算符省去。例如将  $x*y$  写成  $xy$ 。



代数系统  
 $\langle S, \odot \rangle$

$\odot$ 可结合

有么元 $e$

有逆元 $a^{-1}$


群  
 $\langle S, \odot, e, a^{-1} \rangle$

或

独异点  
 $\langle S, \odot, e \rangle$

有逆元 $a^{-1}$

群  
 $\langle S, \odot, e, a^{-1} \rangle$

- 
- 例7.8  $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$ , 整数加群,  
 $\langle \mathbf{Q}, + \rangle$ , 有理数加群,  
 $\langle \mathbf{R}, + \rangle$ , 实数加群,  
 $\langle \mathbf{C}, + \rangle$ , 复数加群, 他们都是群。
  - 例7.9 给定 $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$ 和 $\langle \mathbf{Q}, * \rangle$ , 其中 $\mathbf{Z}$ 和 $\mathbf{Q}$ 分别为整数集和有理数集,  $+$  和  $*$  分别是一般意义下的加法和乘法。可知 $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$ 是群,  $0$ 是幺元, 每个元素  $l \in \mathbf{Z}$  的逆元为  $-l$ ;  $\langle \mathbf{Q}, * \rangle$ 不是群,  $1$ 是幺元,  $0$ 无逆元。但 $\langle \mathbf{Q} - \{0\}, * \rangle$ 是群。

- **例7.10** 设  $G=\{e, a, b, c\}$ ,  $G$  上的运算由下表表示, 不难验证  $G$  是一个群。

	$e$	$a$	$b$	$c$
$e$	$e$	$a$	$b$	$c$
$a$	$a$	$e$	$c$	$b$
$b$	$b$	$c$	$e$	$a$
$c$	$c$	$b$	$a$	$e$

特征:

1. 满足**交换律**
2. 每个元素都是自己的**逆元**
3.  $a, b, c$ 中任何两个元素运算结果都等于剩下的第三个元素。

这个群为**Klein四元群**, 简称**四元群**。

- **例7.11** 某二进制码的码字  $x = x_1 x_2 \cdots x_7$  由7位构成，其中  $x_1, x_2, x_3$  和  $x_4$  为数据位， $x_5, x_6, x_7$  为校验位，并且满足：

$$x_5 = x_1 \oplus x_2 \oplus x_3$$

$$x_6 = x_1 \oplus x_2 \oplus x_4$$

$$x_7 = x_1 \oplus x_3 \oplus x_4$$

这里 $\oplus$ 是模2加法。设 $G$ 为所有码字构成的集合，在 $G$ 上定义的二元运算如下：

$$\forall x, y \in G,$$

$$x \circ y = z_1 z_2 \cdots z_7,$$

$$z_i = x_i \oplus y_i, \quad i=1, 2, \dots, 7$$


证明 $\langle G, \circ \rangle$ 构成群。

- **证明：**任取  $x = x_1 \cdots x_7, y = y_1 \cdots y_7, x \circ y = z_1 \cdots z_7$ 。首先验证  $z_5 = z_1 \oplus z_2 \oplus z_3$ 。

$$\begin{aligned} z_1 \oplus z_2 \oplus z_3 &= (x_1 \oplus y_1) \oplus (x_2 \oplus y_2) \oplus (x_3 \oplus y_3) \\ &= (x_1 \oplus x_2 \oplus x_3) \oplus (y_1 \oplus y_2 \oplus y_3) \\ &= x_5 \oplus y_5 \\ &= z_5 \end{aligned}$$

同理可证  $z_6 = z_1 \oplus z_2 \oplus z_4, z_7 = z_1 \oplus z_3 \oplus z_4$ 。所以  $x \circ y = z \in G$ ，从而证明了具有**封闭性**。





任取 $x, y, z \in G$  令  $(x \circ y) \circ z = a_1 \dots a_7$ ,  $x \circ (y \circ z) = b_1 \dots b_7$ 。

下面证明 $a_i = b_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, 7$ 。

由于 $\oplus$ 运算满足结合律,  
因此有

$$a_i = (x_i \oplus y_i) \oplus z_i = x_i \oplus (y_i \oplus z_i) = b_i,$$

从而证明了 $G$ 中满足结合律。

易知单位元0000000,  $\forall x \in G$ ,  $x^{-1} = x$ 。

综上所述,  $G$ 构成群。

## 7.2.2 群的性质

- 群的基本性质：

(1) 封闭性：若  $a, b \in G$ ，则存在唯一确定的  $c \in G$ ，使得  $a * b = c$ ；

(2) 结合律成立：任意  $a, b, c \in G$ ，有  $(a * b) * c = a * (b * c)$ ；

(3) 单位元存在：存在  $e \in G$ ，对任意  $a \in G$ ，满足  $a * e = e * a = a$ ，称  $e$  为单位元，也称幺元；

(4) 逆元存在：任意  $a \in G$ ，存在唯一确定的  $b \in G$ ， $a * b = b * a = e$ （单位元），则称  $a$  与  $b$  互为逆元素，简称逆元，记作  $a^{-1} = b$ 。

# 群中元素的幂

- **定义7.8** 设**G**是群，**a**∈**G**，**n**∈**Z**，则**a**的**n次幂**。

$$a^n = \begin{cases} e & n = 0 \\ a^{n-1}a & n > 0 \\ (a^{-1})^m & n < 0, n = -m \end{cases}$$

群中元素可以定义负整数次幂。

在 $\langle \mathbf{Z}_3, \oplus \rangle$ 中有

$$2^{-3} = (2^{-1})^3 = 1^3 = 1 \oplus 1 \oplus 1 = 0$$

在 $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$ 中有

$$(-2)^{-3} = 2^3 = 2 + 2 + 2 = 6$$

# 群的性质：幂运算规则

- **定理7.7** 设 $\mathbf{G}$ 为群，则 $\mathbf{G}$ 中的幂运算满足：

(1)  $\forall a \in G, (a^{-1})^{-1} = a$

(2)  $\forall a, b \in G, (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$

(3)  $\forall a \in G, a^n a^m = a^{n+m}, n, m \in \mathbb{Z}$

(4)  $\forall a \in G, (a^n)^m = a^{nm}, n, m \in \mathbb{Z}$

(5) 若 $\mathbf{G}$ 为交换群，则 $(ab)^n = a^n b^n$ .

- **证明：**(1)  $(a^{-1})^{-1}$ 是 $a^{-1}$ 的逆元， $a$ 也是 $a^{-1}$ 的逆元. 根据逆元唯一性，等式得证。

(2)  $b^{-1}a^{-1}(ab) = b^{-1}(a^{-1}a)b = b^{-1}b = e,$

同理  $(ab)(b^{-1}a^{-1}) = e,$

故 $b^{-1}a^{-1}$ 是 $ab$ 的逆元. 根据逆元的唯一性等式得证。

# 群的性质：方程存在唯一解

- **定理7.8**  $G$ 为群,  $\forall a, b \in G$ , 方程 $ax=b$ 和 $ya=b$ 在 $G$ 中有解且仅有惟一解.

- **证明:**  $a^{-1}b$  代入方程左边的 $x$  得

$$a(a^{-1}b) = (aa^{-1})b = eb = b$$

所以 $a^{-1}b$ 是该方程的解. 下面证明惟一性.

假设 $c$ 是方程 $ax = b$ 的解, 必有 $ac = b$ , 从而有

$$c = ec = (a^{-1}a)c = a^{-1}(ac) = a^{-1}b$$

同理可证 $ba^{-1}$ 是方程  $ya = b$ 的惟一解.

- **例7.15** 设群 $G = \langle P(\{a, b\}), \oplus \rangle$ , 其中 $\oplus$ 为对称差. 解下列群方程:  $\{a\} \oplus X = \emptyset$ ,  $Y \oplus \{a, b\} = \{b\}$

解: 
$$X = \{a\}^{-1} \oplus \emptyset = \{a\} \oplus \emptyset = \{a\},$$

$$Y = \{b\} \oplus \{a, b\}^{-1} = \{b\} \oplus \{a, b\} = \{a\}$$

# 群的性质：消去律

- **定理7.9**  $G$ 为群，则 $G$ 中适合消去律，即对任意 $a, b, c \in G$ 有

(1) 若  $ab = ac$ ，则  $b = c$ .

(2) 若  $ba = ca$ ，则  $b = c$ .

证明略。

- **例7.16** 设 $G = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 是 $n$ 阶群，令
$$a_i G = \{a_i a_j \mid j = 1, 2, \dots, n\}$$

证明 $a_i G = G$ .

- **证明：** 由群中运算的封闭性有 $a_i G \subseteq G$ . 假设 $a_i G \subsetneq G$ ，即 $|a_i G| < n$ .

必有 $a_j, a_k \in G$ 使得

$$a_i a_j = a_i a_k \quad (j \neq k)$$

由消去律得 $a_j = a_k$ ，与 $|G| = n$ 矛盾.

# 群的性质：元素的阶

- **定义7.9** 设 $G$ 是群， $a \in G$ ，使得等式  $a^k = e$  成立的最小正整数  $k$  称为  $a$  的阶，记作  $|a| = k$ ，称  $a$  为  $k$  阶元。若不存在这样的正整数  $k$ ，则称  $a$  为无限阶元。

例如，在  $\langle \mathbb{Z}_6, \oplus \rangle$  中，

2和4是3阶元，

3是2阶元，

1和5是6阶元，

0是1阶元。

在  $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$  中，0是1阶元，其它整数的阶都不存在。

# 群的性质：元素的阶

- **定理7.10**  $G$ 为群,  $a \in G$ 且  $|a| = r$ . 设 $k$ 是整数, 则

(1)  $a^k = e$ 当且仅当 $r \mid k$

(2)  $|a^{-1}| = |a|$ , (3)  $|ab| = |ba|$ ,  $a, b \in G$

- **证明** : (1) 充分性. 由于 $r \mid k$ , 必存在整数 $m$ 使得 $k = mr$ , 所以有

$$a^k = a^{mr} = (a^r)^m = e^m = e.$$

必要性. 根据除法, 存在整数  $m$  和  $i$  使得

$$k = mr + i, 0 \leq i < r$$

从而有  $e = a^k = a^{mr+i} = (a^r)^m a^i = e a^i = a^i$

因为 $|a| = r$ , 必有 $i = 0$ . 这就证明了 $r \mid k$ .

(2) 由  $(a^{-1})^r = (a^r)^{-1} = e^{-1} = e$

可知  $a^{-1}$  的阶存在. 令 $|a^{-1}| = t$ , 根据上面的证明有 $t \mid r$ .

$a$ 又是 $a^{-1}$ 的逆元, 所以  $r \mid t$ . 从而证了 $r = t$ , 即 $|a^{-1}| = |a|$



# 群的性质：元素的阶

(3) 设  $|ab| = r$ ,  $|ba| = t$ , 则有

$$\begin{aligned}(ab)^{t+1} &= \underbrace{(ab)(ab)\dots(ab)}_{t+1\uparrow} \\ &= a \underbrace{(ba)(ba)\dots(ba)}_{t\uparrow} b \\ &= a(ba)^t b = aeb = ab\end{aligned}$$

由消去律得  $(ab)^t = e$ , 从而可知,  $r \mid t$ .

同理可证  $t \mid r$ . 因此  $|ab| = |ba|$ 。

# 群的性质：群的阶

- **定义7.10** 若群 $G$ 是有穷集，则称 $G$ 是**有限群**，否则称为**无限群**。群 $G$ 的**基数**称为群 $G$ 的**阶**。只含有**单位元**的群称为**平凡群**。
- **例7.18**  $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 是无穷群， $\langle S, \odot \rangle$ ，其中 $S = \{a, b, c\}$ ， $\odot$ 的运算表如下表可以验证， $\langle S, \odot \rangle$ 是群， $a$ 为幺元， $b$ 和 $c$ 互为逆元；又因为 $|G| = 3$ ，故 $\langle S, \odot \rangle$ 是3阶群。

$\odot$	$a$	$b$	$c$
$a$	$a$	$b$	$c$
$b$	$b$	$c$	$a$
$c$	$c$	$a$	$b$

## 群的性质：Abel群

- **定义7.11** 给定群 $G$ ，若 $\odot$ 是**可交换**的，则称 $G$ 是**可交换群**或 $G$ 是**Abel群**。
- **例7.19** 具有一般意义下的加法运算的所有整数的集合 $Z$ 是一个**Abel群**，如果 $a \in Z$ ，那么 $a$ 的逆是它的负数 $-a$ 。
- **例7.20**  $\langle Z, + \rangle$ 和 $\langle R, + \rangle$ 是无限群， $\langle Z_n, \oplus \rangle$ 是有限群也是 $n$ 阶群。**klein**四元群是四阶群。 $\langle \{0\}, + \rangle$ 是平凡群。上述的所有群都是交换群，但是 $n$ 阶（ $n \geq 2$ ）实可逆矩阵的集合关于矩阵乘法构成的群是非交换群，因为矩阵乘法不满足交换律。

## 群的性质: **Abel群**

- **定理7.11** 给定群 $\langle G, \otimes \rangle$ , 则

$\langle G, \otimes \rangle$ 为**Abel群**

$$\Leftrightarrow (\forall a)(\forall b)(a, b \in G \rightarrow (a \otimes b)^2 = a^2 \otimes b^2)$$

- **证明:** 充分性:

因为 $\langle G, \otimes \rangle$ 是群, 由对任意 $a, b \in G$ , 有

$$(a \otimes b)^2 = a^2 \otimes b^2$$

$$\Rightarrow (a \otimes b) \otimes (a \otimes b) = (a \otimes a) \otimes (b \otimes b)$$

$$\Rightarrow a \otimes (b \otimes a) \otimes b = a \otimes (a \otimes b) \otimes b$$

$$\Rightarrow (b \otimes a) \otimes b = (a \otimes b) \otimes b$$

$$\Rightarrow b \otimes a = a \otimes b$$

可见,  $\otimes$ 是交换的, 故 $\langle G, \otimes \rangle$ 是**Abel群**。



必要性:

$\langle G, \otimes \rangle$  是Abel群, 故  $\langle G, \otimes \rangle$  是群; 又有, 对任意的  $a, b \in G$ , 均有

$$\begin{aligned}(a \otimes b)^2 &= (a \otimes b) \otimes (a \otimes b) \\ &= a \otimes (b \otimes a) \otimes b \\ &= a \otimes (a \otimes b) \otimes b \\ &= (a \otimes a) \otimes (b \otimes b) \\ &= a^2 \otimes b^2\end{aligned}$$

综上所述, 定理得证。



## 7.3 子群

- **定义7.12** 设 $G$ 是群,  $H$ 是 $G$ 的非空子集,
    - (1) 如果 $H$ 关于 $G$ 中的运算构成群, 则称 $H$ 是 $G$ 的**子群**, 记作 $H \leq G$ .
    - (2) 若 $H$ 是 $G$ 的子群, 且 $H \subset G$ , 则称 $H$ 是 $G$ 的**真子群**, 记作 $H < G$ .
    - 如果 $G$ 是一个群,  $H$ 是 $G$ 的一个子群, 那么 $H$ 也是关于 $G$ 中运算的一个群, 因为 $G$ 中的结合性质在 $H$ 中也成立。
- 例如  $n\mathbb{Z}$  ( $n$ 是自然数) 是整数加群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的子群. 当 $n \neq 1$ 时,  $n\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的真子群.
- 对任何群 $G$ 都存在子群.  $G$ 和 $\{e\}$ 都是 $G$ 的子群, 称为 $G$ 的**平凡子群**.

## 7.3.1 子群

- 例7.21  $\langle V, \oplus \rangle$  是群  $\langle U, \oplus \rangle$  的子群

$\Rightarrow e_V = e_U$ , 其中  $e_V, e_U$  分别是两个群的幺元, 即群与其子群具有相同的幺元。

- 证明: 因为  $\langle V, \oplus \rangle$  是群  $\langle U, \oplus \rangle$  的子群, 则对任意  $a \in V \subseteq U$ , 有

$$a \oplus e_V = a = a \oplus e_U$$

根据群的可约律, 得  $e_V = e_U$ 。

## 7.3.2 子群的判定

- 定理7.12 (判定定理一)

设 $G$ 为群,  $H$ 是 $G$ 的非空子集, 则 $H$ 是 $G$ 的子群当且仅当

(1)  $\forall a, b \in H, \text{ 有 } ab \in H;$

(2)  $\forall a \in H, \text{ 有 } a^{-1} \in H.$

- 证明: 必要性是显然的。为证明充分性, 只需证明 $e \in H$ 。

因为 $H$ 非空, 存在 $a \in H$ 。由条件(2) 知 $a^{-1} \in H$ , 根据条件(1)  $aa^{-1} \in H$ , 即 $e \in H$ 。

- 本定理表明 $\langle H, \odot \rangle$ 是 $\langle G, \odot \rangle$ 的子群的充要条件是 $H$ 对于 $\odot$ 封闭及 $H$ 中每个元素存在逆元。



## 7.3.2 子群的判定

- 定理7.13 (判定定理二)

设 $G$ 为群,  $H$ 是 $G$ 的非空子集, 则 $H$ 是 $G$ 的子群当且仅当

$$\forall a, b \in H, \text{ 有 } ab^{-1} \in H.$$

- 证明: 必要性显然. 只证充分性.

因为 $H$ 非空, 必存在 $a \in H$ .

根据给定条件得 $aa^{-1} \in H$ , 即 $e \in H$ .

任取 $a \in H$ , 由 $e, a \in H$ 得 $ea^{-1} \in H$ , 即 $a^{-1} \in H$ .

任取 $a, b \in H$ , 知 $b^{-1} \in H$ . 再利用给定条件得 $a(b^{-1})^{-1} \in H$ , 即 $ab \in H$ .

综合上述, 可知 $H$ 是 $G$ 的子群.

## 7.3.2 子群的判定

- 定理7.14 (判定定理三)

设 $G$ 为群,  $H$ 是 $G$ 的非空有穷子集, 则 $H$ 是 $G$ 的子群当且仅当

$$\forall a, b \in H, \text{ 有 } ab \in H.$$

- 证明: 必要性显然. 为证充分性, 只需证明 $a \in H$ 有 $a^{-1} \in H$ .

任取 $a \in H$ , 若 $a = e$ , 则 $a^{-1} = e \in H$ .

若 $a \neq e$ , 令 $S = \{a, a^2, \dots\}$ , 则 $S \subseteq H$ .

由于 $H$ 是有穷集, 必有 $a^i = a^j (i < j)$ .

根据 $G$ 中的消去律得 $a^{j-i} = e$ , 由 $a \neq e$ 可知 $j - i > 1$ , 由此得

$$a^{j-i-1}a = e \text{ 和 } aa^{j-i-1} = e$$

从而证明了 $a^{-1} = a^{j-i-1} \in H$ .

## 7.3.2 子群的判定

- **例7.22** 设 $G$ 是群,  $H, K$ 是 $G$ 的子群, 证明 $H \cap K$ 也是 $G$ 的子群。

- **证明:** 由 $e \in H \cap K$ 可知 $H \cap K$ 非空。

任取 $a, b \in H \cap K$ , 则 $a \in H, a \in K, b \in H, b \in K$ 。

由于 $H$ 和 $K$ 是 $G$ 的子群, 必有 $ab^{-1} \in H$ 和 $ab^{-1} \in K$ , 因此

$$ab^{-1} \in H \cap K。$$

根据判定定理二 (定理7.13) 命题得证。

## 7.3.3 子群的性质：生成子群

- **定义7.14** 设 $G$ 为群， $a \in G$ ，令 $H = \{a^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ ，则 $H$ 是 $G$ 的子群，称为由 $a$ 生成的子群，记作 $\langle a \rangle$ .

- **证明：**首先由 $a \in \langle a \rangle$ 知道 $\langle a \rangle \neq \emptyset$ . 任取 $a^m, a^i \in \langle a \rangle$ ，则

$$a^m(a^i)^{-1} = a^m a^{-i} = a^{m-i} \in \langle a \rangle$$

根据判定定理二可知 $\langle a \rangle \leq G$ .

例如整数加群，由2生成的子群 $\langle 2 \rangle = \{2^k \mid k \in \mathbb{Z}\} = 2\mathbb{Z}$ ;

$\langle \mathbb{Z}_6, \oplus \rangle$ 中，由2生成的子群 $\langle 2 \rangle = \{0, 2, 4\}$

**Klein**四元群 $G = \{e, a, b, c\}$ 的所有生成子群是：

$$\langle e \rangle = \{e\}, \langle a \rangle = \{e, a\}, \langle b \rangle = \{e, b\}, \langle c \rangle = \{e, c\}.$$

### 7.3.3 子群的性质：中心C

- **定义7.15** 设**G**为群,令 $C = \{a \mid a \in G \wedge \forall x \in G(ax = xa)\}$   
,

则**C**是**G**的子群, 称为**G**的中心.

- **证明:**  $e \in C$ . **C**是**G**的非空子集. 任取 $a, b \in C$ , 只需证明 $ab^{-1}$ 与**G**中所有的元素都可交换.  $\forall x \in G$ , 有

$$\begin{aligned}(ab^{-1})x &= ab^{-1}x = ab^{-1}(x^{-1})^{-1} \\ &= a(x^{-1}b)^{-1} = a(bx^{-1})^{-1} = a(xb^{-1}) \\ &= (ax)b^{-1} = (xa)b^{-1} = x(ab^{-1})\end{aligned}$$

由判定定理二可知 $C \leq G$ .

对于阿贝尔群**G**, 因为**G**中所有的元素互相都可交换, **G**的中心就等于**G**, 但是对某些非交换群**G**, 他的中心是{**e**}.

## 7.3.3 子群的性质：子群的交

- **例7.23** 设 $G$ 是群， $H, K$ 是 $G$ 的子群. 证明

(1)  $H \cap K$ 也是 $G$ 的子群

(2)  $H \cup K$ 是 $G$ 的子群当且仅当  $H \subseteq K$  或  $K \subseteq H$

- **证明：** (1)由  $e \in H \cap K$  知  $H \cap K$  非空.

任取  $a, b \in H \cap K$ , 则  $a \in H, a \in K, b \in H, b \in K$ .

必有  $ab^{-1} \in H$  和  $ab^{-1} \in K$ , 从而  $ab^{-1} \in H \cap K$ . 因此  $H \cap K \leq G$ .

(2) 充分性显然, 只证必要性. 用反证法.

假设  $H$ 不是 $K$ 的子集 且  $K$ 不是 $H$ 的子集, 那么存在 $h$ 和 $k$ 使得

$$h \in H \wedge h \notin K, \quad k \in K \wedge k \notin H$$

推出  $hk \notin H$ . 否则由  $h^{-1} \in H$  得  $k = h^{-1}(hk) \in H$ , 与假设矛盾.

同理可证  $hk \notin K$ . 从而得到  $hk \notin H \cup K$ . 与 $H \cup K$ 是子群矛盾.


## 7.3.3 子群的性质：子群的格

- **定义7.16** 设 $G$ 为群，令

$$L(G) = \{H \mid H \text{ 是 } G \text{ 的子群}\}$$


则偏序集 $\langle L(G), \subseteq \rangle$ 称为 $G$ 的**子群格**

实例：Klein四元群的子群格如下：





## 总结




- 群的定义与性质
- 子群
- 子群判定定理
- 子群的性质





# 作业



- **P174: 7-10**