

# Fysica: mechanica, optica en moderne fysica

Bert De Saffel

2017-2018

# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Foutentheorie</b>	<b>3</b>
1.1	Vorm . . . . .	3
1.2	Soorten . . . . .	3
1.2.1	Fout op meting . . . . .	3
1.2.2	Statistische fout . . . . .	4
1.2.3	Fout op berekening . . . . .	4
<b>I</b>	<b>Mechanica</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>Beweging in 2 en 3 dimensies</b>	<b>8</b>
2.1	Begrippen . . . . .	8
2.2	Formules . . . . .	8
2.3	Conceptvraag: Helikopter . . . . .	9
2.4	Conceptvraag: Snelheid en versnelling . . . . .	9
<b>3</b>	<b>Kracht en beweging</b>	<b>10</b>
3.1	Begrippen . . . . .	10
3.2	Formules . . . . .	10
<b>4</b>	<b>Toepassen wetten van Newton</b>	<b>11</b>
4.1	Begrippen . . . . .	11
4.2	Formules . . . . .	11
<b>5</b>	<b>Arbeid, energie en vermogen</b>	<b>12</b>
<b>6</b>	<b>Behoud van energie</b>	<b>13</b>
<b>7</b>	<b>Systemen van deeltjes</b>	<b>14</b>

8 Rotatiebewegingen	15
9 Rotatie vektoren en impulsmoment	16
10 Statisch evenwicht	17
11 Trillingen	18
12 Golven	19
13 Electromagnetische golven	20
 <b>II Optica</b>	 <b>21</b>
14 Breking en terugkaatsing	22
15 Beelden en optische instrumenten	23
16 Interferentie en diffractie	24
17 Deeltjes en golven	25
 <b>III Kernfysica</b>	 <b>26</b>
18 Kernfysica	27

# Hoofdstuk 1

## Foutentheorie

### 1.1 Vorm

Gemeten waarde  $\pm$  absolute fout(AF)

- $6,458 \pm 0,027 \text{ mV}$
- $8,67 \pm 0.05 \cdot 10^3 \text{ m}$

Relative Fout(RF) =  $\frac{AF}{\text{Gemeten waarde}}$

- $RF = \frac{0,027}{6,458} = 0.04 = 0.4\%$
- $RF = \frac{0,05 \cdot 10^3}{8,67} = 5.77 = 577\%$

### 1.2 Soorten

1. Fout op meting
2. Statistische fout
3. Fout op berekening

#### 1.2.1 Fout op meting

- Is afhankelijk van de nauwkeurigheid van het meettoestel
- Op een meetlat:  $\pm 1 \text{ mm}$

- Op een chronometer:  $\pm 0.01s$

Metten van de lengte van een tafel met een meetlat:  $5 \pm 1.10^{-3}m$

### 1.2.2 Statistische fout

Dezelfde lengten van een tafel 5 keer meten met een meetlat = Het gemiddelde nemen van de gemeten waarden en het gemiddelde van de absolute fouten

### 1.2.3 Fout op berekening

Voor de voorbeelden worden volgende X en Y gebruikt:

$$X = 16,5 \pm 0.5$$

$$Y = 237,1 \pm 0.9$$

- **Som/Verschil:**  $AF(R) = \sqrt{AF(X)^2 + AF(Y)^2}$

1.  $X + Y = ?$
2.  $AF(R) = \sqrt{0,5^2 + 0,9^2}$
3.  $AF(R) = \sqrt{1,06}$
4.  $AF(R) = 1,03$
5.  $16,5 + 237,1 \pm 1,03$
6.  **$253,6 \pm 1,0$**

1.  $X - Y = ?$
2.  $AF(R)_{X-Y} = AF(R)_{X+Y}$
3.  **$220,6 \pm 1,0$**

- **Product/Deling:**  $RF(R) = \sqrt{RF(X)^2 + (RF(Y))^2}$

1.  $X * Y = ?$
2.  $RF(R) = \sqrt{(\frac{0,5}{16,5})^2 + (\frac{0,9}{237,1})^2}$
3.  $RF(R) = 0,03$
4.  $16,5 * 237,1 = 3912,15$

$$5. AF(R) = 3912,15 * RF(R)$$

$$6. AF(R) = 3912,15 * 0,03$$

$$7. AF(R) = 117,38$$

$$8. 3912,2 \pm 117,4$$

$$1. \frac{X}{Y} = ?$$

$$2. RF(R)_{\frac{X}{Y}} = RF(R)_{X*Y}$$

$$3. RF(R) = 0,03$$

$$4. \frac{16,5}{237,1} = 0,0696$$

$$5. AF(R) = 0,0696 * 0.03$$

$$6. AF(R) = 0,0021$$

$$7. 0,0696 \pm 0,0021$$

• **Macht/Wortel:**  $RF(R) = nRF(X)$

$$1. x^3 = ?$$

$$2. RF(R) = 3RF(X)$$

$$3. RF(R) = 0,09$$

$$4. (16,5)^3 \pm 0,09$$

$$5. 4492,13 \pm 0,09$$

$$1. \sqrt[3]{x} = ?$$

$$2. x^{\frac{1}{3}}$$

$$3. RF(R) = \frac{1}{3}RF(X)$$

$$4. RF(R) = 0,1$$

$$5. \sqrt[3]{16,5} \pm 0,1$$

$$6. 2,5 \pm 0,1$$

• **Functies**

$$1. tg(45^\circ 45' \pm 3') = ?$$

$$2. 3' = \frac{3}{60}graden = \frac{\pi}{3600}rad$$

3.  $AF(tg(X)) = \frac{1}{\cos^2 x} \cdot AF(X)$
4.  $AF(tg(X)) = \frac{1}{\cos^2 x} * \frac{\pi}{3600}$
5.  $AF(tg(X)) = 0,0018$
6.  $tg(45\ 45') \pm 0,0018$
7.  $1,0265 \pm 0,0018$

# Deel I

## Mechanica



# Hoofdstuk 2

## Beweging in 2 en 3 dimensies

### 2.1 Begrippen

- **Vector**: Een eenheid dat zowel een richting als een hoeveelheid heeft. Dit wordt voorgesteld door een lijnstuk met een pijl dat de richting aangeeft en de lengte die de grootte aangeeft.
- **Eenheidsvector**: Een vector met als grootte 1.
- **Netto verplaatsing**: De totale afstand van punt a tot punt b in vogelvlucht.
- **Afgelegde afstand**: De totale afstand die afgelegd werd om van punt a tot punt b te bekomen.

### 2.2 Formules

- **Snelheid**:  $v = \frac{s}{t}$
- **Versnelling**:  $a = \frac{v}{t}$
- **Projectile motion**:  $y = x \cdot \tan(\theta_0) - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta_0} * x^2$
- **Uniforme circulaire beweging**:  $a = \frac{v^2}{r}$

## 2.3 Conceptvraag: Helikopter

- **Vraag:** Een helikopter vliegt horizontaal en laat in positie A een kist met hulpgoederen vallen. Welke baan volgt die kist (wrijving met de lucht verwaarlozen)?
- **Antwoord:**
  1. Baan (a) kan niet, de kist zal nooit achteruit gaan.
  2. Baan (b) kan niet, dit zou enkel gebeuren als de helikopter stil staat.
  3. Baan (c) kan niet, de zwaartekracht blijkt geen impact te hebben op de kist.
  4. Baan(d) is correct. De kist zal eerst de snelheid van het vliegtuig overnemen, en dan zo alsmaar sneller naar beneden vallen door de zwaartekracht.
  5. Baan(e) kan niet, de kist blijft te lang op dezelfde hoogte.

## 2.4 Conceptvraag: Snelheid en versnelling

- **Vraag:** Gegeven zijn de snelheid en versnelling van een bewegende persoon. In welk geval vertraagt de persoon en wijkt af naar rechts(vanuit het standpunt van de persoon)
- **Antwoord:**
  1. Bij (A) blijft de snelheid constant.
  2. Bij (B) vertraagt de snelheid en wijkt af naar rechts.
  3. Bij (C) versnelt de snelheid en wijkt af naar links.
  4. Bij (D) versnelt de snelheid en wijkt af naar rechts.
  5. Bij (E) vertraagt de snelheid.

# Hoofdstuk 3

## Kracht en beweging

### 3.1 Begrippen

- **Eerste wet van Newton:** Een voorwerp in uniforme beweging blijft in uniforme beweging. Een voorwerp in rust blijft in rust.
- **Tweede wet van Newton:** De verandering in snelheid is gelijk aan de netto kracht die uitgeoefend wordt op het voorwerp
- **Derde wet van Newton:** Als voorwerp A een kracht uitoefend op voorwerp B, dan zal B een tegengestelde kracht uitoefenen op A

### 3.2 Formules

- **Tweede wet van Newton:**  $\vec{F}_{net} = m\vec{a}$  met  $\vec{F}_{net}$  de som van de vectoren van alle krachten die worden uitgeoefend op het voorwerp, en  $ma$  het product van de massa van het voorwerp en zijn versnelling.
- **Gewicht:**  $\vec{w} = m\vec{g}$  met  $m$  de massa van het voorwerp en  $g$  de gravitatieconstante
- **Wet van Hooke (veren):**  $F_s = -kx$  met  $k$  de krachtconstante van de veer en  $x$  de afstand
- **Lineair momentum:**  $\vec{p} = m\vec{v}$  met  $\vec{p}$  de impuls,  $m$  de massa en  $\vec{v}$  de snelheid.

# Hoofdstuk 4

## Toepassen wetten van Newton

### 4.1 Begrippen

- **Wrijving:**

### 4.2 Formules

- formule

## Hoofdstuk 5

### Arbeid, energie en vermogen

## Hoofdstuk 6

### Behoud van energie

## Hoofdstuk 7

### Systemen van deeltjes

## Hoofdstuk 8

# Rotatiebewegingen



## Hoofdstuk 9

### Rotatie vektoren en impulsmoment

## Hoofdstuk 10

### Statisch evenwicht

## Hoofdstuk 11

### Trillingen

## Hoofdstuk 12

### Golven

## Hoofdstuk 13

### Electromagnetische golven

# Deel II

## Optica

## Hoofdstuk 14

### Breking en terugkaatsing

## Hoofdstuk 15

### Beelden en optische instrumenten



## Hoofdstuk 16

### Interferentie en diffractie

## Hoofdstuk 17

### Deeltjes en golven

# Deel III

## Kernfysica

## Hoofdstuk 18

### Kernfysica