


Российский Университет Дружбы Народов  
Факультет физико-математических и естественных наук

# Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы е у р а в н е н и я

IV СЕМЕСТР

Лектор: *Апушкинская Дарья Евгеньевна*



Автор: *Финаревский Леонид*

*Проект в Telegram*

*Проект в GitHub*

Весна 2024

## Содержание

<b>1</b>	<b>Зависимость решений от начальных данных и параметров</b>	<b>2</b>
1.1	Оценка разности двух решений . . . . .	2
1.2	Теорема о непрерывной зависимости решения от начальных данных и параметров . . . . .	3
1.3	Дифференцируемость решений по начальным данным и параметрам . . . .	4

# 1 Зависимость решений от начальных данных и параметров

Пусть задано дифференциальное уравнение с параметром  $\mu$ :

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x, \mu), \quad \mu = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_m \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^m$$

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x), \quad f \in Lip_{x, loc}(G) \cap C(G) \Rightarrow$$

$\Rightarrow \forall (\tau, \xi) \in G \exists!$  решение задачи Коши с начальными данными  $(\tau, \xi)$

$x(t, \tau, \xi, \mu)$  — функция от  $n + m + 2$  переменных


Пример

$$\frac{dx}{dt} = \mu x, \quad x \in \mathbb{R}, \mu \in \mathbb{R}$$

$$x = C e^{\mu x}$$

$$x(t, \tau, \xi, \mu) = \xi e^{\mu(t-\tau)}$$

- ▷  $\mu = 0$  — прямая  $x = \xi$
- ▷  $\mu = 1$  — экспонента
- ▷  $\mu = -1$  — обратная экспонента



## 1.1 Оценка разности двух решений

Имеются две системы ДУ:  $x, y \in \mathbb{R}^n, G \subset \mathbb{R}^{n+1}$ ,

$$\begin{cases} \dot{x} = f_1(t, x) \\ \dot{y} = f_2(t, y) \end{cases}$$

Предположим, что кроме условий существования и единственности решения, выполняется еще

- ▷  $f_1 \in Lip(G)$  с константой  $L$
- ▷  $f_1$  ограничена ( $|f_1| \leq M$ )
- ▷ Ограниченность разности функций ( $|f_1 - f_2| \leq m$ )

**Теорема 1.1.** Пусть решения  $x(t, \tau_1, \xi_1)$  и  $y(t, \tau_2, \xi_2)$  определены на  $(a, b)$  и  $\tau_1, \tau_2 \in (a, b)$ . Тогда

$$|x(t, \tau_1, \xi_1) - y(t, \tau_2, \xi_2)| \leq (|\xi_1 - \xi_2| + M|\tau_1 - \tau_2| + m(b-a))e^{L(b-a)}$$

Вспомним лемму Гронуолла, утверждающая, что при  $\lambda, \mu \geq 0$  и  $u(t) \in C$ :

$$0 \leq u(t) \leq \lambda + \mu \left| \int_{t_0}^t u(s) ds \right| \Rightarrow u(t) \leq \lambda e^{\mu|t-t_0|}$$

*Доказательство.* Решения  $x, y$  удовлетворяют интегральным уравнениям

$$x(t, \tau_1, \xi_1) = \xi_1 + \int_{\tau_1}^t f_1(s, x(s, \tau_1, \xi_1)) ds$$

$$y(t, \tau_2, \xi_2) = \xi_2 + \int_{\tau_2}^t f_2(s, y(s, \tau_2, \xi_2)) ds$$

$$|x(t, \tau_1, \xi_1) - y(t, \tau_2, \xi_2)| \leq |\xi_1 - \xi_2| + \left| \int_{\tau_1}^t f_1(s, x(s, \tau_1, \xi_1)) ds - \int_{\tau_2}^t f_2(s, y(s, \tau_2, \xi_2)) ds \right| = A$$

Не умаляя общности,  $\tau_1 < \tau_2$

$$\begin{aligned} A &\leq |\xi_1 - \xi_2| + \left| \int_{\tau_1}^{\tau_2} f_1(s, x(s, \tau_1, \xi_1)) ds \right| + \left| \int_{\tau_2}^t f_1(s, x(s, \tau_1, \xi_1)) - f_2(s, y(s, \tau_2, \xi_2)) ds \right| \leq \\ &\leq |\xi_1 - \xi_2| + M|\tau_1 - \tau_2| + \left| \int_{\tau_2}^t f_1(s, x(s, \tau_1, \xi_1)) - f_1(s, y(s, \tau_2, \xi_2)) ds \right| + \\ &\quad + \left| \int_{\tau_2}^t f_1(s, y(s, \tau_2, \xi_2)) - f_2(s, y(s, \tau_2, \xi_2)) ds \right| \leq \\ &\leq |\xi_1 - \xi_2| + M|\tau_1 - \tau_2| + \left| \int_{\tau_2}^t L|x(s, \tau_1, \xi_1) - y(s, \tau_2, \xi_2)| ds \right| + m(b-a) \end{aligned}$$

Итого

$$|x(t, \tau_1, \xi_1) - y(t, \tau_2, \xi_2)| \leq (|\xi_1 - \xi_2| + M|\tau_1 - \tau_2| + m(b-a)) + L \left| \int_{\tau_2}^t |x(s, \tau_1, \xi_1) - y(s, \tau_2, \xi_2)| ds \right|$$

Применяя лемму Гронуолла для  $\lambda = (|\xi_1 - \xi_2| + M|\tau_1 - \tau_2| + m(b-a))$ ,  $\mu = L$  и  $u(t) = |x(t, \tau_1, \xi_1) - y(t, \tau_2, \xi_2)|$ , получаем утверждение задачи.  $\square$

## 1.2 Теорема о непрерывной зависимости решения от начальных данных и параметров

Дано дифференциальное уравнение:

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x, \mu), \quad \mu \in \mathbb{R}^m = \mathfrak{M}$$

**Теорема 1.2.** Пусть  $f \in C(G \times \mathfrak{M}) \cap Lip_x(G \times \mathfrak{M})$  и пусть решение  $x(t, \tau_0, \xi_0, \mu_0)$  определено на  $(a, b)$ .

Тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall (\tau, \xi, \mu) : |\tau - \tau_0| < \delta, |\xi - \xi_0| < \delta, |\mu - \mu_0| < \delta$$

решение  $x(t, \tau, \xi, \mu)$  определено на  $(a, b)$  и

$$|x(t, \tau, \xi, \mu) - x(t, \tau_0, \xi_0, \mu_0)| < \varepsilon \quad \forall t \in (a, b)$$

В данном курсе доказательство не приводится.

### 1.3 Дифференцируемость решений по начальным данным и параметрам

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x, \mu), \quad \mu = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_m \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^m$$

$x(t, \tau, \xi, \mu)$  — решение задачи Коши с начальными данными  $(\tau, \xi)$ .

**Теорема 1.3.** Пусть  $f \in C_1(G \times \mathfrak{M})$ . Тогда решение задачи Коши  $x(t, \tau, \xi, \mu)$  с начальными данными  $(\tau, \xi)$  непрерывно дифференцируемо по всем своим аргументам.

*Доказательство.* Будем использовать, что:

▷  $x(t, \tau, \xi, \mu)$  решение

$$\frac{d}{dt}x(t, \tau, \xi, \mu) = f(t, x(t, \tau, \xi, \mu), \mu);$$

▷  $x(t, \tau, \xi, \mu)$  решение задачи Коши с начальными данными

$$x(\tau, \tau, \xi, \mu) = \xi.$$


По факту, хотим доказать, что:

$$\frac{\partial x}{\partial t}, \quad \frac{\partial x}{\partial \tau}, \quad \frac{\partial x}{\partial \xi}, \quad \frac{\partial x}{\partial \mu}$$

существуют и непрерывны. Первое уже не раз доказывалось.

1)  $\frac{\partial x}{\partial \tau} = v(t)$  — функция в  $\mathbb{R}^n$

$$\frac{\partial}{\partial \tau} \quad \Bigg| \quad \frac{dx}{dt} = f(t, x(t, \tau, \xi, \mu))$$



$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial \tau} \frac{dx}{dt} &= \frac{\partial f}{\partial \tau} = \frac{\partial f}{\partial t} \underbrace{\frac{\partial t}{\partial \tau}}_{=0} + \frac{\partial f}{\partial x} \underbrace{\frac{\partial x}{\partial \tau}}_{=v} + \frac{\partial f}{\partial \mu} \underbrace{\frac{\partial \mu}{\partial \tau}}_{=0} \\ \frac{\partial}{\partial \tau} \frac{dx}{dt} &= \frac{\partial f}{\partial x} \cdot v\end{aligned}$$

Т.к. все принадлежит  $C_1$ , то 1 и 2 множители можно поменять местами.

$$\frac{d}{dx} \frac{\partial x}{\partial \tau} = \frac{dv}{dt} = \frac{\partial f}{\partial \tau} \cdot v \quad (1.1)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

Вспомним, что  $x$  еще и решение задачи Коши.

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial \tau} \Bigg| \quad & x(t, \tau, \xi, \mu)|_{t=\tau} = \xi \\ \frac{\partial x}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial \tau} \Bigg|_{t=\tau} + \frac{\partial x}{\partial \tau} \frac{\partial \tau}{\partial \tau} + \frac{\partial x}{\partial \xi} \underbrace{\frac{\partial \xi}{\partial \tau}}_{=0} + \frac{\partial x}{\partial \mu} \underbrace{\frac{\partial \mu}{\partial \tau}}_{=0} &= \underbrace{\frac{\partial \xi}{\partial \tau}}_{=0} \\ \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial x}{\partial \tau} &= 0\end{aligned}$$

$$f(\tau, \xi, \mu) = -v(\tau) \quad (1.2)$$

Объединяя 1.1 и 1.2, получаем задачу Коши для линейной системы.

$$\begin{cases} \frac{dv}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot v \\ v(\tau) = -f(\tau, \xi, \mu) \end{cases}$$

Значит, можно найти  $v = \frac{\partial x}{\partial \tau}(t, \tau, \xi, \mu)$ .

**Пример.**

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \mu \cdot x \\ x(\tau, \tau, \xi, \mu) = \xi \end{cases}$$

$$x(t, \tau, \xi, \mu) = \xi e^{\mu(t-\tau)}$$

$$\frac{\partial x}{\partial \tau} = -\mu \xi e^{\mu(t-\tau)}$$

С другой стороны

$$\triangleright f(t, \tau, \xi, \mu) = \mu \cdot x \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x} = \mu$$

$$\triangleright v(\tau) = -f(\tau, \xi, \mu) = -\mu \xi$$

Получаем то же самое решение

2) Теперь считаем по  $\xi$

$$w(t) = \frac{\partial x}{\partial \xi} - \text{Якобиан } (\mathbb{M}_{n \times n})$$

$$\left. \frac{\partial}{\partial \xi} \right| \frac{dx}{dt}(t, \tau, \xi, \mu) = f(t, x, \mu)$$

$$\frac{\partial}{\partial \xi} \frac{dx}{dt} = \underbrace{\frac{\partial f}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial \xi}}_{=0} + \underbrace{\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \xi}}_{=w} + \frac{\partial f}{\partial \mu} \frac{\partial \mu}{\partial \xi}$$

Первое и третье слагаемые 0 в силу независимости от  $\xi$ . Также меняем  $\frac{d}{dt}$  и  $\frac{\partial}{\partial \xi}$  местами в силу  $C_1$ .

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} w$$

Снова пользуемся, что  $x$  — решение.

$$\left. \frac{\partial}{\partial \xi} \right| x(t, \tau, \xi, \mu)|_{t=\tau} = \xi$$

$$\left. \frac{\partial x}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial \xi} \right|_{t=\tau} + \underbrace{\frac{\partial x}{\partial \tau} \frac{\partial \tau}{\partial \xi}}_{=0} + \underbrace{\frac{\partial x}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial \xi}}_{=w} + \underbrace{\frac{\partial x}{\partial \mu} \frac{\partial \mu}{\partial \xi}}_{=0} = \frac{\partial \xi}{\partial \xi} \cdot (E_n)$$

В силу независимости  $\tau$ ,  $t$  и  $\mu$  от  $\xi$  получим, что

$$w(t) = E_n$$

Снова получаем задачу Коши относительно  $w$

$$\begin{cases} \frac{dw}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot w \\ w(\tau) = E_n \end{cases}$$

**Пример.**

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \mu \cdot x \\ x(\tau, \tau, \xi, \mu) = \xi \end{cases}$$

$$x(t, \tau, \xi, \mu) = \xi e^{\mu(t-\tau)}$$

$$\frac{\partial x}{\partial \xi} = e^{\mu(t-\tau)}$$

С другой стороны

$$\triangleright f(t, \tau, \xi, \mu) = \mu \cdot x \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x} = \mu$$

$$\triangleright w(\tau) = E_1 = 1$$

Получаем то же самое решение

3)  $z(t) = \frac{\partial x}{\partial \mu}$  — Якобиан  $(\mathbb{M}_{n \times m})$

$$\left. \frac{\partial}{\partial \mu} \right| \frac{dx}{dt}(t, \tau, \xi, \mu) = f(t, x, \mu)$$

$$\frac{\partial}{\partial \mu} \frac{dx}{dt} = \underbrace{\frac{\partial f}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial \mu}}_{=0} + \underbrace{\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \mu}}_{=z} + \frac{\partial f}{\partial \mu} \frac{\partial \mu}{\partial \mu}$$

Снова меняем местами дифференциалы в левой части.

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot z + \frac{\partial f}{\partial \mu}$$

Начальные условия

$$\left. \frac{\partial}{\partial \mu} \right| x(t, \tau, \xi, \mu)|_{t=\tau} = \xi$$

$$\underbrace{\frac{\partial x}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial \mu}}_{=0} \bigg|_{t=\tau} + \underbrace{\frac{\partial x}{\partial \tau} \frac{\partial \tau}{\partial \mu}}_{=0} + \underbrace{\frac{\partial x}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial \mu}}_{=0} + \underbrace{\frac{\partial x}{\partial \mu} \frac{\partial \mu}{\partial \mu}}_{=z} = \frac{\partial \xi}{\partial \mu}$$

Первое, второе и третье слагаемые 0.

$$z(\tau) = 0_{(n \times m)}$$

Итого мы и в третий раз получили задачу Коши

$$\begin{cases} \frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot z + \frac{\partial f}{\partial \mu} \\ z(\tau) = 0_{n \times m} \end{cases}$$

**Пример.**

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \mu \cdot x \\ x(\tau, \tau, \xi, \mu) = \xi \end{cases}$$

Для самостоятельного решения

□