

Российский Университет Дружбы Народов
Факультет физико-математических и естественных наук

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы е у р а в н е н и я

IV СЕМЕСТР

Лектор: *Апушкинская Дарья Евгеньевна*



**Российский университет
дружбы народов**
RUDN University

Автор: Финаревский Леонид

Проект в Telegram

Проект в GitHub

Весна 2024

Содержание

1	Зависимость решений от начальных данных и параметров	2
1.1	Оценка разности двух решений	2
1.2	Теорема о непрерывной зависимости решения от начальных данных и параметров	3

1 Зависимость решений от начальных данных и параметров

Пусть задано дифференциальное уравнение с параметром μ :

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x, \mu), \quad \mu = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_m \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^m$$

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x), \quad f \in Lip_{x, loc}(G) \cap C(G) \Rightarrow$$

$\Rightarrow \forall (\tau, \xi) \in G \exists!$ решение задачи Коши с начальными данными (τ, ξ)

$x(t, \tau, \xi, \mu)$ — функция от $n + m + 2$ переменных


Пример

$$\frac{dx}{dt} = \mu x, \quad x \in \mathbb{R}, \mu \in \mathbb{R}$$

$$x = C e^{\mu x}$$

$$x(t, \tau, \xi, \mu) = \xi e^{\mu(t-\tau)}$$

- ▷ $\mu = 0$ — прямая $x = \xi$
- ▷ $\mu = 1$ — экспонента
- ▷ $\mu = -1$ — обратная экспонента



1.1 Оценка разности двух решений

Имеются две системы ДУ: $x, y \in \mathbb{R}^n, G \subset \mathbb{R}^{n+1}$,

$$\begin{cases} \dot{x} = f_1(t, x) \\ \dot{y} = f_2(t, y) \end{cases}$$

Предположим, что кроме условий существования и единственности решения, выполняется еще

- ▷ $f_1 \in Lip(G)$ с константой L
- ▷ f_1 ограничена ($|f_1| \leq M$)
- ▷ Ограниченность разности функций ($|f_1 - f_2| \leq m$)

Теорема 1.1. Пусть решения $x(t, \tau_1, \xi_1)$ и $y(t, \tau_2, \xi_2)$ определены на (a, b) и $\tau_1, \tau_2 \in (a, b)$. Тогда

$$|x(t, \tau_1, \xi_1) - y(t, \tau_2, \xi_2)| \leq (|\xi_1 - \xi_2| + M|\tau_1 - \tau_2| + m(b - a))e^{L(b-a)}$$

Вспомним лемму Гронуолла, утверждающая, что при $\lambda, \mu \geq 0$ и $u(t) \in C$:

$$0 \leq u(t) \leq \lambda + \mu \left| \int_{t_0}^t u(s) ds \right| \Rightarrow u(t) \leq \lambda e^{\mu|t-t_0|}$$

Доказательство. Решения x, y удовлетворяют интегральным уравнениям

$$x(t, \tau_1, \xi_1) = \xi_1 + \int_{\tau_1}^t f_1(s, x(s, \tau_1, \xi_1)) ds$$

$$y(t, \tau_2, \xi_2) = \xi_2 + \int_{\tau_2}^t f_2(s, y(s, \tau_2, \xi_2)) ds$$

$$|x(t, \tau_1, \xi_1) - y(t, \tau_2, \xi_2)| \leq |\xi_1 - \xi_2| + \left| \int_{\tau_1}^t f_1(s, x(s, \tau_1, \xi_1)) ds - \int_{\tau_2}^t f_2(s, y(s, \tau_2, \xi_2)) ds \right| = A$$

Не умаляя общности, $\tau_1 < \tau_2$

$$\begin{aligned} A &\leq |\xi_1 - \xi_2| + \left| \int_{\tau_1}^{\tau_2} f_1(s, x(s, \tau_1, \xi_1)) ds \right| + \left| \int_{\tau_2}^t f_1(s, x(s, \tau_1, \xi_1)) - f_2(s, y(s, \tau_2, \xi_2)) ds \right| \leq \\ &\leq |\xi_1 - \xi_2| + M|\tau_1 - \tau_2| + \left| \int_{\tau_2}^t f_1(s, x(s, \tau_1, \xi_1)) - f_1(s, y(s, \tau_2, \xi_2)) ds \right| + \\ &\quad + \left| \int_{\tau_2}^t f_1(s, y(s, \tau_2, \xi_2)) - f_2(s, y(s, \tau_2, \xi_2)) ds \right| \leq \\ &\leq |\xi_1 - \xi_2| + M|\tau_1 - \tau_2| + \left| \int_{\tau_2}^t L|x(s, \tau_1, \xi_1) - y(s, \tau_2, \xi_2)| ds \right| + m(b - a) \end{aligned}$$

Итого

$$|x(t, \tau_1, \xi_1) - y(t, \tau_2, \xi_2)| \leq (|\xi_1 - \xi_2| + M|\tau_1 - \tau_2| + m(b - a)) + L \left| \int_{\tau_2}^t |x(s, \tau_1, \xi_1) - y(s, \tau_2, \xi_2)| ds \right|$$

Применяя лемму Гронуолла для $\lambda = (|\xi_1 - \xi_2| + M|\tau_1 - \tau_2| + m(b - a))$, $\mu = L$ и $u(t) = |x(t, \tau_1, \xi_1) - y(t, \tau_2, \xi_2)|$, получаем утверждение задачи. \square

1.2 Теорема о непрерывной зависимости решения от начальных данных и параметров

Дано дифференциальное уравнение:

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x, \mu), \quad \mu \in \mathbb{R}^m = \mathfrak{M}$$

Теорема 1.2. Пусть $f \in C(G \times \mathfrak{M}) \cap Lip_x(G \times \mathfrak{M})$ и пусть решение $x(t, \tau_0, \xi_0, \mu_0)$ определено на (a, b) .

Тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall (\tau, \xi, \mu) : \quad |\tau - \tau_0| < \delta, \quad |\xi - \xi_0| < \delta, \quad |\mu - \mu_0| < \delta$$

решение $x(t, \tau, \xi, \mu)$ определено на (a, b) и

$$|x(t, \tau, \xi, \mu) - x(t, \tau_0, \xi_0, \mu_0)| < \varepsilon \quad \forall t \in (a, b)$$

В данном курсе доказательство не приводится.

