

Grafos Hamiltonianos e Grafos Eulerianos

Zenilton Patrocínio

Grafo Hamiltoniano


Um **caminho hamiltoniano** é um caminho que passa por cada vértice de um grafo exatamente uma vez.

Um **ciclo hamiltoniano** é um caminho hamiltoniano que retorna ao vértice inicial (isto é, um caminho fechado).


Um **grafo** é dito **hamiltoniano** se possuir um ciclo hamiltoniano.

Um **grafo** é dito **semi-hamiltoniano** se possuir um caminho hamiltoniano. Logo, um grafo hamiltoniano é também semi-hamiltoniano.

Grafo Hamiltoniano – Exemplo




Grafo Hamiltoniano – Exemplo




Hamiltoniano


Grafo Hamiltoniano – Exemplo



Hamiltoniano




Grafo Hamiltoniano – Exemplo




Hamiltoniano

Semi-hamiltoniano





Grafo Hamiltoniano – Exemplo




Hamiltoniano

Semi-hamiltoniano





Grafo Hamiltoniano – Exemplo



Hamiltoniano

Semi-hamiltoniano



Não-hamiltoniano


Grafo Hamiltoniano – Condição Necessária

Um grafo simples G com $n (\geq 3)$ vértices é hamiltoniano, se o grau de cada um de seus vértices $d(v) \geq n/2, \forall v \in V(G)$. (Teorema de Dirac)


Um grafo simples G com $n (\geq 3)$ vértices é hamiltoniano, se, para cada par de vértices não adjacentes v e w , a soma de seus graus $d(v) + d(w) \geq n, \forall \{v, w\} \notin E(G)$. (Teorema de Ore)

Se o fecho hamiltoniano de G for um grafo completo, então G é hamiltoniano. Fecho hamiltoniano de uma grafo é obtido adicionando-se arestas, enquanto for possível, entre vértices não adjacentes cuja soma de graus $\geq n$. (Teorema de Bondy & Chvátal)

Grafo Hamiltoniano – Condição Necessária



Grafo Hamiltoniano – Condição Necessária



Atende ao Teorema de Dirac


Atende ao Teorema de Ore

Atende ao Teorema de Bondy & Chvátal




G_1 é hamiltoniano

Grafo Hamiltoniano – Condição Necessária



Grafo Hamiltoniano – Condição Necessária



Não atende ao Teorema de Dirac




Atende ao Teorema de Ore

Atende ao Teorema de Bondy & Chvátal




G_2 é hamiltoniano

Grafo Hamiltoniano – Condição Necessária



Grafo Hamiltoniano – Condição Necessária



Não atende ao Teorema de Dirac



Não atende ao Teorema de Ore




Atende ao Teorema de Bondy & Chvátal




G_3 é hamiltoniano

Grafo Hamiltoniano – Condição Necessária



Grafo Hamiltoniano – Condição Necessária



Não atende ao Teorema de Dirac



Não atende ao Teorema de Ore




Não atende ao Teorema de Bondy & Chvátal



PORÉM

G_4 é hamiltoniano

Grafo Hamiltoniano – Condição Necessária



Não se conhece uma condição necessária e suficiente trivial para a existência de um ciclo hamiltoniano em um grafo qualquer.

Grafo Euleriano


Um **trajeto euleriano** é um trajeto que passa por cada aresta de um grafo exatamente uma vez.

Um **ciclo euleriano** é um caminho euleriano que começa e termina no mesmo vértice (isto é, um trajeto fechado).

Um **grafo** é dito **euleriano** se possuir um ciclo euleriano.


Um **grafo** é dito **semi-euleriano** se possuir um trajeto euleriano. Logo, um grafo euleriano é também semi-euleriano.

Grafo Euleriano – Exemplo




Euleriano


Grafo Euleriano – Exemplo





Euleriano



Grafo Euleriano – Exemplo



Euleriano



Não-euleriano

Grafo Euleriano – Condição Suficiente

Um grafo conexo é euleriano se e somente se todos os seus vértices possuírem grau par. ([Teorema de Euler](#))



Um grafo conexo é não-euleriano se existirem dois ou mais vértices de grau ímpar.

Um grafo conexo é semi-euleriano se e somente se existem exatamente dois vértices de grau ímpar.


Método de Fleury – Algoritmo

1. se $V(G)$ possuir 3 ou mais vértices de grau ímpar então **PARE**;
2. Seja $G' = (V', E')$ tal que $V' \leftarrow V(G)$ e $E' \leftarrow E(G)$; // Inicializar grafo auxiliar
3. Selecionar vértice inicial $v \in V'$ (escolher v cujo grau seja ímpar, se houver)
4. enquanto $E' \neq \emptyset$ efetuar
 - a. se $d(v) > 1$ então
Selecionar aresta $\{v, w\}$ que não seja ponte em G'
 - b. senão
Selecionar a única aresta $\{v, w\}$ disponível em G'
 - c. $v \leftarrow w$; $E' \leftarrow E' - \{v, w\}$; // Caminhar de v para w e eliminar aresta


Método de Fleury – Exemplo 1




Método de Fleury – Exemplo 1




1




Método de Fleury – Exemplo 1




1




Método de Fleury – Exemplo 1




1 / 2




Método de Fleury – Exemplo 1




1 / 2




Método de Fleury – Exemplo 1




1 / 2 / 3




Método de Fleury – Exemplo 1




1 / 2 / 3




Método de Fleury – Exemplo 1




1 / 2 / 3 / 4




Método de Fleury – Exemplo 1




1 / 2 / 3 / 4




Método de Fleury – Exemplo 1




1 / 2 / 3 / 4 / 2




Método de Fleury – Exemplo 1




1 / 2 / 3 / 4 / 2




Método de Fleury – Exemplo 1




1 / 2 / 3 / 4 / 2 / 5




Método de Fleury – Exemplo 1




1 / 2 / 3 / 4 / 2 / 5




Método de Fleury – Exemplo 1




1 / 2 / 3 / 4 / 2 / 5 / 6




Método de Fleury – Exemplo 1




1 / 2 / 3 / 4 / 2 / 5 / 6




Método de Fleury – Exemplo 1




1 / 2 / 3 / 4 / 2 / 5 / 6 / 4




Método de Fleury – Exemplo 1




1 / 2 / 3 / 4 / 2 / 5 / 6 / 4




Método de Fleury – Exemplo 1




1 / 2 / 3 / 4 / 2 / 5 / 6 / 4 / 5




Método de Fleury – Exemplo 1




1 / 2 / 3 / 4 / 2 / 5 / 6 / 4 / 5




Método de Fleury – Exemplo 1




1 / 2 / 3 / 4 / 2 / 5 / 6 / 4 / 5 / 7




Método de Fleury – Exemplo 1




1 / 2 / 3 / 4 / 2 / 5 / 6 / 4 / 5 / 7




Método de Fleury – Exemplo 1




1 / 2 / 3 / 4 / 2 / 5 / 6 / 4 / 5 / 7 / 6




Método de Fleury – Exemplo 1




1 / 2 / 3 / 4 / 2 / 5 / 6 / 4 / 5 / 7 / 6




Método de Fleury – Exemplo 1



1 / 2 / 3 / 4 / 2 / 5 / 6 / 4 / 5 / 7 / 6 / 3




Método de Fleury – Exemplo 1




1 / 2 / 3 / 4 / 2 / 5 / 6 / 4 / 5 / 7 / 6 / 3




Método de Fleury – Exemplo 1



1 / 2 / 3 / 4 / 2 / 5 / 6 / 4 / 5 / 7 / 6 / 3 / 1





Método de Fleury – Exemplo 1




1 / 2 / 3 / 4 / 2 / 5 / 6 / 4 / 5 / 7 / 6 / 3 / 1 → **Ciclo euleriano**


Método de Fleury – Exemplo 2



Método de Fleury – Exemplo 2




5




v


Método de Fleury – Exemplo 2




5




Método de Fleury – Exemplo 2




5 / 6




Método de Fleury – Exemplo 2




5 / 6




Método de Fleury – Exemplo 2




5 / 6 / 4




Método de Fleury – Exemplo 2




5 / 6 / 4




Método de Fleury – Exemplo 2




5 / 6 / 4 / 2




Método de Fleury – Exemplo 2




5 / 6 / 4 / 2




Método de Fleury – Exemplo 2




5 / 6 / 4 / 2 / 5




Método de Fleury – Exemplo 2




5 / 6 / 4 / 2 / 5




Método de Fleury – Exemplo 2




5 / 6 / 4 / 2 / 5 / 4




Método de Fleury – Exemplo 2




5 / 6 / 4 / 2 / 5 / 4




Método de Fleury – Exemplo 2




5 / 6 / 4 / 2 / 5 / 4 / 3




Método de Fleury – Exemplo 2




5 / 6 / 4 / 2 / 5 / 4 / 3




Método de Fleury – Exemplo 2




5 / 6 / 4 / 2 / 5 / 4 / 3 / 2




Método de Fleury – Exemplo 2




5 / 6 / 4 / 2 / 5 / 4 / 3 / 2




Método de Fleury – Exemplo 2




5 / 6 / 4 / 2 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1




Método de Fleury – Exemplo 2




5 / 6 / 4 / 2 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1




Método de Fleury – Exemplo 2




5 / 6 / 4 / 2 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 / 3




Método de Fleury – Exemplo 2



5 / 6 / 4 / 2 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 / 3




Método de Fleury – Exemplo 2



5 / 6 / 4 / 2 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 / 3 / 6



Método de Fleury – Exemplo 2



5 / 6 / 4 / 2 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 / 3 / 6



Trajeto euleriano

Método de Fleury – Exemplo

