Commandes du package maquereaux.sty

Léo Guillon

1. Logique de conception des commandes

De manière générale, on essaie de suivre les conventions mathématiques : une commande pour un ensemble est en majuscule, tandis qu'une fonction ou un opérateur sera en minuscule.

Par ailleurs, pour être le plus consistant possible avec les autres commandes déjà existantes en La Commandes doivent être nommées en anglais, dans la mesure du possible et de la convenance.

2. Listes des commandes

| Commande | Affichage | Signification |
|---|---|---|
| Généralités | | |
| Constantes mathématiques | | |
| e : | e : | constante exponentielle |
| i | i | nombre i nombre d'or |
| gold Onémataure génériques | φ | nombre d'or |
| Opérateurs génériques kro{i}{j} | 8 | symbole de Kronecker |
| ind | ${\mathcal S}_{i,j}$ | fonction indicatrice |
| | ш. | Tonetion indicatrice |
| Théorie des ensembles | | 1 (1) |
| longto | $\stackrel{c}{\longrightarrow}$ | longue flèche |
| function $\{f\}\{A\}\{B\}\{x\}\{f(x)\}$ | $f: A \longrightarrow B$ | définition de fonction |
| | $x \longmapsto f(x)$ | |
| Ensembles usuels | N | ensemble des entiers naturels |
| N Z | \mathbb{Z} | ensemble des entiers natureis ensemble des entiers relatifs |
| | | ensemble des entiers relatifs ensemble des nombres rationnels |
| Q | \mathbb{Q} | ensemble des nombres réels |
| R | C | |
| C H | H | ensemble des nombres complexes ensemble des quaternions |
| | $\operatorname{Card}\{E\}$ | cardinal de l'ensemble <i>E</i> |
| card{E} | | |
| <pre>parts{E} comp{E}</pre> | $egin{array}{c} \mathcal{P}(E) \ ar{E} \end{array}$ | ensemble des parties de l'ensemble <i>E</i> complémentaire de l'ensemble <i>E</i> |
| | | complementane de l'ensemble L |
| Algèbre | | |
| Algèbre générale | | |
| Sym | S | groupe symétrique |
| Alt | R | groupe alterné |
| iso | ≅ | relation d'isomorphisme |
| subgroup | < | relation de sous-groupe |
| normal | ⊲ | relation de sous-groupe normal |
| Algèbre linéaire | 7.4 | 11 1 4 1 |
| M | \mathcal{M} | ensemble de matrices |
| GL | GL | groupe linéaire |
| SL | SL | groupe spécial linéaire |
| Orth | 0 | groupe orthogonal |
| S0 | SO | groupe spécial orthogonal |
| tr | Tr | trace |
| ker | Ker | noyau |
| im | Im | image |
| rg | rg | rang |
| codim | codim | codimension |
| com Sp | com Sp | comatrice spectre |
| Sγ | υħ | specife |

Analyse

Calcul différentiel

| diff{f}{a} | $\mathrm{d}f_a$ | différentielle de f en a |
|-------------------------|--|--|
| grad | ∇ | gradient |
| rot | $\overrightarrow{\mathrm{rot}}$ | rotationnel |
| lap | Δ | laplacien |
| Jac | Jac | matrice jacobienne |
| detjac{f}{a} | $J_f(a)$ | déterminant jacobien de f en a |
| hess{f} | $\widehat{\mathcal{H}}f$ | matrice hessienne de f en a |
| Topologie | , and the second | , and the second |
| abs{x} | x | valeur absolue (ou module) de x |
| norme{x} | $\ x\ $ | norme de x |
| Probabilités | | |
| Opérateurs usuels | | |
| Prob{A} | $\mathbb{P}(A)$ | probabilité d'un évènement A |
| Esp{X} | $\mathbb{E}[X]$ | espérance d'une variable aléatoire X |
| Var{X} | Var(X) | variance d'une variable aléatoire X |
| sd{X} | $\sigma(X)$ | écart-type d'une variable aléatoire X |
| Lois discrètes usuelles | | |
| Bernoulli{p} | $\mathcal{B}(p)$ | loi de Bernoulli de paramètre <i>p</i> |
| Binom{n}{p} | $\mathcal{B}(n,p)$ | loi binomiale de paramètres (n, p) |
| Poisson{□} | $\mathcal{P}(\lambda)$ | loi de Poisson de paramètre λ |
| Geom{p} | $\mathcal{G}(p)$ | loi géométrique de paramètre <i>p</i> |
| <pre>Hyper{N,n,k}</pre> | $\mathcal{H}(N, n, k,,)$ | loi hypergéométrique de paramètres (N, n, k) |
| Lois continues usuelles | | |
| <pre>Exp{\lambda}</pre> | $\mathcal{E}(\lambda)$ | loi exponentielle de paramètre λ |
| Normale{\mu}{\sigma 2} | $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ | loi normale de paramètres (μ, σ) |
| chid{n} | $\chi 2n$ | loi du χ^2 à n degrés de liberté |
| Arithmétique | | |
| Zmod{n} | $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ | classe d'équivalence modulo <i>n</i> |
| Primes | ${\mathcal P}$ | ensemble des nombres premiers |
| divides | | relation de divisibilité |
| congr{a}{b}{n} | $a \equiv b[n]$ | a congru à b modulo n |
| pgcd{a}{b} | $a \lor b$ | PGCD |
| ppcm{a}{b} | $a \wedge b$ | PPCM |