

数理统计

Leo Yan

2026 年 5 月 5 日

目录

第一章	基本概念与统计模型	3
1.1	基本概念	3
1.2	统计推断	3
1.3	统计量	4
1.3.1	常见统计量	4
1.3.2	经验分布函数	6
1.4	统计模型	7
1.5	指数型分布族	7
1.6	贝叶斯模型	8
1.6.1	无信息先验	9
1.6.2	共轭先验	9
第二章	抽样分布和数据的简化	10
2.1	正态总体的样本均值和样本方差的分布	10
2.1.1	正态变量的线性组合	10
2.2	卡方分布, t分布和F分布	11
2.2.1	卡方分布	11
2.2.2	t分布	12
2.2.3	F分布	13
2.2.4	几个重要推论	13
2.3	次序统计量的分布	14
2.3.1	次序统计量的分布	14
2.3.2	极差的分布	16
2.3.3	均匀分布情形	16
2.4	统计量的极限分布	16
2.5	充分统计量	17
第三章	点估计	19
第四章	区间估计	20
第五章	参数假设检验	21

第一章 基本概念与统计模型

1.1 基本概念

Definition 1.1.1. 总体由与研究问题有关的所有个体组成。样本中的个体数目称为**样本大小**，抽取样本的行为称为**抽样**。

根据总体个数有限与无限，分为有限总体和无限总体。

总体也可看作所有个体上某种数量指标的集合，可以用一个随机变量及其概率分布（总体分布）描述。当数量指标有多个时，用随机向量表示总体。

Definition 1.1.2. 样本 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ 可能取值的全体，构成**样本空间**，记为 $\mathcal{X}$ 。

样本的两重性：既可看做随机变量（随机向量）（抽样前，Uppercase），又可看作确定的数（抽样后，lowercase）。

简单随机抽样：(1)代表性：等概率抽选；(2)独立性：样本个体值不影响其他值。

Definition 1.1.3 (简单随机样本). 总体（分布） F 中的容量为 n 的样本 $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. F 称为**简单随机样本**（简单样本/随机样本）。

1.2 统计推断

Definition 1.2.1. 将出现在样本分布中的未知常数称为**参数（向量）**，如 $N(a, \sigma^2) \rightarrow (a, \sigma^2)$ 。参数的取值范围称为**参数空间**。

Definition 1.2.2. 样本分布包含未知参数时，参数取不同值的样本分布构成分部族：

$$\mathcal{F} = \{F_{\theta}, \theta \in \Theta\} \text{ 或 } \mathcal{F} = \{f_{\theta}, \theta \in \Theta\}$$

其中 $\Theta \in \mathbb{R}^k$ 为参数空间。

Example 1.2.1. 指数分布 $\exp(\lambda)$ 的样本分布族为

$$\mathcal{F} = \{f_{\lambda}(x) = f(x, \lambda) : \lambda > 0\}$$

Definition 1.2.3. 从总体中抽取一定大小的样本去推断总体的概率分布的方法称为**统计推断**(statistical inference)。当样本分布形式已知，而含有未知实参数时的统计推断问题称为**参数统计推断问题**，否则称为**非参数统计推断问题**。

参数统计推断有多种，例如参数估计和假设检验。

1.3 统计量

Definition 1.3.1. 由样本算出的量（样本的函数）称为**统计量**(statistic)。

Remark 1.3.1. • 统计量只允许与样本有关而不允许与未知参数有关

• 统计量也具有两重性

1.3.1 常见统计量

Definition 1.3.2. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是从某总体 X 中抽取的样本，称

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

为**样本均值**(sample mean). 称

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

为**样本方差**(sample variance). 称

$$a_{n,k} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k, k = 1, 2, \dots$$

为**样本k阶原点矩**， $a_{n,1} = \bar{X}$ 。称

$$m_{n,k} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$$

为**样本k阶中心距**。

Proposition 1.3.1. (1) $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}) = 0$

(2) 设 a, b 为常数， $Y_i = aX_i + b$ ，则

$$\bar{Y} = a\bar{X} + b, S_Y^2 = a^2 S_X^2$$

(3) $\forall$ 常数 c ，有

$$\sum_{i=1}^n (X_i - c)^2 \geq \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

即均值是偏差平方最小准则下的最佳估计

Definition 1.3.3 (二维随机向量的样本矩). 设 $(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$ 为二维样本 $F(x, y)$ 中抽取的样本, 则已定义 $\bar{X}, \bar{Y}, S_X^2, S_Y^2$.

$$S_{XY} = \frac{1}{n}(X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})$$

称为X和Y的样本协方差(sample covariance).

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{[(n-1)S_X^2] \cdot [(n-1)S_Y^2]}}$$

称为样本相关系数(sample covariance coefficient).

Definition 1.3.4. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是从某总体F中抽取的样本, 按大小排序为 $X_{(1)}, \dots, X_{(n)}$, 称 $(X_{(1)}, \dots, X_{(n)})$ 是样本 $(X_1, \dots, X_n)$ 的次序统计量(order statistics). $(X_{(1)}, \dots, X_{(n)})$ 的一部分也可称为次序统计量。

Definition 1.3.5. • 样本中位数(sample median):

$$m_{\frac{1}{2}} = \begin{cases} X_{((n+1)/2)}, n \text{ 为奇数} \\ \frac{1}{2}[X_{(n/2)} + X_{(n/2+1)}], n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

• 样本p分位数($0 < p < 1$)(sample p-fractile):

$$X_{(m)}, m = [(n+1)p]$$

• 样本极值(extremum of sample): $X_{(1)}, X_{(n)}$

• 样本极差(sample range): $R = X_{(n)} - X_{(1)}$ 反映分散程度

Definition 1.3.6. 样本变异系数(sample coefficient of variation)与总体变异系数(population coefficient of variation):

$$\hat{\nu} = \frac{S_n}{\bar{X}t}, \nu = \frac{\sqrt{\text{Var}(X)}}{\mathbb{E}(X)}$$

后者以总体均值为单位度量总体分布的分散程度, 前者反映后者的信息。

Definition 1.3.7. 样本偏度(sample skewness):

$$\hat{\beta}_1 = \frac{m_{n,3}}{m_{n,2}^{3/2}} = \frac{\sqrt{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^3}{(\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2)^{3/2}}$$

总体偏度(population skewness):

$$\beta_1 = \frac{\mu_3}{\mu_2^{3/2}}$$

其中 μ_k 为总体的k阶中心矩。

后者衡量总体分布的非对称性, 前者反映后者的信息。

Definition 1.3.8. 样本峰度(sample kurtosis):

$$\hat{\beta}_2 = \frac{m_{n,4}}{m_{n,2}^2} - 3 = \frac{n \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^4}{\left(\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right)^2} - 3$$

总体峰度(population kurtosis):

$$\beta_2 = \frac{\mu_4}{\mu_2^2} - 3$$

其中 μ_k 为总体的 k 阶中心矩。

后者衡量概率密度函数在众数（最大值）附近尖锐程度，前者反映后者的信息。

1.3.2 经验分布函数

Definition 1.3.9. 设有 $F(x)$ 的次序统计量 $X_{(1)}, \dots, X_{(n)}$ ，称函数

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & x < X_{(1)} \\ \frac{k}{n}, & X_{(k)} \leq x < X_{(k+1)}, k = 1, 2, \dots, n-1 \\ 1, & X_{(n)} \leq x \end{cases}$$

为经验分布函数(empirical distribution function).

经验分布函数单调不减、右连续，是 $F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$ 的统计量。

定义示性函数

$$I_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

则

$$F_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I_{(-\infty, x]}(X_i)$$

在时刻 x 以前， X_i 发生了吗？

$$Y_i(x) = I_{(-\infty, x]}(X_i) \implies P(Y_i(x) = 1) = F(x), Y_1, \dots, Y_n \text{ i.i.d. } \sim B(1, F(x))$$

$$\implies nF_n(x) = \sum_{i=1}^n Y_i \sim B(n, F(x))$$

由此可得 $F_n(x)$ 的大样本性质：

Theorem 1.3.2. (1) 由中心极限定理，

$$\frac{\sqrt{n}(F_n(x) - F(x))}{\sqrt{F(x)(1 - F(x))}} \xrightarrow{\mathcal{L}} N(0, 1), n \rightarrow \infty$$

其中 $\xrightarrow{\mathcal{L}}$ 表示依分布收敛

(2) 由 Bernoulli（或辛钦）大数定律，

$$F_n(x) \xrightarrow{\mathbb{P}} F(x), n \rightarrow \infty$$

(3)由Borel大数定律, 以概率1收敛 (a.e.收敛):

$$\mathbb{P}(\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x)) = 1$$

(4)(Glivenko-Cantelli定理)用 D_n 衡量 $F_n(x)$ 总体上靠近 $F(x)$ 的程度:

$$D_n = \sup_{-\infty < x < \infty} |F_n(x) - F(x)|$$

则有

$$\mathbb{P}(\lim_{n \rightarrow \infty} D_n = 0) = 1$$

1.4 统计模型

一个问题的统计模型(statistical model)就是研究该问题时所抽样本的分布, 又称概率模型, 例如正态(分布)模型、泊松(分布)模型。

1.5 指数型分布族

Definition 1.5.1. 设 $\mathcal{F} = \{f(x, \theta) : \theta \in \Theta\}$ 是定义在样本空间 $\mathcal{X}$ 上的分布族, 若概率密度函数可以表示为以下形式:

$$f(x, \theta) = C(\theta) \exp \left[\sum_{i=1}^k Q_i(\theta) T_i(x) \right] h(x)$$

则称此分布族为指数型分布族/指数族(exponential family), 其中 $k \in \mathbb{N}^*$, $C(\theta) > 0$, $h(x) > 0$.

Remark 1.5.1. 指数族中的所有概率密度函数 $f(x, \theta)$ 的对 x 的支集必然不依赖于 θ .

Definition 1.5.2. 如果指数族的概率密度函数有如下形式:

$$f(x, \theta) = C^*(\theta) \exp \left[\sum_{i=1}^k \theta_i T_i(x) \right] h(x)$$

则称它为指数族的自然形式(natural form), 此时集合

$$\Theta^* = \left\{ (\theta_1, \dots, \theta_k) : \int_{\mathcal{X}} \exp \left[\sum_{i=1}^k \theta_i T_i(x) \right] h(x) ds < \infty \right\}$$

称为自然参数空间(natural parametric space).

Remark 1.5.2. 其中的参数组 θ 可能不是原分布中的参数组, 而是令 $\varphi_i = Q_i(\theta)$ 再改写符号 φ 为 θ .

Theorem 1.5.1. 指数族的自然形式下, 自然参数空间为凸集。

Theorem 1.5.2. 设指数族的自然形式下, 自然参数空间有内点, 记 $\Theta_0 = \text{int}\Theta^*$. 设实函数 $g(x)$ 使得以下积分在 Θ_0 内存在且有限:

$$G(\theta) = \int_{\mathcal{X}} g(x) \exp \left[\sum_{j=1}^k \theta_j T_j(x) \right] h(x) dx$$

则 $G(\theta)$ 的任意偏导数存在且可以与积分号换序。

1.6 贝叶斯模型

全概率+条件概率 $\implies$

Theorem 1.6.1 (贝叶斯公式(Bayes formula)). 设 $\{B_1, \dots, B_n\}$ 是样本空间 Ω 的完备事件群(分划), A 为 Ω 中的事件, 且 $\mathbb{P}(B_i) > 0, \mathbb{P}(A) > 0$, 则

$$\mathbb{P}(B_i|A) = \frac{\mathbb{P}(A|B_i)\mathbb{P}(B_i)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(A|B_i)\mathbb{P}(B_i)}{\sum_{j=1}^n \mathbb{P}(A|B_j)\mathbb{P}(B_j)}, i = 1, \dots, n$$

Remark 1.6.1. $\mathbb{P}(B_i)$ 为 A 未发生时对时间 B_i 发生可能性大小的估计, 而 $\mathbb{P}(B_i|A)$ 是在已知 A 发生后(新信息), 对 B_i 的发生可能性大小的新的认识。

“结果”推“原因”: 已知结果 A , 估计是哪一个原因导致 A 发生。

统计推断使用的三种信息:

- 总体信息
- 样本信息
- 先验信息: 抽样之前有关统计推断问题中未知参数的一些信息

基于前两者: 经典统计学; 基于全部三者: Bayes 统计学。

Definition 1.6.1. 参数空间 Θ 上 θ 的任一概率分布称为先验分布(prior distribution), 记为 $\pi(\theta)$.

Definition 1.6.2. 在获得样本 $\mathbf{X} = \mathbf{x}$ 后, θ 的后验分布(posterior distribution)记为 $\pi(\theta|\mathbf{x})$, 满足

$$\pi(\theta|\mathbf{x}) = \frac{f(\mathbf{x}, \theta)}{m(\mathbf{x})} = \frac{f(\mathbf{x}|\theta)\pi(\theta)}{\int_{\Theta} f(\mathbf{x}|\theta)\pi(\theta) d\theta}$$

其中 $f(\mathbf{x}|\theta)$ 为样本 $\mathbf{x}$ 的条件概率密度函数, $f(\mathbf{x}, \theta)$ 为 $\mathbf{X}, \theta$ 的联合概率密度函数, $m(\mathbf{x})$ 是 $\mathbf{X}$ 的边缘分布。离散情形下, 这个公式就是 Bayes 公式。

先验分布是抽取样本 $\mathbf{X}$ 之前对参数 θ 的认识, 后验分布是抽取样本之后对 θ 的认识。

Bayes 学派: 对参数 θ 的统计推断必须基于 θ 的后验分布。

先验分布的获取:

- 主观概率

- 无信息先验
- 共轭先验

1.6.1 无信息先验

Θ 有界时，无信息先验即均匀分布； Θ 无界时可以使用广义先验分布：

Definition 1.6.3. 设随机变量 $X \sim f(x|\theta), \theta \in \Theta$ ，若 θ 的先验密度 $\pi(\theta)$ 满足

1. $\pi(\theta) \geq 0$ 且 $\int_{\Theta} \pi(\theta) d\theta = \infty$
2. 后验密度 $\pi(\theta|x)$ 是概率密度函数

则称 $\pi(\theta)$ 为 θ 的广义（无信息）先验密度(improper prior density).

常取 $\pi(\theta) \equiv 1$ （乘以正常数无影响），此时

$$\pi(\theta|\mathbf{x}) = \frac{f(\mathbf{x}|\theta)}{\int_{\Theta} f(\mathbf{x}|\theta) d\theta}$$

位置参数族：概率密度函数形如 $f(x - \theta)$ ， θ 为位置参数。认为 X 与 $Y = X + c$ 有相同的统计问题结构，于是有相同的无信息先验，此时 $\pi(\theta) \equiv 1$.

刻度参数族：总体分布族的密度函数形如 $\sigma^{-1}\varphi(x/\sigma)$ ， $\sigma > 0$ 为刻度参数。认为 X 与 $Y = cX (c > 0)$ 有相同的统计问题结构，于是有相同的无信息先验，此时 $\pi(\sigma) = 1/\sigma$.

1.6.2 共轭先验

Definition 1.6.4. 设 $\mathcal{F}$ 表示又 θ 的先验分布 $\pi(\theta)$ 构成的分布族，如果 $\forall \pi \in \mathcal{F}$ 及样本 $\mathbf{x}$ ，后验分布 $\pi(\theta|\mathbf{x}) \in \mathcal{F}$ ，则称 $\mathcal{F}$ 是一个共轭先验分布族(conjugate prior distribution family).

共轭先验分布易于计算，并且其后验分布中一些参数可以得到很好的解释。

第二章 抽样分布和数据的简化

Definition 2.0.1. 统计量是样本的函数，原则上可由样本分布推出其概率分布，称之为抽样分布。

给出抽样分布的封闭表达式，称为**精确抽样分布**，但通常难以求出，且躲在正态分布条件下得到；多数情况下研究**极限分布**，样本量大时近似精确分布。

好的统计量能够简化数据，且信息无损失，此时称之为**充分统计量**。

2.1 正态总体的样本均值和样本方差的分布

2.1.1 正态变量的线性组合

Theorem 2.1.1. 设 $X_1, \dots, X_n \text{ i.i.d.} \sim N(a_k, \sigma_k^2)$, $c_1, \dots, c_k$ 为常数，记 $T = \sum_{k=1}^n c_k X_k$ ，则 $T \sim N(\mu, \tau^2)$ ，其中 $\mu = \sum_{k=1}^n c_k a_k$, $\tau^2 = \sum_{k=1}^n c_k^2 \sigma_k^2$ 。

Corollary 2.1.2. 设 $a_1 = \dots = a_n = a$, $\sigma_1 = \dots = \sigma_n = \sigma$ ，则

$$T \sim N\left(a \sum_{k=1}^n c_k^2, \sigma^2 \sum_{k=1}^n c_k^2\right)$$

令 $c_1 = \dots = c_n = 1/n$ ，则

$$T = \bar{X} \sim N\left(a, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

Theorem 2.1.3. 设 $X_1, \dots, X_n \text{ i.i.d.} \sim N(a, \sigma^2)$, $\mathbf{Y} = \mathbf{A}\mathbf{X}$ ，即

$$\begin{bmatrix} Y_1 \\ \vdots \\ Y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_n \end{bmatrix}$$

则

1. $\mathbf{Y}$ 联合高斯，且

$$\mathbb{E}[Y_i] = a \sum_{k=1}^n a_{ik}, \quad \text{Var}(Y_i) = \sigma^2 \sum_{k=1}^n a_{ik}^2, \quad \text{Cov}(Y_i, Y_j) = \sigma^2 \sum_{k=1}^n a_{ik} a_{jk}$$

2. 特别地，如果 $\mathbf{A}$ 是单位正交阵，则 $Y_1, \dots, Y_n \text{ i.i.d.} \sim N(\mu_i, \sigma^2)$ ，其中 $\mu_i = a \sum_{k=1}^n a_{ik}$ 。进一步， $a = 0$ 时 $Y_1, \dots, Y_n \text{ i.i.d.} \sim N(0, \sigma^2)$

Theorem 2.1.4. 设 $X_1, \dots, X_n \text{ i.i.d.} \sim N(a, \sigma^2)$, 则

1. $\bar{X} \sim N(a, \sigma^2)$
2. $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$
3. $\bar{X}$ 与 S^2 独立

Proof. 1.显然。对2, 令单位正交阵

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{n}} & \cdots & \frac{1}{\sqrt{n}} \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

则有

$$Y_1 = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n X_k = \sqrt{n} \bar{X}$$

$$\sum_{k=1}^n Y_k^2 = \sum_{k=1}^n X_k^2$$

因此

$$(n-1)S^2 = \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2 = \sum_{k=1}^n X_k^2 - n\bar{X}^2 = \sum_{k=1}^n Y_k^2 - Y_1^2 = \sum_{k=2}^n Y_k^2$$

而 $Y_1, \dots, Y_n \text{ i.i.d.} \sim N(\mu_k, \sigma^2)$, 其中 $\mu_i = a \sum_{k=1}^n a_{ik}$, 根据 A 的行向量的正交性知 $\mu_k = 0$, 因此

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \sum_{k=2}^n \left(\frac{Y_k}{\sigma} \right)^2 \sim \chi_{n-1}^2$$

对3, $\bar{X}$ 只与 Y_1 有关, S^2 只与 $Y_2, \dots, Y_n$ 有关, 得证。 □

2.2 卡方分布, t分布和F分布

2.2.1 卡方分布

Definition 2.2.1. 设 $X_1, \dots, X_n \text{ i.i.d.} \sim N(0, 1)$, 称

$$\xi = \sum_{k=1}^n X_k^2$$

是自由度为 n 的 χ^2 变量, 其分布称为自由度为 n 的 χ^2 分布。

Theorem 2.2.1. 设 $\xi \sim \chi_n^2$, 则其概率密度函数为

$$g_n(x) = \frac{1}{2^{n/2} \Gamma(n/2)} x^{n/2-1} e^{-x/2}, x > 0$$

即 $\chi_n^2 = \Gamma(\frac{n}{2}, \frac{1}{2})$.

自由度越大, χ_n^2 的概率密度曲线越由“偏左”趋于“对称”(极限为正态分布); $n = 1, 2$ 单调递减, $n \geq 3$ 有单峰。

将 χ_n^2 分布的上侧 α ($0 < \alpha < 1$) 分位数记为 $c = \chi_n^2(\alpha)$, 它满足 $\xi \sim \chi_n^2, \mathbb{P}(\xi > c) = \alpha$, 通常取较小的值。

Proposition 2.2.2 (χ^2 变量的性质). 设 $r.v. \xi \sim \chi_n^2$, 则

1. ξ 的特征函数为 $\varphi(t) = (1 - 2it)^{-n/2}$, 矩母函数为 $\phi(t) = (1 - 2t)^{-n/2}$.
2. $\mathbb{E}(\xi) = n, \text{Var}(\xi) = 2n$.
3. 设 $Y \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$, 则 $Z = 2\lambda Y \sim \chi_{2n}^2$.
4. 设 $Z_i i.i.d. \sim \chi_{n_i}^2$, 则 $\sum_{i=1}^k Z_i \sim \chi_{n_1 + \dots + n_k}^2$.

Proof. 利用 $\Gamma(n, \lambda)$ 的矩母函数为 $\left(\frac{\lambda}{\lambda - t}\right)^n$ 可得。 □

2.2.2 t 分布

Definition 2.2.2. 设 $r.v. X \sim N(0, 1), Y \sim \chi_n^2$ 且两者独立, 称

$$T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

为自由度为 n 的 **t 变量**, 其分布称为自由度为 n 的 **t 分布**, 记为 t_n 。

Theorem 2.2.3. 设 $r.v. T \sim t_n$, 则其概率密度函数为

$$t_n(x) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2})\sqrt{n\pi}} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}$$

t_n 类似标准正态分布 $N(0, 1)$, 为单峰偶函数, 在 $x = 0$ 处取最大值, 但是峰值相对低、尾部相对粗, n 越大越接近 $N(0, 1)$ 。

将 t_n 分布的双侧上 α ($0 < \alpha < 1$) 分位数记为 $c = t_n(\alpha)$, 它满足 $T \sim t_n, \mathbb{P}(T > c) = \alpha$ 。

Proposition 2.2.4 (t_n 变量的性质). 设 $r.v. T \sim t_n$, 则

1. $\mathbb{E}[T^r]$ 仅当 $r < n$ 时存在, 且

$$\mathbb{E}[T^r] = \begin{cases} n^{r/2} \frac{\Gamma(\frac{r+1}{2})\Gamma(\frac{n-r}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2})\Gamma(\frac{1}{2})}, & r \text{ 为偶数} \\ 0, & r \text{ 为奇数} \end{cases}$$

特别地, $n \geq 2$ 时, $\mathbb{E}[T] = 0$; $n \geq 3$ 时, $\text{Var}(T) = \frac{n}{n-2}$

2. t_1 就是柯西分布: $t_1(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = N(0, 1)$.

2.2.3 F分布

Definition 2.2.3. 设r.v. $X \sim \chi_m^2, Y \sim \chi_n^2$ 且两者独立, 则称

$$F = \frac{X/m}{Y/n}$$

是自由度为m和n的**F变量**, 其分布函数称为自由度为m和n的**F分布**, 记为 $F \sim F_{m,n}$.

Theorem 2.2.5. r.v. $Z \sim F_{m,n}$ 的概率密度函数为

$$f_{m,n}(x) = B\left(\frac{m}{2}, \frac{n}{2}\right) m^{\frac{m}{2}} n^{\frac{n}{2}} x^{\frac{m}{2}-1} (n+mx)^{-\frac{m+n}{2}}, x > 0$$

自由度m,n有序; $f_{m,n}(x)$ 是偏态的, m一定, n越小, 偏态越严重。

将 $F_{m,n}$ 分布的上侧 α ($0 < \alpha < 1$) 分位数记为 $c = F_{m,n}(\alpha)$, 它满足 $F \sim F_{m,n}, \mathbb{P}(F > c) = \alpha$ 。

Proposition 2.2.6 (F变量的性质). 设 $Z \sim F_{m,n}$, 则

1. $1/Z \sim F_{n,m}$

2. $\forall 0 < r < \frac{n}{2}$, 有

$$\mathbb{E}[Z^r] = \left(\frac{n}{m}\right)^r \frac{\Gamma(\frac{m}{2} + r) \Gamma(\frac{n}{2} - r)}{\Gamma(\frac{n}{2}) \Gamma(\frac{m}{2})}$$

特别地,

$$\mathbb{E}[Z] = \frac{n}{n-2}, n > 2, \quad \text{Var}(Z) = \frac{2n^2(m+n-2)}{m(n-2)^2(n-4)}, n > 4$$

3. 若 $T \sim t_m$, 则 $T^2 \sim F_{1,m}$

4. $F_{m,n}(1-\alpha) = \frac{1}{F_{n,m}(\alpha)}$

2.2.4 几个重要推论

Corollary 2.2.7. 设 $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. $\sim \text{Exp}(\lambda)$, 则

$$2\lambda n \bar{X} = 2\lambda \sum_{k=1}^n X_k \sim \chi_{2n}^2$$

Proof. 易证 $2\lambda X_k \sim \chi_2^2$, 利用 χ^2 分布的性质4即证。 □

Corollary 2.2.8. 设

$$\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)^T \sim N_n(\boldsymbol{\mu}_{n \times 1}, \Sigma_{n \times n})$$

其中 $\text{Cov}(\mathbf{X}) = \Sigma > 0$ (正定), 则

$$U = (\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})^T \Sigma^{-1} (\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu}) \sim \chi_n^2$$

Proof. $\mathbf{Y} = \Sigma^{-1/2}(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu}) \sim N_n(\mathbf{0}, I)$, 其中 $\Sigma = O\Lambda O^T, \Sigma^{-1/2} = O\Lambda^{-1/2}O^T$, 它将多元正态分布白化(球化).

由 χ^2 分布的定义可知 $U = \mathbf{Y}^T \mathbf{Y} = \sum_{k=1}^n Y_k^2 \sim \chi_n^2$. □

Corollary 2.2.9. 设 $X_1, \dots, X_n i.i.d. \sim N(a, \sigma^2)$, 则

$$T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - a)}{S} \sim t_{n-1}$$

Proof. $\bar{X} \sim N(a, \sigma^2/n)$, 将其标准化:

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - a)}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

又知

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2, \text{ 即 } \frac{S^2}{\sigma^2} \sim \frac{\chi_{n-1}^2}{n-1}$$

得到

$$T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - a)/\sigma}{\sqrt{S^2/\sigma^2}} = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - a)}{S} \sim t_{n-1}$$
□

Corollary 2.2.10. 设 $X_1, \dots, X_m i.i.d. \sim N(a_1, \sigma^2), Y_1, \dots, Y_n i.i.d. \sim N(a_2, \sigma^2)$, 且 X, Y 相互独立, 则

$$T_w = \frac{(\bar{X} - a_1) - (\bar{Y} - a_2)}{S_w} \cdot \sqrt{\frac{mn}{m+n}} \sim t_{n+m-2}$$

其中

$$(n+m-2)S_w^2 = (m-1)S_X^2 + (n-1)S_Y^2$$

(证明略)

Corollary 2.2.11. 设 $X_1, \dots, X_m i.i.d. \sim N(a_1, \sigma_1^2), Y_1, \dots, Y_n i.i.d. \sim N(a_2, \sigma_2^2)$, 且 X, Y 相互独立, 则

$$F = \frac{S_X^2}{S_Y^2} \cdot \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} \sim F_{m-1, n-1}$$

(证明略)

2.3 次序统计量的分布

2.3.1 次序统计量的分布

Lemma 2.3.1. 设总体 X 的分布函数为 $F(x)$, 密度函数为 $f(x)$, $X_1, \dots, X_n$ 为简单样本, 则有

$$\int \cdots \int_{a < x_1 < \cdots < x_n < b} f(x_1) \cdots f(x_n) dx_1 \cdots dx_n = \frac{1}{n!} [F(b) - F(a)]^n, -\infty \leq a < b \leq \infty$$

Theorem 2.3.2 (次序统计量的分布). 设 $X_1, \dots, X_n i.i.d. \sim F$, 有概率密度函数 f , $(X_{(1)}, \dots, X_{(n)})$ 为次序统计量. 记 $Y_i = X_{(i)}$, 则次序统计量的联合密度为

$$g(y_1, \dots, y_n) = \begin{cases} n!f(y_1) \cdots f(y_n), & \text{if } y_1 < \cdots < y_n \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

Proof. Supp g 显然是 $y_1 < \cdots < y_n$. 每个 $g(y_1, \dots, y_n)$ 对应 $n!$ 种排列方式导致的 $n!$ 种情况. □

Theorem 2.3.3 (两个次序统计量的联合分布). 设 $X_1, \dots, X_n i.i.d. \sim F$, 有概率密度函数 f , $(X_{(1)}, \dots, X_{(n)})$ 为次序统计量, 则其中任意二者 $(X, Y) = (X_{(i)}, X_{(j)})(i < j)$ 的联合密度为

$$f_{ij}(x, y) = \begin{cases} \frac{n!f(x)f(y)}{(i-1)!(j-i-1)!(n-j)!} F^{i-1}(x)(F(y)-F(x))^{j-i-1}(1-F(y))^{n-j}, & \text{if } x < y \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

Proof. $f_{ij}(x, y)$ 是 $g(y_1, \dots, y_n)$ 的边缘分布. 将积分分离变量如下:

$$\begin{aligned} f_{ij}(x, y) &= n!f(x)f(y) \int \cdots \int_{-\infty < x_1 < \cdots < x_{i-1} < x} f(x_1) \cdots f(x_{i-1}) dx_1 \cdots dx_{i-1} \\ &\quad \times \int \cdots \int_{x < x_{i+1} < \cdots < x_{j-1} < y} f(x_{i+1}) \cdots f(x_{j-1}) dx_{i+1} \cdots dx_{j-1} \\ &\quad \times \int \cdots \int_{y < x_{j+1} < \cdots < x_n < \infty} f(x_{j+1}) \cdots f(x_n) dx_{j+1} \cdots dx_n \end{aligned}$$

利用 lemma 2.3.1, 得到

$$f_{ij}(x, y) = n!f(x)f(y) \cdot \frac{F^{i-1}(x)}{(i-1)!} \cdot \frac{[F(y)-F(x)]}{(j-i-1)!} \cdot \frac{[1-F(y)]^{n-j}}{(n-j)!}$$

□

类似可求任意个次序统计量的联合分布。

Theorem 2.3.4 (单个次序统计量的分布). 设 $X_1, \dots, X_n i.i.d. \sim F$, 有概率密度函数 f , $(X_{(1)}, \dots, X_{(n)})$ 为次序统计量, 则 $X = X_{(m)}$ 的概率密度函数为

$$f_m(x) = m \binom{n}{m} F^{m-1}(x) [1-F(x)]^{n-m} f(x)$$

分布函数为

$$F_m(x) = m \binom{n}{m} \int_0^{F(x)} t^{m-1} (1-t)^{n-m} dt$$

特别地, 令 $m = 1$ 得到样本极小值的概率密度函数:

$$f_1(x) = n(1-F(x))^{n-1} f(x)$$

令 $m = n$ 得到样本极大值的概率密度函数:

$$f_n(x) = nF^{n-1}(x) f(x)$$

2.3.2 极差的分布

极差 $R = X_{(n)} - X_{(1)}$. 令

$$\begin{cases} Z = X_{(1)} \\ R = X_{(n)} - X_{(1)} \end{cases} \iff \begin{cases} X_{(1)} = Z \\ X_{(n)} = Z + R \end{cases}$$

则雅可比行列式

$$J = \left| \frac{\partial(X_{(1)}, X_{(n)})}{\partial(Z, R)} \right| = 1$$

因此

$$\begin{aligned} g(z, r) &= J f_{ij}(z, z+r) \\ &= \begin{cases} n(n-1)[F(z+r) - F(z)]^{n-2} f(z+r)f(z), & r > 0 \\ 0, & r \leq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

求边缘分布即得 R 的概率密度函数为

$$g_R(r) = \int_{-\infty}^{\infty} g(z, r) dz$$

2.3.3 均匀分布情形

令 $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. $\sim U(0, 1)$, 则

$$\begin{aligned} f_m(x) &= m \binom{n}{m} x^{m-1} (1-x)^{n-m} I_{(0,1)}(x) \\ f_{ij}(x, y) &= \begin{cases} \frac{n!}{(i-1)!(j-i-1)!(1-y)!} x^{i-1} (y-x)^{j-i-1} (1-y)^{n-j}, & 0 < x < y < 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \end{aligned}$$

$(X_{(1)}, \dots, X_{(n)})$ 的联合概率密度函数为

$$f(x_{(1)}, \dots, x_{(n)}) = n!, 0 < x_{(1)} < \dots < x_{(n)} < 1$$

极差的概率密度函数为

$$g_R(r) = n(n-1)r^{n-2}(1-r)I_{(0,1)}$$

2.4 统计量的极限分布

Definition 2.4.1 (极限分布/大样本分布). 如果样本容量 $n \rightarrow \infty$ 时的统计量分布趋于一确定分布, 则该分布称为统计量的极限分布/大样本分布。

Definition 2.4.2 (大样本性质/小样本性质). 样本容量 $n \rightarrow \infty$ 时的统计量或统计推断方法的性质称为大样本性质; 当样本容量固定时称为小样本性质。

Example 2.4.1 (强相合性). 设 $X_1, \dots, X_n \text{i.i.d.} \sim F$, 其中总体 F 均值为 a , 方差为 $\sigma^2 < \infty$, 样本均值为

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

由Kolmogorov强大数定律, 有

$$\mathbb{P}(\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{X}_n = a) = 1 \iff \bar{X}_n \xrightarrow{\text{a.e.}} a$$

该性质称为 $\bar{X}_n$ 的强相合性, 为大样本性质。

Example 2.4.2. 假设同上, 由Lindeberg中心极限定理,

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - a)}{\sigma} \xrightarrow{\mathcal{L}} N(0, 1)$$

其中 $\xrightarrow{\mathcal{L}}$ 表示依分布收敛。该性质称为 $\bar{X}_n$ 的渐近正态性, 为大样本性质。

Example 2.4.3. 假设同上, $\mathbb{E}[\bar{X}_n] = a$ 称为 $\bar{X}_n$ 的无偏性, 为小样本性质。

2.5 充分统计量

充分性原则: 如果 $T(\mathbf{X})$ 为参数 θ 的充分统计量, 则依赖样本 $\mathbf{X}$ 对 θ 做的任何统计推断都可以仅通过统计量 $T(\mathbf{X})$ 进行, 而不会损失关于 θ 的信息。

Definition 2.5.1 (充分统计量). 设样本 $\mathbf{X}$ 的分布族为 $\{f(\mathbf{x}, \theta), \theta \in \Theta\}$ 。如果已知统计量 $T = T(\mathbf{X})$ 的条件下, 样本 $\mathbf{X}$ 的条件分布与参数 θ 无关, 即 $\forall$ 事件 $A, \mathbb{P}_\theta(\mathbf{X} \in A | T = t)$ 与 θ 无关, 则称 $T(\mathbf{X})$ 为 θ 的充分统计量(sufficient statistic)。

Remark 2.5.1. 这是充分统计量不依赖于信息论的等价定义形式, 相当于说 $\theta \rightarrow T(\mathbf{X}) \rightarrow \mathbf{X}$ 构成Markov链。

以下定理给出了较为简便的充分统计量判则:

Theorem 2.5.1 (因子分解定理). 设样本 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n) \sim f(\mathbf{x}, \theta)$ 统计量 $T(\mathbf{X})$ 是充分统计量 $\iff f(\mathbf{x}, \theta)$ 可分解为以下形式:

$$f(\mathbf{x}, \theta) = g(\mathbf{T}(\mathbf{x}), \theta)h(\mathbf{x})$$

直观: 给定 $\mathbf{t}(\mathbf{x})$, $f(\mathbf{x}, \theta)$ 就可以由 $h(\mathbf{x})$ 归一化获得。

Corollary 2.5.2. 设 $\mathbf{T} = \mathbf{T}(\mathbf{X})$ 是 θ 的充分统计量, $S = \varphi(\mathbf{T})$ 是可逆函数, 则 $S = \varphi(\mathbf{T})$ 也是 θ 的充分统计量。

可逆函数表明 $S \rightleftharpoons T$, 它们一定含有相同的信息。

Definition 2.5.2 (极小充分统计量). 关于分布族 $\{f_\theta(x)\}$ 的充分统计量 $T(X)$ 是其他任何充分统计量 $S(X)$ 的函数, 则称 $T(X)$ 为关于 $\{f_\theta(x)\}$ 的极小充分统计量(minimal sufficient statistic) 定义蕴含 $\theta \rightarrow S(X) \rightarrow T(X) \rightarrow X$

Theorem 2.5.3. 设样本 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ 的概率密度函数为 $f(\mathbf{x}, \theta), x \in \mathcal{X}, \theta \in \Theta$. 对于充分统计量 $\mathbf{T}(\mathbf{x})$, 如果对任意两个样本点 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$,

$$\frac{f(\mathbf{x}, \theta)}{f(\mathbf{y}, \theta)} \text{ 为与 } \theta \text{ 无关的常数} \iff \mathbf{T}(\mathbf{x}) = \mathbf{T}(\mathbf{y})$$

则 $\mathbf{T}(\mathbf{x})$ 是 θ 的极小充分统计量。

Proof. 要证: 任一其他充分统计量 $\mathbf{T}^*(\mathbf{X})$, $\mathbf{T}(\mathbf{X})$ 都是 $\mathbf{T}^*(\mathbf{X})$ 的函数。

根据因子分解定理, 存在 g^*, h^* 使得

$$f(\mathbf{x}, \theta) = g^*(\mathbf{T}^*(\mathbf{x}), \theta) h^*(\mathbf{x})$$

令样本点 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathcal{X}$ 满足 $\mathbf{T}^*(\mathbf{x}) = \mathbf{T}^*(\mathbf{y})$, 则

$$\frac{f(\mathbf{x}, \theta)}{f(\mathbf{y}, \theta)} = \frac{g^*(\mathbf{T}^*(\mathbf{x}), \theta) h^*(\mathbf{x})}{g^*(\mathbf{T}^*(\mathbf{y}), \theta) h^*(\mathbf{y})} = \frac{h^*(\mathbf{x})}{h^*(\mathbf{y})}$$

与 θ 无关, 因此 $\mathbf{T}(\mathbf{x}) = \mathbf{T}(\mathbf{y})$, 也就是说

$$\mathbf{T}^*(\mathbf{x}) = \mathbf{T}^*(\mathbf{y}) \implies \mathbf{T}(\mathbf{x}) = \mathbf{T}(\mathbf{y})$$

因此以下函数是良定义的:

$$\varphi: \mathbf{T}^*(\mathbf{x}) \mapsto \mathbf{T}(\mathbf{x}), \forall \mathbf{x} \in \mathcal{X}$$

□

Remark 2.5.2. 我们只用到了

$$\frac{f(\mathbf{x}, \theta)}{f(\mathbf{y}, \theta)} \text{ 为与 } \theta \text{ 无关的常数} \implies \mathbf{T}(\mathbf{x}) = \mathbf{T}(\mathbf{y})$$

但这不影响定理表述的正确性, 因为根据因子分解定理, $\Leftarrow$ 是自动成立的。

Proposition 2.5.4. 根据指数族的性质可以得到:

1. 二项分布 $B(m, \theta)$ 中, θ 的极小充分统计量为 $\sum_{i=1}^n X_i$ 或 $\bar{X}$
2. Poisson分布 $P(\lambda)$ 中, λ 的极小充分统计量为 $\sum_{i=1}^n X_i$ 或 $\bar{X}$
3. 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 中, $\mathbf{T}(\mathbf{X}) = (\sum_{i=1}^n X_i, \sum_{i=1}^n X_i^2)$ 或 $\mathbf{T}(\mathbf{X}) = (\bar{X}, S^2)$ 为 (μ, σ^2) 的极小充分统计量
4. Gamma分布 $\Gamma(r, \lambda)$ 中, $\mathbf{T}(\mathbf{X}) = (\sum_{i=1}^n X_i, \sum_{i=1}^n \ln(X_i))$ 为 (r, λ) 的极小充分统计量

第三章 点估计

第四章 区间估计

第五章 参数假设检验