

Ejercicio 1

Equipo

2024-03-26

1. Regresión a través del origen.

$$y_i = \beta x_i + \xi_i \quad i : 1, \dots, n$$

donde ξ_1, \dots, ξ_n son v.a.i talque $\xi_i \sim N\left(0, \frac{\sigma^2}{w_i}\right) \forall i = 1, \dots, n$ Suponiendo σ^2 conocida y $w_i = \frac{1}{x_i^2} \quad i = 1, \dots, n$

I)

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2 &= \sum_{i=1}^n (y_i - \beta x_i)^2 \\ \frac{d}{d\beta} &= 2 \sum_{i=1}^n (y_i - \beta x_i) (-x_i) = 0 \\ &\rightarrow \sum_{i=1}^n (y_i - \beta x_i) (-x_i) = 0 \rightarrow \sum_{i=1}^n y_i (-x_i) + \sum_{i=1}^n \beta x_i^2 = 0 \\ \therefore \hat{\beta} &= \frac{\sum_{i=1}^n y_i x_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2} \end{aligned}$$

II) $\text{Var}(\hat{\beta})$

$$\begin{aligned} \text{Var}(\hat{\beta}) &= \text{Var}\left(\frac{\sum Y_i X_i}{\sum X_i^2}\right) \\ &= \text{Var}\left(\frac{\sum X_i (\beta X_i + \xi_i)}{\sum X_i^2}\right) \end{aligned}$$

Continúa...

5+5

[1] 10