

2. PROCEDIMIENTOS EN CASO DE DERRAMES Y ACCIDENTES CON MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS



A. ACCIDENTES CORTO PUNZANTES

Si el manipulador se clava una aguja contaminada con antineoplásico u otro elemento corto punzante.



Aclarar con agua tibia presionando para intentar extraer posible sangre contaminada.



Acudir a la Unidad de Emergencia.



Actuar como si se tratara de una extravasación: kit de extravasación en enfermería UEH.



Informar a jefe directo.



Informar a Prevencionista de Riesgos.

SE DEBE SEGUIR PROTOCOLO DE ACCIDENTE CORTOPUNZANTE Y SU CLASIFICACIÓN DE RIESGO PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS A SEGUIR Y EL MANEJO POSTERIOR.



B. DERRAMES DE ANTINEOPLÁSICOS

Salida accidental de medicamentos antineoplásicos desde su envase de origen.

1



Usar EPP: guantes (doble), mascarilla, bata impermeable y protección ocular.

2



Contener el derrame con material absorbente desechable (toallas o paños).

3



Limpiar desde el borde hacia el centro. Usar solución descontaminante específica.

4



Desechar todo el material en contenedor para residuos citotóxicos.

5



Retirar EPP cuidadosamente y realizar higiene de manos.

6



Completar formulario DIAT (Anexo N°1) e interno (Anexo N°2) y notificar a Prevencionista de Riesgos.



C. CONTACTO DE ANTINEOPLÁSICOS CON PIEL O MUCOSAS

- Si el área afectada es la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón la zona afectada durante 10-15 minutos y acudir a urgencia para evaluación médica.
- Ojos o mucosas: limpieza rápida con abundante suero fisiológico (en su defecto agua templada) durante al menos 15 minutos y acudir a urgencia para evaluación médica.



Informar a jefe directo.



Informar a Prevencionista de Riesgos.

D. KIT DE DERRAME

Debe contener los siguientes elementos:

Equipo de protección personal:

- Bata impermeable.
- Pechera plástica.
- Mascarilla P3.
- Manguilas desechables (media manga de punto ajustada que cubra desde el codo a la muñeca).
- 2 pares de guantes de látex sin talco.
- Guantes multiuso de látex.
- Gafas anti salpicaduras con protección lateral.
- Gorro.

Equipo de descontaminación:

- Pinzas desechables.
- Pala y escobilla desechable para recoger fragmentos de vidrio.
- Paños absorbentes.
- Solución jabonosa.
- Agua (mínimo 1 litro).
- Alcohol de 70°.
- Contenedor plástico rígido etiquetado (rótulo antineoplásicos).
- Bolsas plásticas de color rojo.



IMPORTANTE: Toda exposición a sangre o fluidos de riesgo es una **EMERGENCIA**.

La profilaxis (PEP) debe iniciarse lo antes posible, idealmente antes de las 2 a 24 horas y no más allá de 72 horas postexposición.

3. REGISTROS Y NOTIFICACIONES



Completar formulario DIAT (Anexo N°1) e interno (Anexo N°2) según corresponda.



Registrar en ficha clínica del funcionario del funcionario (datos mínimos).



Notificar a Prevencionista de Riesgos y registrar en sistema institucional.



Realizar seguimiento del caso y registros estadísticos.



Enviar DIAT a Instituto de Seguridad Laboral (ISL).



LA PREVENCIÓN, LA ACCIÓN OPORTUNA Y EL SEGUIMIENTO ADECUADO PROTEGEN TU SALUD Y LA DE TODOS.

¡CUIDARTE ES CUIDARNOS TODOS!

