
a Reproducibility: cross-sample AUC correlation
AUC+
fMRI: ICC(3, 1) = 0.87 (0.92)
HCP-YA
HCP-EP (controls)
YRSP
Ketamine (placebo)
Risperidone (placebo)
MPH (placebo)
HCP-YA (MEG-beta)
0.82 0.86 0.81 0.77
0.92 0.84 0.77 0.74
0.95 0.89 0.93 0.82
0.92 0.85 0.98 0.85
0.93 0.84 0.90 0.90
0.89 0.84 0.93 0.94 0.95
0.54 0.59 0.55 0.59 0.57 0.63
Spearman's ρ Whole brain
Only cortex available
Spearman's ρ Cortex
AUC−
fMRI: ICC(3, 1) = 0.89 (0.94)
0.94 0.96 0.93 0.96
0.99 0.98 0.84 0.95
0.99 0.98 0.87 0.95
0.96 0.94 0.96 0.87
0.96 0.96 0.94 0.91
0.96 0.96 0.96 0.89 0.92
0.75 0.77 0.74 0.62 0.83 0.74
b External validity: AUC scores derived from MEG (MRI for comparison)
AUC+
AUC−
CMRglu
SV2A
HDAC
VMAT2
mGluR5
NMDA
GABAA
GABAA5
NET
α4β2
M1
VAChT
FDOPA
D1
D2/3
DAT
5-HT1A
5-HT1B
5-HT2A
5-HT4
5-HT6
5-HTT
MOR
KOR
CB1
delta
theta
alpha
beta
lgamma
hgamma
MRI
MEG
Z(AUC)
AUC (normalized)
Mean AUC
p / pMeff < 0.05
p / pMeff < 0.05 (meta-analysis)
c MRI-MEG (beta) correspondence of AUC profiles
AUC+ vs. AUC+
ρSpearman = 0.56
p = 0.004
AUC− vs. AUC−
ρSpearman = 0.77
p < 0.001
AUC+ vs. AUC−
ρSpearman = −0.53
p = 0.007
AUC− vs. AUC+
ρSpearman = −0.49
p = 0.012
MRI AUC+
AUC+ MEG-beta
AUC− MEG-beta
AUC profile correlation
Sample mean AUC scores
Sample mean slope
Individual slopes
r = −1.00 to 1.00