

a
Dependence on s ($b_p = 1/2$, 3Γ)
$n_{ss}/n_{ss}(N_{max})$
1.000
0.975
0.950
0.925
0.900
0.875
0.850
0.825
0.800
20
40
80
160
300
Fock truncation N
$s = 0.01$
$s = 0.1$
$s = 0.3$
$s = 1$
$s = 5$
b
Dependence on b_p ($s = 0.1$, 3Γ)
$b_p = 1/6$, $h = 1.21$
$b_p = 5/6$, $h = 0.24$
$b_p = 1/2$, $h = 0.40$
n_{ss}
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
60
120
250
Fock truncation N
c
Dependence on Δ ($s = 1$, three levels)
$n_{ss}/n_{ss}(N_{max})$
1.000
0.975
0.950
0.925
0.900
0.875
0.850
0.825
0.800
60
120
250
400
Fock truncation N
$b_p = 1/2$, 2Γ
$b_p = 1/2$, 5Γ
$b_p = 1/2$, 8Γ
$b_p = 1/2$, 12Γ
$b_p = 5/6$, 12Γ
d
Neighbouring levels lower b_{eff}, which raises h
D1 $F' = 2$, $g_p = 2$, 12Γ: $b_{eff} = 0.50$
D2 $F' = 2$, $g_p = 2$, 8Γ: $b_{eff} = 0.48$
D2 $F' = 2$, $g_p = 2$, 12Γ: $b_{eff} = 0.46$
D2 $F' = 2$, $g_p = 1$, 12Γ: $b_{eff} = 0.37$
n_{ss}
10^{-1}
10^{-2}
80
160
250
400
550
Fock truncation N