

# Relatività Generale

Prof. E. Castorina, a.a. 2024-25

Leonardo Cerasi<sup>1</sup>

GitHub repository: [LeonardoCerasi/notes](#)

<sup>1</sup>[leo.cerasi@pm.me](mailto:leo.cerasi@pm.me)

---

# Indice

Indice	ii
Introduzione	1
<b>I Il Principio d'Equivalenza</b>	<b>3</b>
<b>1 Geodetiche</b>	<b>4</b>
1.1 Particelle non-relativistiche . . . . .	4
1.1.1 Equazione geodetica . . . . .	4
1.2 Particelle relativistiche . . . . .	5

---

# Introduzione

Nello studio delle interazioni a distanza si introducono le cosiddette teorie di campo: un campo è un'entità fisica che esiste in ogni punto dello spaziotempo (es: campo elettrico, magnetico, etc...) e che viene modificata dalla presenza di portatori della carica associata al campo.

Nel caso del di una teoria di campo per descrivere la gravità, è necessario un campo gravitazionale che sia influenzato dalla massa. Nel caso Newtoniano il campo gravitazionale  $\Phi(\mathbf{r}, t)$  è legato alla densità di massa  $\rho(\mathbf{r}, t)$  da un'equazione di Poisson:

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho \quad (1)$$

dove  $G \approx 6.67 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$  è la costante universale di Newton.

È banale ricavare il campo gravitazionale di una massa puntiforme  $M$ : in questo caso  $\rho(\mathbf{r}) = M\delta^3(\mathbf{r})$ , dunque  $\Phi(\mathbf{r}) = -\frac{GM}{r}$ . Il caso in cui invece  $\rho$  dipende dal tempo è non banale e per essere trattato necessita di un'equazione più generale di Eq. 1: l'equazione di campo di Einstein.

**Analogie e differenze con l'Elettromagnetismo** Superficialmente, il problema della generalizzazione relativistica della gravitazione potrebbe sembrare analogo a quello dell'elettromagnetismo: entrambe le forze, nel caso stazionario, sono governate da una legge proporzionale a  $r^{-2}$  ed entrambi i campi sono determinati da equazioni di Poisson in cui cambia solo la costante dimensionale.

La differenza tra le due teorie di campo, però, sta proprio nella descrizione matematica delle sorgenti che subentrano nelle equazioni di Poisson: nel caso dell'Elettromagnetismo, in regime stazionario il campo elettromagnetico è determinato dalla densità di carica  $\rho_e$  e dalla densità di corrente  $\mathbf{J}$ , e per avere una descrizione relativistica bisogna combinarle in una densità di corrente quadri-vettoriale  $j^\mu = (c\rho_e, \mathbf{J})$  (si può vedere che  $\rho_e$  trasforma come una componente temporale poiché  $\rho_e \sim \text{Vol}_3^{-1} \sim (\text{Vol}_4/ct)^{-1} \sim ct$ , dato che il quadrivolume è un invariante di Lorentz): ciò risulta naturalmente in un potenziale quadri-vettoriale  $A^\mu = (\phi/c, \mathbf{A})$ .

D'altra parte, per quanto riguarda la gravitazione, bisogna ricordare l'uguaglianza relativistica tra massa energia; inoltre, a differenza della carica elettrica, l'energia non è un invariante relativistico, ma è la componente temporale del quadri-vettore impulso: in particolare, a generare il campo gravitazionale sono la densità di energia  $\rho$  e la densità di momento  $\rho_p$ , alle quali sono associate una densità di corrente di energia  $\mathbf{j}$  ed una densità di corrente di momento  $\mathbf{T}^i$  per ciascuna componente  $\rho_p^i$ . Risulta evidente che l'equazione relativistica che descrive il campo gravitazionale sia notevolmente più complicata di quella del campo elettromagnetico, poiché le sorgenti non sono descritte da un quadri-vettore, bensì da un tensore, il tensore energia-impulso:

$$T^{\mu\nu} \sim \begin{bmatrix} \rho c & \rho_p c \\ \mathbf{j} & \mathbf{T} \end{bmatrix} \quad (2)$$

Naturalmente, anche il potenziale gravitazionale sarà un tensore  $h_{\mu\nu}$ , ed il potenziale Newtoniano sarà  $h_{00} \sim \Phi$ .

**Scala della Relatività Generale** Tramite le costanti fondamentali  $G$  e  $c$  è possibile associare ad una massa  $M$  una sua lunghezza caratteristica, detta raggio di Schwarzschild:

$$R_s := \frac{2GM}{c^2} \quad (3)$$

Le correzioni relativistiche alla teoria della gravitazione sono determinate dal parametro  $R_s/r$  e, nella maggior parte delle situazioni, sono trascurabili: basti calcolare che per la Terra  $R_s \approx 10^{-2}$  m, mentre il suo raggio è  $R_T = 6 \cdot 10^6$  m, dunque sulla superficie terrestre le correzioni relativistiche alla gravità Newtoniana sono dell'ordine di  $10^{-8}$ .

Gli effetti relativistici diventano importanti quando si considerano oggetti compatti come stelle di neutroni e buchi neri.

# Parte I

## Il Principio d'Equivalenza

# Geodetiche

Nelle teorie classiche di campo vengono considerati due oggetti distinti: le particelle e i campi. I campi determinano il moto delle particelle, mentre le particelle determinano le oscillazioni dei campi.

## 1.1 Particelle non-relativistiche

Per descrivere il moto di una particella tra due punti fissati  $\mathbf{x}(t_1) \equiv \mathbf{x}_1$  e  $\mathbf{x}(t_2) \equiv \mathbf{x}_2$  si studia l'azione  $S$  associata alla traiettoria  $\mathbf{x}(t)$ , definita come:

$$S[\mathbf{x}(t)] := \int_{t_1}^{t_2} dt L(\mathbf{x}(t), \dot{\mathbf{x}}(t)) \quad (1.1)$$

dove  $L$  è la lagrangiana che descrive la particella.

La traiettoria percorsa dalla particella, per il principio di minima azione, è quella che estremizza  $S$ , ovvero tale per cui  $\delta S = 0 \forall \delta \mathbf{x}(t) : \delta \mathbf{x}(t_1) = \delta \mathbf{x}(t_2) = 0$ ; esplicitando:

$$\begin{aligned} \delta S &= \int_{t_1}^{t_2} dt \delta L(\mathbf{x}(t), \dot{\mathbf{x}}(t)) = \int_{t_1}^{t_2} dt \left( \frac{\partial L}{\partial x^i} \delta x^i + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} \delta \dot{x}^i \right) \\ &= \int_{t_1}^{t_2} dt \left( \frac{\partial L}{\partial x^i} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} \right) \right) \delta x^i + \left[ \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} \delta x^i \right]_{t_1}^{t_2} \end{aligned} \quad (1.2)$$

dove si è usata la convenzione di somma di Einstein.

Si vede subito che il termine di bordo è nullo, dunque estremizzare l'azione equivale alle equazioni di Eulero-Lagrange:

$$\frac{\partial L}{\partial x^i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} = 0 \quad (1.3)$$

### 1.1.1 Equazione geodetica

In generale, il moto di una particella libera su una generica varietà differenziale è descritto dalla lagrangiana  $L = \frac{1}{2} m \dot{\mathbf{x}} \cdot \dot{\mathbf{x}}$ ; bisogna dunque tener conto della metrica della varietà considerata:

$$L = \frac{m}{2} g_{ij}(x) \dot{x}^i \dot{x}^j \quad (1.4)$$

dove  $x$  rappresenta collettivamente tutte le coordinate  $x^i$  sulla varietà. Si ricordi che, per una varietà reale  $n$ -dimensionale,  $g_{ij} \in \mathbb{R}^{n \times n}$  è una matrice reale simmetrica.

Le equazioni di Eulero-Lagrange diventano dunque:

$$\frac{m}{2} \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} \dot{x}^i \dot{x}^j - \frac{d}{dt} (m g_{ik} \dot{x}^i) = 0 \quad (1.5)$$

Espandendo il secondo termine:

$$\frac{1}{2} \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} \dot{x}^i \dot{x}^j - \frac{\partial g_{ik}}{\partial x^j} \dot{x}^i \dot{x}^j - g_{ik} \ddot{x}^i = 0 \quad (1.6)$$

Del termine  $g_{ik,j} - \frac{1}{2} g_{ij,k}$ , essendo contratto con un fattore simmetrico  $\dot{x}^i \dot{x}^j$ , sopravvive solo la parte simmetrica rispetto agli indici  $i$  e  $j$ , ovvero:

$$g_{ik} \ddot{x}^i + \frac{1}{2} \left( \frac{\partial g_{ik}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jk}}{\partial x^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} \right) \dot{x}^i \dot{x}^j = 0 \quad (1.7)$$

A questo punto, si contrae per la metrica inversa  $g^{lk}$ , che per definizione soddisfa  $g^{lk} g_{ik} = \delta_i^l$ , così da ottenere (rinominando gli indici):

$$\ddot{x}^i + \Gamma_{jk}^i \dot{x}^j \dot{x}^k = 0 \quad (1.8)$$

dove è stato definito il simbolo di Christoffel:

$$\Gamma_{jk}^i := \frac{1}{2} g^{il} \left( \frac{\partial g_{lj}}{\partial x^k} + \frac{\partial g_{lk}}{\partial x^j} - \frac{\partial g_{jk}}{\partial x^l} \right) \quad (1.9)$$

Questa equazione del moto è nota come equazione geodetica e le sue soluzioni sono dette geodetiche.

## 1.2 Particelle relativistiche