

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME					
Peronospora (Plasmopara viticola)	Interventi di difesa Fino alla prefioritura - iniziare la difesa seguendo le indicazioni dei Bollettini tecnici territoriali Fino alla allegagione - intervenire preventivamente sulla base della previsione delle piogge - in caso contrario si può intervenire con finalità curative impiegando miscele contenenti antiperonosporici endoterapici entro il 25% del periodo di incubazione della presunta infezione Dall'allegagione in poi - impiegare prodotti di copertura (rameici)	Prodotti rameici	(*)		(*) Si raccomanda di non superare il quantitativo di 4 kg di s.a./ha/anno
		Zolfo	(*)		(*) Autorizzati i formulati in miscela con Rame
		Laminarina			
		Cerevisane			
		Olio essenziale di arancio dolce			
		Fosetil Al		10*	(*) Escluso viti in allevamento
		Fosfonato di sodio			
		Fosfonato di potassio			
		Dithianon		12	
		Folpet			
		Fluazinam			
		Pyraclostrobin		3*	(*) Tra Pyraclostrobin, Trifloxystrobin e Azoxystrobin
		Cimoxanil	4	4	
		Iprovalicarb			
		Mandipropamide			
		Valiphenal		3	
		Benalaxyl-M			
		Metalaxil-M			
		Metalaxil	(*)		(*) Metalaxil e Fluopicolide utilizzabili in alternativa
		Fluopicolide	2*		
		Zoxamide	4		
		Cyazofamid		3	
		Amisulbrom			
		Ametoctradina	3		
		Oxathiapiprolin	2		
Oidio (Uncinula necator - Oidium tuckeri)	Interventi di difesa intervenire sulla base dell'andamento climatico preferendo l'impiego dei prodotti più efficaci nelle fasi più critiche che verranno segnalate nei Bollettini tecnici provinciali Nelle zone ad alto rischio nella fase di prechiusura grappolo sono da preferire le applicazioni con zolfo polverulento Per evitare inconvenienti nella vinificazione limitare l'uso dello zolfo con particolare riguardo all'ultimo periodo (dopo invaiatura)	Zolfo			
		Cerevisane			
		Bacillus amyloliquefaciens			
		Ampelomyces quisqualis			
		Estratto acquoso di semi germinati di Lupinus albus dolce			
		Olio essenziale di arancio dolce			
		Bicarbonato di potassio	8		
		COS-OGA			
		Laminarina			
		Eugenolo + Geraniolo + Timolo			
		Polisolfuro di calcio			
		Bupirimate		2*	(*) Max tra Bupirimate, Proquinazid e Pyriofenone, quest'ultimo è in alternativa a Metrafenone
		Proquinazid			(*) Al massimo 3 interventi tra Pyriofenone e Metrafenone
		Pyriofenone	(*)		
		Metrafenone		3*	(*) Tra Pyraclostrobin, Trifloxystrobin e Axoxystrobin
		Trifloxystrobin			
		Pyraclostrobin			
		Cyflufenamide	2		
		Mefentrifluconazolo		3	
		Penconazolo			
		Tetraconazolo			
		Difenoconazolo	1		
		Tebuconazolo			
		Spiroxamina	3		
		Fluxapiroxad		3*	(*) Max 3 interventi tra Boscalid, Isofetamid e Fluxapyroxad
		Boscalid	1		
		Meptyl-dinocap	3*		(*) Utilizzabile fino al 30/09/2026

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE	
Muffa grigia o Botrite (<i>Botrytis cinerea</i>)	Interventi agronomici - scelta di idonei vitigni e sistemi di allevamento - evitare qualsiasi tipo di forzatura - adottare concimazioni equilibrate - potatura verde eseguita razionalmente Interventi di difesa - nei vigneti ad alto rischio sono consigliati due interventi preventivi: in prechiusura grappolo e nel periodo che va dall'invaiaitura a 3-4 settimane prima della vendemmia - nei vigneti a basso rischio si consiglia di intervenire solo se l'andamento climatico è molto favorevole allo sviluppo della malattia - Con applicazioni di preparati microbiologici e terpeni si consiglia di intervenire dalla fase florale	(Eugenolo + Geraniolo + Timolo)				
		<i>Pythium oligandrum</i>				
		<i>Aureobasidium pullulans</i>				
		Cerevisane				
		<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>				
		<i>Bacillus subtilis</i>				
		<i>Trichoderma atroviride</i>				
		(<i>Trichoderma asperellum</i> + <i>Trichoderma gamsii</i>)				
		<i>Metschnikowia fructicola</i>				
		<i>Saccaromyces cerevisiae</i>				
		Bicarbonato di potassio				
		Estratto acquoso di semi germinati di <i>Lupinus albu</i> s dolce				
		Laminarina				
		Contro questa avversità, massimo 2 interventi all'anno, ad esclusione delle sostanze attive sopra riportate				
		Fluazinam	2	12*		(*) Tra Dithianon, Folpet e Fluazinam
Pyrimethanil	1	2				
Fludioxonil + Cyprodinil	1					
Cyprodinil	1					
Fenexamid	2					
Boscalid	1			3*	(*) Max 3 interventi tra Boscalid, Isofetamid e Fluxapyroxad	
Isofetamid	1					
Black Rot (<i>Guignardia bidwelii</i>)	Interventi agronomici - asportare ed eliminare i residui di potatura - raccogliere e distruggere i grappoli infetti Interventi chimici - intervenire su varietà e vigneti a rischio - privilegiare nella scelta dei fungicidi antiperonosporici e antioidici - sostanze attive efficaci anche su Black-rot	Prodotti rameici	(*)		(*) Si raccomanda di non superare il quantitativo di 4 kg di s.a./ha/anno	
		Zolfo	(*)		(*) Autorizzati i formulati in miscela con Rame	
		Trifloxystrobin		3*	(*) Tra Pyraclostrobin, Trifloxystrobin e Azoxystrobin	
		Azoxystrobin		3		
		Mefentrifluconazolo				
		Tetraconazolo				
		Penconazolo				
		Difenconazolo	1			
		Dithianon		12*	(*) Tra Dithianon, Folpet e Fluazinam	
		Folpet				
		Fosfonato di potassio		10*	(*) Ammesso solo in miscela con Folpet. Tra Fosetil AI, Fosfonato di potassio e Fosfonato di sodio	
Escoriosi (<i>Phomopsis viticola</i>)	Si raccomanda di intervenire nelle prime fasi vegetative solo nei vigneti affetti da questa micopatia	Prodotti rameici	(*)		(*) Si raccomanda di non superare il quantitativo di 4 kg di s.a./ha/anno	
		Zolfo				
		Folpet		12*	(*)Tra Folpet, Fluazinam e Dithianon	
		(Dithianon + Fosfonato di potassio)		10*	(*) Tra Fosetil AI, Fosfonato di potassio e Fosfonato di sodio	
Mal dell'esca e altre malattie fungine del legno	Nel caso di piante ammalate, asportare la parte del tronco invasa dal fungo e allevare dal legno sano un nuovo germoglio, previa disinfezione con mastici cicatrizzanti della superficie di taglio In caso di piante fortemente attaccate procedere all'estirpazione Negli altri casi, segnare le piante affette con nastro colorato quando sono ancora ben evidenti i sintomi sulle foglie e poi, all'atto della potatura Tali piante vanno potate come indicato nei criteri di intervento separatamente dalle altre per evitare il diffondersi della malattia per mezzo delle forbici Procedere poi alla disinfezione delle forbici					
		(<i>Trichoderma asperellum</i> + <i>Trichoderma gamsii</i>)				
		<i>Trichoderma atroviride</i>				
		(Pyraclostrobin + Boscalid)	(*)			(*) Trattamento al bruno sui tagli di potatura, non si conteggia nei limiti degli SDHI e delle strobilurine
Marciume acido Batteri (<i>Acetobacter</i>); Lieviti (<i>Candida</i> spp <i>Kloeckera</i> spp)	È favorito da lesioni degli acini	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>				
		<i>Bacillus subtilis</i>				
		<i>Pythium oligandrum</i>				
		(<i>Trichoderma asperellum</i> + <i>Trichoderma gamsii</i>)				
		Cerevisane				

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
FITOFAGI					
Tignoletta dell'uva (<i>Lobesia botrana</i>)	Non sono ammessi trattamenti contro la I generazione				Installare trappole per la cattura degli adulti con le caratteristiche riportate nelle tabelle 21 e 22 delle Norme generali e in base alle indicazioni dei Bollettini tecnici territoriali
Tignola dell'uva (<i>Clysia ambiguella</i>)	Per le generazioni successive:	Confusione sessuale (*)			(*) Indicato come soluzione integrativa alla difesa chimica nelle aziende che hanno avuto forti attacchi negli anni precedenti Da applicare prima del volo della prima generazione in base alle indicazioni dei Bollettini tecnici provinciali di produzione integrata
Eulia (<i>Argyrotaenia</i> (= <i>Eulia pulchellana</i>))	Soglie II generazione: - vigneti solitamente infestati: presenza di uova o di fori di penetrazione - vigneti solitamente non infestati: 5% di grappoli infestati da uova e/o larve o con fori di penetrazione III generazione: - sono ammessi interventi nei vigneti dove si accerta il superamento della soglia (5% grappoli infestati)	<i>Bacillus thuringiensis</i>			- L'impiego del <i>Bacillus thuringiensis</i> richiede la massima tempestività (uova con testa nera) e accuratezza di esecuzione In molti casi è necessario eseguire 2 interventi - Con andamento stagionale normale l'epoca del primo o dell'unico intervento cade tra il 9° e il 13° giorno dall'inizio della fase crescente delle catture
		Azadiractina	(*)		(*) Ammesso contro <i>Lobesia botrana</i>
		Al massimo 2 interventi all'anno, ad esclusione delle sostanze attive sopra riportate			
	Epoca di esecuzione campionamenti: - II generazione: da "mignolatura" a "chiusura grappolo" - III generazione: da "invaiaitura" a 1° decade di settembre Il momento preciso per l'intervento è indicato dai Bollettini tecnici territoriali sulla base delle indicazioni dei modelli previsionali	Spinosad	3		
		Tebufenozide			
		Clorantraniliprole		1	
		Cyantraniliprole			
		Emamectina	2		
Cicaline (<i>Empoasca vitis</i> , <i>Zygina rhamni</i>)	Interventi di difesa Si consiglia di intervenire in caso di forte infestazione (almeno 2 forme mobili per foglia)	Azadiractina			
		Sali potassici di acidi grassi			
		<i>Beauveria bassiana</i>			
		Olio essenziale arancio dolce			
		Olio minerale	1		
		Al massimo 1 intervento all'anno, ad esclusione delle sostanze attive sopra riportate			
		Piretrine pure			(*) Tra Piretrine e Piretroidi (**) Tra Etofenprox, Lambdacialotrina ed Esfenvalerate
		Tau-fluvalinate	2	4*	
		Etofenprox	1**		
		Acetamiprid	1		
		Flupyradifurone	1		
Cocciniglia (<i>Planococcus ficus</i>)	Trattamento consigliato solo se riscontrata presenza nell'anno precedente Le infestazioni possono essere contenute evitando condizioni di eccessivo ombreggiamento Interventi di lotta biologica <i>Anagyrus pseudococci</i> distribuire l'insetto a partire da fine aprile-maggio con dosaggi stagionali di 1500-2000 individui/ettaro in almeno 2 lanci differiti a seconda dei trattamenti e dell'andamento <i>Cryptolaemus montrouzieri</i> distribuire l'insetto vicino ai focolai di infestazione delle cocciniglie con dosaggi indicativi di 200-300 individui/ettaro. In caso di consistenti infestazioni, l'impiego di Anagyrus può essere ben abbinato a quello di Cryptolaemus Distanziare i lanci di insetti utili di almeno 7 giorni dagli interventi insetticidi obbligatori contro scafoideo	Confusione sessuale			
		Azadiractina			
		<i>Anagyrus vladimiri</i>			
		<i>Cryptolaemus montrouzieri</i>			
		<i>Beauveria bassiana</i>			
		Olio minerale			
		Maltodestrina			
		Acetamiprid	1		
		Pyriproxyfen	1		
		Flupiradifurone	1		
Cocciniglia asiatica (<i>Pseudococcus comstocki</i>)	Interventi di lotta biologica Per le quantità e modalità di distribuzione valgono le indicazioni riportate sotto per <i>Planococcus ficus</i>	Azadiractina			
		<i>Anagyrus pseudococci</i>			
		<i>Cryptolaemus montrouzieri</i>			
		<i>Beauveria bassiana</i>			
		Maltodestrina			
		Olio minerale			
Cocciniglie (<i>Parthenolecanium corni</i> , <i>Targionia vitis</i> , <i>Pulvinaria vitis</i> , <i>Heliococcus bohemicus</i>)	Interventi chimici presenza diffusa nell'anno precedente <i>Targionia vitis</i> e <i>Parthenolecanium corni</i> posizionare gli interventi a fine inverno <i>Targionia vitis</i> , <i>Parthenolecanium corni</i> e <i>Pulvinaria vitis</i> posizionare gli interventi a migrazione neanide indicativamente per la Targonia in maggio e le altre in giugno, seguire le indicazioni dei Bollettini tecnici territoriali	Maltodestrina			(*) Ammesso solo su <i>Parthenolecanium corni</i> e <i>Pulvinaria vitis</i>
		Azadiractina			
		Olio minerale			
		Pyriproxyfen	1*		
		Acetamiprid	1		

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Apate o bostrico della vite (<i>Sinoxylon sexdentatum</i> <i>Sinoxylon perforans</i>)	Effettuare la lotta in caso di forti attacchi ricorrendo a provvedimenti di tipo agronomico				- Appendere da metà aprile a metà maggio lungo i filari fascine-esca di tralci di potatura per attirare le femmine ovideponenti - A metà giugno, a ovideposizione ultimata, le fascine vanno rimosse ed eliminate per distruggere uova e larve presenti
Ragnetto giallo (<i>Eotetranychus carpini</i>)	Soglia - inizio vegetazione: 60-70% di foglie con forme mobili presenti	Sali potassici di acidi grassi			
		Al massimo 1 intervento acaricida all'anno, ad esclusione delle sostanze attive sopra riportate			
		Exitiazox		1	
		Fenpyroximate			
		Tebufenpirad			
Ragnetto rosso (<i>Panonychus ulmi</i> , <i>Tetranychus urticae</i>)	- piena estate: 30-45% di foglie con forme mobili presenti	Acequinocyl	(*)		(*) Utilizzabile solo su Ragnetto rosso
Nematodi (<i>Xiphinema index</i>)	Ricorrere a materiale da riproduzione proveniente da vivai che ne garantiscano la sanità e la certificazione				
FITOFAGI OCCASIONALI	Si interviene in caso di forte attacco	Maltodestrina			
Acariosi della vite (<i>Calepitrimerus vitis</i>)		Olio minerale	(*)		(*) Non impiegabile dopo la fase di gemma gonfia nelle formulazioni in miscela con Zolfo
		Zolfo			
		Tebufenpirad	1	1	
Tripide (<i>Drepanothrips reuteri</i>)	Eseguire rilevamenti ad inizio vegetazione e intervenire solo nel caso di forti infestazioni che blocchino il germogliamento	<i>Amblyseius swirskii</i>			
		Azadiractina			
		<i>Paecylomyces fumosoroseus</i>			
		<i>Beauveria bassiana</i>			
		Sali potassici di acidi grassi			
		Olio essenziale di arancio dolce			
		Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno, ad esclusione delle sostanze attive sopra riportate			
		Spinosad	3		
		Piretrine pure	1	4*	(*) Tra Piretrine e Piretroidi
Scafoideo (<i>Scaphoideus titanus</i>)	Nelle aree delimitate dal Servizio fitosanitario (in base a quanto stabilito nel Decreto di lotta obbligatoria alla Flavescenza dorata) eseguire gli interventi obbligatori previsti Per il posizionamento dei trattamenti si raccomanda di seguire le indicazioni dei Bollettini tecnici territoriali Indicativamente: Primo intervento (rispettare il periodo della fioritura): - circa 35 giorni dopo la schiusura delle uova. Secondo intervento: - intervenire con un prodotto adulticida dopo circa 15 - 25 giorni dal primo trattamento, a seconda dell'infestazione presente e dal primo trattamento, a seconda dell'infestazione presente e della persistenza del prodotto impiegato precedentemente. Porre attenzione al rispetto delle api.				
		<i>Beauveria bassiana</i>			
		Sali potassici di acidi grassi			
		Olio essenziale di arancio dolce			
		Azadiractina			
		Acetamiprid	1		
		Piretrine pure		4*	
		Etofenprox			
		Lambdacialotrina	1**		(**) Tra Etofenprox, Lambdacialotrina ed Esfenvalerate
		Esfenvalerate			(*) Tra Piretrine e Piretroidi
		Tau-fluvalinate	2		
		Deltametrina	2		
		Flupyradifurone	1		
Nottua primaverile (<i>Noctua fimbriata</i>)	Infestazioni occasionali alla ripresa vegetativa con danni a carico di gemme e germogli erbacee, in particolare con inizi di stagione caldi	<i>Bacillus thuringiensis</i>			
Lumache (<i>Arion</i> spp.)	Presenza e rilevamento primi danni	Fosfato ferrico			Trattamento localizzato alla base del ceppo
Metcalfa (<i>Metcalfa pruinosa</i>)		Flupyradifurone	1		
Fillosera (<i>Daktulosphaira vitifoliae</i>)	Soglia				
	Forte attacco nell'anno precedente	Acetamiprid	1		