SAE – Sistematização da Assistência de Enfermagem

Puérpera Admitida em Alojamento Conjunto

NOME:	Data de Nascimento://	
Estado civil:	Escolaridade: Profissão/ocupação: Raça:	
) POC () Fórceps. Data do parto:h	
	_HD:Admissão com acompanhante de livre escolha: () sim () não	
	Nº de consultas no pré-natal: Internação do RN:	
-	()MSD ()MSE. Sinais flogísticos: () Sim () Não - Alergias:	
Patologias:	Queixas: () Sim ()Não Qual:	
NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS:		
	Respiração: () Eupneica () Taquipneica () Dispneica () Bradipneica	
OXIGENAÇÃO E	AP: () MV () RA:	
CIRCULAÇÃO	Batimentos cardíacos: () Normocárdica ()Bradicárdica () Taquicárdica	
	Pressão Arterial: () Normotensa () Hipertensa () Hipotensa	
HIDRATAÇÃO E	Aceita dieta oferecida - ()Total () Parcialmente () Não aceita () Zero até:h	
NUTRIÇÃO	Abdome: () Normotenso e flácido () Globoso () Distendido () Doloroso	
ELIMINAÇÃO	Diurese: () Espontânea () CVD () CVA Características:	
	Evacuações: () Presente () Ausente Nº/dias:	
SONO E REPOUSO	Sono e repouso: () Satisfatório () Insatisfatório	
MOTILIDADE E	Membros inferiores: () Sem alterações () Edema (/++++) () Varizes () Deambulante	
LOCOMOÇÃO:	Sinal de Homans: () Presente () Ausente	
CUIDADO CORPORAL	Higiene: () Preservada () Alterada	
INTEGRIDADE	Pele e Mucosa: () Corada () Hipocorada () Ictérica () Outros:	
CUTÂNEO-MUCOSA	Incisão cirúrgica: () curativo oclusivo () limpa e seca () com sinais flogísticos:	
	Períneo: () Íntegro () Laceração () Episiorrafia () Edema () Hematoma	
REGULAÇÃO	Nível de consciência: () Lúcida () Orientada () Desorientada/confusa () Sonolenta	
NEUROLÓGICA	() Outros:	
SEXUALIDADE E REPRODUÇÃO	Mamas: () Flácidas () Túrgidas () Ingurgitadas () outros:	
	Lóquios: () Fisiológicos () Aumentados Quantidade: () fétido	
	OLES: SSVV: T:ºC FC:bpm R:irpm PA:mmHg g Altura:cm SpO2:%	
EXAMES ALTERADOS:		

NECESSIDADES PSICOSSOCIAIS E PSICOESPIRITUAIS		
SEGURANÇA EMOCIONAL	 () alterações de humor () crises de choro () emotividade exacerbada () insegurança () irritabilidade () tristeza () alegria () medo () ansiedade 	
AMOR E ACEITAÇÃO	() carência afetiva () desinteresse pelo RN - Apoio familiar: () sim () não Acompanhante () sim () não Quem:	
APRENDIZAGEM E EDUCAÇÃO EM SAÚDE	 () Dúvidas sobre o autocuidado () Dificuldade em compreender o regime terapêutico () Dúvidas sobre o período pós-parto () Dúvidas sobre aleitamento materno () Dificuldades na ordenha de leite materno () Dúvidas/dificuldades nos cuidados com o RN 	
COMUNICAÇÃO E GREGÁRIA	() boa interação familiar () conflito familiar () isolamento () recebe visitas () gravidez desejada () gravidez indesejada	
AUTOESTIMA E AUTOCONFIANÇA	Percepção sobre a imagem corporal: () satisfeita () insatisfeita Autoconfiança como mãe: () satisfeita () insatisfeita	
RELIGIOSIDADE E ESPIRITUALIDADE	Religião: Necessita de auxílio espiritual? () sim () não	

PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM				
Diagnósticos de Enfermagem	Intervenções de Enfermagem	Avaliação		
□ Volume de líquidos deficiente	 □ Monitorar o estado de hidratação, conforme apropriado; □ Oferecer líquidos, conforme apropriado; □ Monitorar os sinais vitais; 	☐ Melhorado ☐ Piorado ☐ Inalterado		
	□ Administrar terapia IV, conforme prescrição.	□ Resolvido		
□ Disposição para amamentação melhorada	 □ Informar sobre as vantagens e as desvantagens do aleitamento materno; □ Corrigir conceitos errados, informações incorretas e imprecisões sobre a amamentação; □ Monitorar e estimular amamentação sob livre demanda; □ Avaliar o padrão de sucção/deglutição do recém-nascido. 	□ Melhorado □ Piorado □ Inalterado □ Resolvido		
□ Privação de sono □ Padrão do sono prejudicado	 □ Evitar interrupções desnecessárias e permitir períodos de descanso; □ Criar um ambiente calmo e de apoio; □ Proporcionar um ambiente seguro e limpo. 	☐ Melhorado☐ Piorado☐ Inalterado☐		

		□ Resolvido
□ Conforto prejudicado	□ Descrever as razões para o relaxamento, seus benefícios, limites e tipos disponíveis; □ Criar um ambiente calmo e sem interrupções, com iluminação difusa e temperatura confortável, sempre que possível;	□ Melhorado □ Piorado □ Inalterado □ Resolvido
	□ Otimizar tempo de internação.	
□ Integridade da pele	□ Monitorar a integridade da pele dos mamilos;	□ Melhorado
prejudicada	□ Orientar sobre o cuidado dos mamilos, inclusive como evitar	□ Piorado
	fissuras;	□ Inalterado
	□ Aplicação de compressa de gelo na região perineal;	□ Resolvido
□ Risco de infecção	☐ Examinar o local da incisão quanto a hiperemia, edema ou sinais	□ Melhorado
	de deiscência;	□ Piorado
	□ Realizar curativo mantendo rigor asséptico;	□ Inalterado
	□ Aplicar curativo apropriado para proteger a incisão.	□ Resolvido
□ Dor aguda	□ Realizar uma avaliação completa da dor, incluindo local,	□ Melhorado
	características, início/duração, frequência, qualidade, intensidade e gravidade, além de fatores precipitadores;	□ Piorado
	☐ Oferecer alívio da dor mediante a analgesia prescrita;	□ Inalterado
	□ Ensinar o uso de técnicas não farmacológicas.	□ Resolvido
□ Ansiedade	□ Usar abordagem calma e tranquilizadora;	□ Melhorado
□ Medo	□ Observar sinais verbais e não verbais de ansiedade;	□ Piorado
	□ Encorajar a expressão de sentimentos, percepções e medos;	□ Inalterado
	□ Escutar o paciente com atenção;	□ Resolvido
	□ Explicar todos os procedimentos;	
	□ Oferecer informações reais sobre diagnóstico, tratamento e prognóstico.	
□ Disposição para processo	□ Discutir os sentimentos que a mãe possa ter em relação ao bebê;	□ Melhorado
perinatológico melhorado	□ Demonstrar confiança na capacidade da mãe para cuidar do	□ Piorado
☐ Processo perinatológico ineficaz	recém-nascido;	□ Inalterado
meneuz	□ Monitorar o surgimento de sintomas de depressão pós-parto.	□ Resolvido
□ Disposição para	□ Determinar as necessidades de aprendizagem do paciente;	□ Melhorado
conhecimento melhorado	□ Orientar os pais/cuidador a alimentar somente com leite materno;	□ Piorado
□ Conhecimento deficiente	□ Orientar os pais/cuidador a colocar o bebê de costas para dormir;	□ Inalterado
		□ Resolvido

CARDOSO, Jacqueline Maia Santos; FONSECA, Luciana Mara Monti. Instrumento para SAE de puérperas em ACN. Ribeirão Preto: EERP-USP, 2023. Produto da Dissertação: CARDOSO, JMS. Desenvolvimento de um formu	láric
para a sistematização da assistência de enfermagem à puérpera em alojamento conjunto. 2023. 89 p. Dissertação (Mestrado) - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023.	

	☐ Orientar os pais/cuidador a testar a temperatura da água do banho.	
□ Outro:		
		□ Piorado
		🗆 Inalterado

ORIENTAÇÕES DE ENFERMAGEM - POI/ 1PO e 2PO

OME:		
() Rotinas de permanência da mãe, pai ou representante le	egal nas 24horas por dia.	
() Cuidados com Puérpera (deambulação precoce, aliment	<u> </u>	
() Cuidados com RN (curativo do coto umbilical, 1º banho e		
() Amamentação (sinais que o bebê quer mamar, frequênci		
excesso de leite, importância do leite materno nos primeiro		
() Perigo do aleitamento materno cruzado		
() Prejuízos no uso de bicos , chupetas (dentição, anti-h diarreias).	nigiênico, desenvolvimento das fala, Aleitamento ao seio,	
() Orientação sobre que NÃO existe leite fraco e que o beb outro alimento nos 6 primeiros meses.	pê em aleitamento materno NÃO precisa de água, chá ou	
() Como não deixar o leite secar (Massagem, ordenha e líqu	uidos).	
() Riscos de quedas Puérpera e RN		
() Onde procurar ajuda se tiver dúvidas com a amamentaçã	ão depois que voltar para casa.	
CHECK LIST DE ENFERMA	GEM PARA ALTA HOSPITALAR	
() Puérpera recebeu e compreendeu as informações		
materno e retorno a sua unidade de saúde na primeira so		
() RN em AME com sucção ao seio, pega e posicioname materno;	ento adequados, pois NÃO há restrições ao aleitamento	
() RN em uso de substituto do leite humano/formula lácte atualização OMS;	a pois a amamentação é contra-indicada de acordo com	
() A mãe, o pai e outros cuidadores foram orientados a reconascido apresentar problemas com aleitamento materno, id	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
() A mulher foi orientada a procurar a USF ou o hospital ca operatória, sangramento com odor fétido ou com volu sofrimento emocional ou outros desconfortos, intercorrênce	ume aumentado, edema assimétrico de extremidades,	
() Orientada a higienizar as mãos antes e após o cuidado co	om o recém-nascido;	
() Orientada a deixar a criança em decúbito dorsal, manter e 2 anos ou mais complementar;	r a amamentação ao seio até os 6 meses exclusivamente	
() Alta hospitalar evoluida no prontuário, dados do RN a	notado na carteira da criança.	
() Solicitado avaliação do serviço social se necessário.	·	
Assinatura e Carimbo do Profissional	Assinatura e carimbo do profissional	
Euı	recebi e compreendias informações acimas descritas.	
Assinatura do acompanhante	Assinatura da paciente	