Carnet de seguimiento del control de miopía

Grupo Manejo Miopía Latam · Llévelo a todos los controles, con el optómetra y con el oftalmólogo

Datos de base

Nombre	**Fecha de nacimiento**	**Edad al inicio de la miopía**	**Padres miopes** Ninguno · Uno · Dos
Tratamiento Gafas · Blandos · Orto-k · Atropina · Combinado	**Fecha de inicio**	**Profesional / consultorio**	**Oftalmología pediátrica**

Controles

Fecha	Edad	AV OD / OI	Refracción cicloplejica OD	Refracción cicloplejica OI	Longitud axial OD (mm)	Longitud axial OI (mm)	Crecimiento en 12 meses OD / OI	Equipo de medición	Horas de uso / aire libre	Próximo control

Qué revisar según el tratamiento

Calendario del primer año. Luego, control cada 6 meses. Refracción ciclopléjica y longitud axial cada 6 meses; examen completo con fondo de ojo cada año.

Gafas para control de miopía

1 mes · 6 meses · 1 año

Montura bien ajustada que no se baje · lentes centradas · uso todo el día (12 horas o más) · estado de las lentes.

Lentes de contacto blandos

1 semana · 1 mes · 6 meses · 1 año

Córnea en lámpara de hendidura · horas y días de uso · cómo se pone, se quita y cuida los lentes · ojo rojo o molestias.

Ortoqueratología

1 día · 1 semana · 1 mes · 3 meses · 6 meses · 1 año

Topografía corneal · visión al levantarse · córnea en lámpara de hendidura · limpieza de los lentes · reemplazo del lente cada año · biometría y topografía cada 6 meses.

Atropina en baja dosis

1 día · 1 semana · 1 mes · 3 meses · 6 meses · 1 año

Tamaño de la pupila · sensibilidad a la luz · visión de cerca y acomodación · presión del ojo · uso todas las noches.

Cómo leer el crecimiento del ojo en 12 meses

Verde: como un ojo sin miopía

0,1 a 0,2 mm/año entre 7 y 10 años · cerca de 0,1 mm/año entre 11 y 16 años.

Amarillo: más de lo ideal

Se acerca a lo de un miope sin tratamiento: 0,3 mm/año a los 7-10 años · 0,2 mm/año a los 11-16. Revisar adherencia y hábitos.

Meta de largo plazo

Mantener el ojo por debajo de 26 mm. Que el percentil de longitud axial no siga subiendo.

Registro específico del tratamiento

Fecha	Hallazgos del tratamiento (ajuste, córnea, topografía, pupila, presión)	Molestias o eventos	Decisión

Fuentes: IMI Clinical Management Guidelines 2019 · Consejo Mundial de Optometría · Tideman 2016 y 2018 · Myopia Profile.