

¿Quiénes no deben ingerir nuestras pastillas?

Niños

Su efecto puede resultar demasiado potente para los niños, especialmente si son **menores de 12 años**. El consumo ocasional y de forma controlada podría ser seguro en niños adolescentes, pero no se recomienda hacerlo regularmente.

Mujeres embarazadas

Nuestros investigadores advierten que puede ser contraproducente y peligroso si se consume de forma excesiva. Se cree que puede afectar los niveles de hormonas sexuales, elevar el riesgo de aborto involuntario, causar sangrado vaginal anormal, contracciones uterinas, conducir a la mala absorción de ciertas vitaminas y minerales como el hierro, entre otros efectos negativos.

Es importante consultar al médico antes de tomar nuestras pastillas en el embarazo,

Durante la lactancia

Debido a que todavía no se tiene suficiente información sobre cuáles podrían ser las contraindicaciones en la lactancia, los investigadores opinan que, como medida de seguridad, es **mejor evitar o reducir su uso** mientras se esté amamantando a un bebé.

Pacientes en espera de una cirugía

Según nuestro grupo de investigadores, tomar nuestras pastillas días antes de tener una cirugía puede aumentar el **riesgo de hemorragia en el organismo**. Como medida de seguridad se recomienda no consumirlo durante 15 días antes o después de un procedimiento quirúrgico.

Pacientes con problemas cardíacos

Consumir altas dosis de nuestras dosis puede empeorar determinadas condiciones del corazón.

Personas bajo tratamiento médico

Una de las contraindicaciones más importantes de nuestras pastillas en su interacción con determinados medicamentos. Aquí se incluyen los **beta-bloqueadores**, los **anticoagulantes**, los medicamentos **insulínicos**, **barbitúricos** y la **terapia antiplaquetaria**.