

## 2.º Teste de Complementos de Análise Matemática

Duração: 1h30m

1. Determine a solução geral da equação diferencial

$$\frac{d^4 y}{dx^4} + y = 0.$$

**Solução:** raízes  $-\frac{\sqrt{2}}{2} \pm \frac{\sqrt{2}}{2}i$  e  $\frac{\sqrt{2}}{2} \pm \frac{\sqrt{2}}{2}i$ , solução geral:

$$y = e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}x} \left( c_1 \cos\left(\frac{\sqrt{2}}{2}x\right) + c_2 \sin\left(\frac{\sqrt{2}}{2}x\right) \right) + e^{\frac{\sqrt{2}}{2}x} \left( c_3 \cos\left(\frac{\sqrt{2}}{2}x\right) + c_4 \sin\left(\frac{\sqrt{2}}{2}x\right) \right),$$

onde  $c_1$ ,  $c_2$ ,  $c_3$  e  $c_4$  são constantes arbitrárias.

2. Determine a solução da equação diferencial

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + y = \cos x$$

usando o método dos coeficientes indeterminados, sabendo que a solução geral da equação homogênea associada pode ser escrita como  $y_c = c_1 \cos x + c_2 \sin x$ , onde  $c_1$  e  $c_2$  são constantes arbitrárias.

**Solução geral:**  $y = y_c + y_p = c_1 \cos x + c_2 \sin x + \frac{1}{2}x \sin x$ .

3. Considere a equação diferencial

$$y'' + 8y' + 16y = \frac{2e^{-4x}}{1+2x}, \quad x > 0.$$

- (a) Sabendo que  $e^{-4x}$  e  $xe^{-4x}$  são soluções da equação homogênea associada, mostre que as soluções são linearmente independentes.

**Solução:**

$$\begin{aligned} W(e^{-4x}, xe^{-4x}) &= \begin{vmatrix} e^{-4x} & xe^{-4x} \\ -4e^{-4x} & e^{-4x} - 4xe^{-4x} \end{vmatrix} = \\ &= e^{-8x} - 4xe^{-8x} + 4xe^{-8x} = e^{-8x} \neq 0 \end{aligned}$$

Como  $W(e^{-4x}, xe^{-4x}) \neq 0$ ,  $e^{-4x}$  e  $xe^{-4x}$  são soluções linearmente independentes.

- (b) Usando o método da variação das constantes determine uma solução particular da equação diferencial dada.

**Solução particular:**  $y_p = \left(-x + \frac{1}{2} \ln(2x+1)\right) e^{-4x} + \ln(2x+1)xe^{-4x} = e^{-4x} \left(\frac{1}{2}(2x+1) \ln(2x+1) - x\right).$

4. Determine a transformada inversa de Laplace da seguinte função:

$$F(s) = \frac{1}{(s^2+1)(s-2)} e^{-\pi s}.$$

**Solução:**  $L^{-1} \left\{ \frac{1}{(s^2+1)(s-2)} e^{-\pi s} \right\} = u_{\pi}(t) \left( -\frac{1}{5} \cos(t-\pi) - \frac{2}{5} \sin(t-\pi) + \frac{1}{5} e^{2(t-\pi)} \right).$

5. Resolva o seguinte PVI usando a transformada de Laplace:

$$\begin{cases} x' - y + 2x &= e^{-t} + e^t \\ x' - y' &= -e^{-t} \end{cases} \quad x(0) = 1, \quad y(0) = 0.$$

**Solução:**  $x(t) = \frac{1}{2}e^t + \frac{1}{2}e^{-t}$  e  $y(t) = \frac{1}{2}e^t - \frac{1}{2}e^{-t}$ .