Определение кратного интеграла

$\exists E$ — измеримое множество, $E \subset \mathbb{R}^n$

def
Конечная система $\tau = \{E_i\}_{i=1}^{i_\tau}$ непустых множеств E_i, измеримых по Жордану : $i = 1, 2, \ldots i_\tau$ называется разбиением E, если
1. $\mu(E_i \cap E_j) = 0$; $i \neq j$
2. $\bigcup_{i=1}^{i_\tau} E_i = E$

При этом $|\tau| = \max_{i=1,2,\ldots i_\tau} diam(E_i)$
(диаметр — если представить множество в виде шара)
называют мелкостью разбиения

$\mu E = \sum_{i=1}^{i_\tau} \mu E_i$

$\tau = \{E_i\}$

def
$\tau' = \{E_i'\}$ называют вписанным в $\tau = \{E_i\}$, если $\forall E_i' \in \tau' \; \exists E_i \in \tau: \; E_i' \subset E_i$ и обозначают $\tau' \nmid \tau$

Свойства:
1) Если $\tau \nmid \tau'$ и $\tau' \nmid \tau''$, то $\tau \nmid \tau''$
2) Потом проверим
3)

Lm
У всякого измеримого множества есть разбиение сколь угодно малой мелкости.

def
$\exists E \subset \mathbb{R}^n$, E — измеримо
$y = f(x) = f(x_1, x_2, \ldots x_n)$ и $\tau = \{E_i\}_{i=1}^{i_\tau}$
$\sigma_\tau(f, \xi^{(1)}, \xi^{(2)} \ldots \xi^{(i_\tau)}) = \sum_{i=1}^{i_\tau} f(\xi^{(i)}) \mu E_i; \; \xi^{(i)} \in E_i$
называют интегральной суммой Римана

 E_i

Lm
$\exists E \subset \mathbb{R}^n$, E — измеримое
$E_0 \subset E$, $\mu E_0 = 0$
Тогда $\lim_{|\tau| \to 0} \sum_{E_i \in \tau_0(E_0)} \mu E_i = 0$, где $\tau_0(E_0) = \{E_i \in \tau: E_i \cap E_0 \neq \varnothing\}$
$\tau(E_0) = \{E_i \in \tau: E_i \cap E_0 \neq \varnothing\}$

Th
$\exists E$ измеримо, $E \subset \mathbb{R}^n$
$\tau = \{E_i\}$ — разбиение, $E_0 \subset E$, $\mu E_0 = 0$
Если f ограничена на E, то Риманов интеграл $\int f(x) dE$ существует
$\exists \lim_{|\tau| \to 0} \sigma_{\tau(E_0)}$
При этом, если он существует и равен $\int f(x) dE$

def
Число A называют интегралом Римана от функции f по измеримому множеству $E \subset \mathbb{R}^n$, если какова бы ни была последовательность $\tau_n = \{E_i^{(m)}\}_{i=1}^{i_\tau}$, $m \in \mathbb{N}$ и каковы бы не были $\xi^{(i,m)} \in E_i^{(m)}$; $i = 1, 2, \ldots i_\tau$, последовательность интегральных сумм $\sigma_{\tau_m}(f, \xi^{(1,m)}, \xi^{(2,m)}, \ldots \xi^{(i_\tau, m)}) \xrightarrow{m \to \infty} A$
(Если существует предел)

$\int_E f(x)dx \quad \int f(x)dE \quad \underbrace{\int \ldots \int}_{n} f(x_1, x_2 \ldots x_n) dx_1 dx_2 \ldots dx_n$

$\int f(x) dE = \lim_{|\tau| \to 0} \sigma_\tau$

Существование интеграла Римана

Любая функция меры нуль интегрируема, и интеграл равен нулю

Lm
$\exists f$ определена на измеримом множестве $E \subset \mathbb{R}^n$
$\tau = \{E_i\}$ — разбиение E
$E_\tau^* = \bigcup_{\mu E_i > 0} E_i$
Если f неограничена на E_τ^*, тогда $\forall M > 0$ можно выбрать $\xi^{(i)} \in E_i$, что будет верно
$\left| \sum_{i=1}^{i_\tau} f(\xi^{(i)}) \mu E_i \right| > M$

Следствие
$\exists f$ — функция на измеримом $E \subset \mathbb{R}^n$, если у E $\exists$ сколь угодно мелкое разбиение, для которого f неограничена на объединении элементов разбиения положительной меры, то f — не интегрируема по Риману на E

Lm
Непустое пересечение n-мерного замкнутого куба с открытыми множествами имеет положительную мизкую меру Жордана.

Следствие
Для любого открытого измеримого множества $\exists$ сколь угодно мелкое разбиение, все элементы которого имеют положительную меру ($\mu E_i > 0$)

Th
Если f — интегрируема на множестве E, то $\exists E_0 \subset E$, $\mu E_0 = 0$, что f-ограничена на $E \setminus E_0$

Th
Если f — интегрируема на открытом множестве, то она ограничена

Суммы Дарбу

def
f — ограничена, E — измерима $\tau = \{E_i\}$
$m_i = \inf_{x \in E_i} f(x) \qquad M_i = \sup_{x \in E_i} f(x)$
$s_\tau = \sum_{i=1}^{i_\tau} m_i \mu E_i \qquad S_\tau = \sum_{i=1}^{i_\tau} M_i \mu E_i$
$s_\tau \leq \sigma_\tau \leq S_\tau$

Th
Для того, чтобы ограниченная на измеримом множестве $E \subset \mathbb{R}^n$ f была интегрируема по Риману,
$\lim_{|\tau| \to 0} (S_\tau - s_\tau) = 0$

Th
f — непрерывна на компакте, то она интегрируема на нём

Th
Если f — ограничена на измеримом компакте и множество её точек разрыва имеет меру нуль, то она интегрируема на нём

Свойства кратного интеграла

Свойства:
1) $\exists E$ — измеримо, то $\int dE = \mu E$
2) $\exists E$ и E^*, f — ограничена и интегрируема на E, тогда она интегрируема и на на E^*
3) Аддитивность интеграла по множествам
$\exists E'$ и E'' — измеримы $\quad E = E' \cup E''$
$E' \cap E'' = \varnothing$
f — ограничена и интегрируема на E, тогда $\exists \int f(x) dE'$ и $\exists \int f(x) dE''$
причём $\int f(x) dE = \int f(x) dE' + \int f(x) dE''$
4) Линейность интеграла
$\exists f_1, f_2$ — интегрируемы на E
$\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$
$\exists \int (\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2) dE = \lambda_1 \int f_1 dE + \lambda_2 \int f_2 dE$
5) Если f и g — интегрируемы и ограничены на непрерывном множестве E, тогда и $f \cdot g$ и $\frac{f}{g}$ (